This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

UC-NRLF
$B 271 450

Naturgeschichte des Wildes.

Für Jäger und Jagdliebhaber.

Von

R. v. Meyerinck,
Vize-Oberjägermeister.

Leipzig, 1876.
Heinrich Schmidt & Carl Günther.

Digitized by Google

THE LIBRARY
OF
THE UNIVERSITY
OF CALIFORNIA

PRESENTED BY
PROF. CHARLES A. KOFOID AND
MRS. PRUDENCE W. KOFOID

Digitized by Google

Digitized by Google

von Arlen

Naturgeschichte

des in Deutschland vorkommenden

Wildes

mit Angabe der

Schießzeiten, Jagdarten, waidmännischen Ausdrücke und Fährten.

Ein Handbuch für Jäger und Jagdliebhaber

von

R. v. Meyerinck,
Vice-Oberjägermeister.

Leipzig 1876.
Heinrich Schmidt & Carl Günther.

Digitized by Google

Digitized by Google

SK201
.M4

Vorwort.

Nachdem ich von verschiedenen Seiten aufgefordert worden bin, eine möglichst kurze Naturgeschichte, der in Deutschland vorkommenden Thiere, welche einen Gegenstand der Jagd bilden, aus eigener Erfahrung zu schreiben, bin ich zu dem kleinen Werke geschritten. Ich habe darin besonders im Auge gehabt, nur das Nothwendigste zu erwähnen, was zur Belehrung der Jägerei und Jagdliebhaber erforderlich ist, um die Thiere im Freien, womit diese sich beschäftigen, dadurch näher kennen zu lernen.

Es sind ja unendlich viele allgemeine Naturwissenschaften geschrieben, doch sind sie theils veraltet, sehr weitläufig oder unvollständig abgefaßt, oder auch unnütze Dinge darin mitgetheilt, oder endlich auch mit allerhand kleinen Erzählungen ausgeschmückt. Derartige Abweichungen habe ich vermieden, um ein möglichst kurzes, aber doch genügendes kleines Werk zu schreiben, damit jeder Forst- und Jagdbeamter oder die es werden wollen, sich dasselbe für ein Billiges anschaffen und daraus Belehrung nehmen können. Gern hätte ich mich über manchen, zur Jagd gehörigen Gegenstand, namentlich über die Wildpflege, Abführung und Dressur der Hunde

M313017
Digitized by Google

und die Ausübung der Jagd, worin ich beinahe eine 50jährige Erfahrung in den wildreichsten Gegenden Deutschlands gesammelt habe, ausgesprochen, wenn mir nicht der Raum zu diesem Buche, durch die Rücksicht der Billigkeit vorgeschrieben wäre. Ueber die Ausübung der Jagd in allen ihren Theilen ließe sich allein ein voluminöses Werk schreiben, doch glaube ich das Bemerkenswertheste bei den einzelnen Thieren mit hervorgehoben zu haben.

Die älteren sachkundigen Waidmänner werden nicht viel Neues in dieser kleinen Schrift finden, obwohl sie oft auch nur einseitig Kenntniß von unserem in Deutschland vorkommenden Wilde haben. Die Naturforscher sind meist keine Jäger und die Jagdschriftsteller schreiben oft von den alten Naturforschern ab und stehen nicht auf eigenen Füßen, daher kommen oft nicht wohlklingende Verstöße in der Jägersprache, oder auch in der Naturgeschichte der Thiere selber, viele Unrichtigkeiten vor, die hier vermieden sind. Ich habe nur die eigene Erfahrung, über die aufgeführten, zur Jagd in Deutschland gehörigen Thiere, mit Ausnahme des für unsere Jägerei nur wenig Interesse habenden Luchses und des Nörzes zu Hülfe genommen. Ueber die zuletzt gedachten Thiere habe ich mir von anderen Jägern, die sie beobachtet hatten, erzählen lassen und nur der Vollständigkeit halber mit aufgeführt.

Indem ich Allen, die sich für Jagd und Naturwissenschaft interessiren, ein aufrichtiges Waidmannsheil zurufe, möge von ihnen diese kleine Schrift eine nachsichtige Beurtheilung finden und ebenso harmlos aufgenommen werden, als sie geschrieben ist.

Der Verfasser.

Digitized by Google

Inhalt.

Seite

Jagdkalender für Deutschland 1
Eintheilung der Jagd 9
Die gangbarsten waidmännischen Ausdrücke 11
Eine Andeutung der Fährten und Spuren des Haarwildes (Illustration) 25

Die Säugethiere
in Deutschland, soweit sie zur Jagd gehören, oder für die Jäger Interesse haben.

Edel- oder Rothwild (Cervus elaphus) 29
Damwild (Cervus dama) 38
Elen- oder Elchwild (Cervus alces) 40
Rehwild (Cervus capreolus) 43
Gemswild (Antilope rupicapra) 46
Schwarzwild (Sus ferus) 48
Hase (Lepus timidus) 52
Wildes Kaninchen (Lepus cuniculus) 55
Biber (Castar fiber) 56
Murmelthier (Arctomys marmota) 59
Dachs (Ursus meles) 61
Wolf (Canis lupus) 63
Fuchs (Canis vulpes) 65
Luchs (Felis lynx) 68
Wilde Katze (Felis ferus) 69
Fischotter (Mustela lutra) 71
Sumpfotter oder Nörz (Mustela lutreola) 73
Baummarder (Mustela martes) 74

Digitized by Google

Seite
Steinmarder (Mustela foina) 76
Iltis (Mustela putorius) 77
Das große Wiesel (Mustela erminea) 78
Das kleine Wiesel (Mustela vulgaris) 80

Der Hund (Canis) 80
Schweißhund 80
Hühnerhund oder Vorstehhund 82
Dachshund oder Teckel 83
Bracke 84
Saufinder und Sauhetzhund 84
Parforcehunde 85
Windhunde 86

Die Vögel

in Deutschland, soweit sie zur Jagd gehören oder für die Jäger Interesse haben.

Trappe (Otis tarda) 87
Auerwild (Tetrao urogallus) 88
Birkwild (Tetrao tetrix) 91
Haselwild (Tetrao bonasia) 94
Schneehuhn Tetrao (lagopus) 95
Steinhuhn (Perdix saxatilis) 101
Rebhuhn (Perdix cinerea) 102
Wachtel (Perdix coturnix) 104
Fasan (Phasianus colchicus) 106
Waldschnepfe (Scolopax rusticola) 110
Pfuhlschnepfe (Scolopax major) 116
Bekassine (Scolopax gallinago) 118
Stummschnepfe (Scolopax gallinula) 120
Großer Brachvogel oder Keilhaken (Numenius arquata) 121
Dickknieige Trappe (Charadrius oder Otis oedicnemus) 122
Kiebitz (Vanellus cristatus) 124
Kranich (Grus cinereus) 125
Fischreiher (Ardea cinerea) 127
Seeschwalben (Sterna) und Möven (Larus) 129
Schwäne (Cygnus) 131
Wilde Gänse (Anser) 133

Wilde Enten 135
Märzente Anas boschas 137

Digitized by Google

Seite
Krückente (Anas crecca) 138
Knäckente (Anas querquedula) 138
Fasanenente (Anas acuta) 139
Löffelente (Anas clypeata) 140
Brandente (Anas tadorna) 141
Tafelente (Anas ferina) . . . . . 141.
Pfeifente (Anas penelope) 141

Raubvögel 143
Steinadler (Apuila fulvus) 145
Seeadler (Aquila ossifragus oder albicilla) 145
Flußadler (Aquila haliaëtos) 147
Schreiadler (Aquila naevia) 148
Hühnerfalke (Falco palumbarius) 149
Wanderfalke (Falco peregrinus) 151
Milan (Falco milvus) 152
Schwarzbrauner Milan (Falco fusco ater) 152
Sperber (Falco nisus) 153
Mauser (Falco buteo) 154
Rauhfüßiger Buffard (Falco lagopus) 155
Rohrweihe (Falco aeruginosus) 156
Kornweihe (Falco pygargus oder cyaneus) 157
Uhu (Strix bubo) 158

Kolkrabe (Corvus corax) 160

Drosselarten 160
Die Misteldrossel (Turdus viscivorus) 163
Die Wachholderdrossel (Turdus pilaris) 163
Die Schwarzdrossel (Turdus merula) 163
Die Singdrossel (Turdus musicus) 164
Die Weindrossel (Turdus iliacus) 165
Die Schildamsel (Turdus torquatus) 166

Lerchen 166
Die Feldlerche (Alauda arvensis) 166

Digitized by Google

Digitized by Google

Jagdkalender,

welcher nachweist, in welcher Zeit die verschiedenen Wildarten in den zu Deutschland gehörigen Ländern nach der gegenwärtigen Gesetzgebung geschossen werden dürfen, und zwar in:

Preußen, Braunschweig, Anhalt, Lippe, Schaumburg und Hamburg.

Elchwild, was nur in Preußen vorkommt: vom 1. Septbr. bis 30. Nov., stets inclusiv gerechnet.
Männliches Roth- und Damwild vom 1. Juli bis letzten Febr.
Weibliches Roth- und Damwild und deren Kälber vom 15. Oct. bis 31. Jan.
Rehböcke vom 1. Mai bis letzten Febr.
Ricken vom 15. Oct. bis 15. Dec.
Rehkälber dürfen gar nicht geschossen werden.
Dächse vom 1. Oct. bis 30. Nov.
Auer-, Birk- und Fasanenhähne vom 1. Septbr. bis 31. Mai.
Enten vom 1. Juli bis 31. März.
Trappen, Schwäne, Sumpf- und Wasservögel, ausgenommen Gänse und Reiher, vom 1. Juli bis 1. Mai.
Rebhühner vom 1. Septbr. bis 30. Nov., doch können die Regierungen den Aufgang und Schluß der Jagd um 14 Tage verändern.
Hasen, Auer-, Fasanen- und Birkhennen, Haselwild und Wachteln vom 1. Septbr. bis 31. Jan., desgl. auch bei diesen Wildarten.
Alle übrigen Wildarten können das ganze Jahr hindurch geschossen werden.

Anmerkung. Biber werden in Preußen nur vom 1. Oct. bis 31. Nov., in Anhalt vom 16. Juni bis 14. Febr. geschossen.
Roth- und Damwild kann in Braunschweig das ganze Jahr geschossen werden.

Digitized by Google

Baiern.

Männliches Rothwild vom 24. Juni bis 14. Oct. Weibliches Rothwild vom 16. Septbr. bis 5. Jan.
Männliches Damwild vom 24. Juni bis 29. Oct. Weibliches Damwild vom 2. Oct. bis 5. Jan.
Gemswild vom 26. Juli bis 29. Nov.
Rehböcke vom 2. Juni bis 1. Febr.
Roth-, Dam-, Gems- und Rehkälber, sowie Auer- und Birkhennen werden gar nicht geschossen.
Waldhasen vom 16. Septbr. bis 1. Febr.
Feldhasen, Rebhühner, Wachteln und Lerchen vom 16. Aug. bis 1. Febr.
Dachse vom 16. Septbr. bis 31. Dec.
Biber (wenn diese noch vorkommen) vom 2. Oct. bis 1. Febr.
Murmelthiere vom 16. August bis 30. Oct.
Fasanen vom 2. Septbr. bis 30. Febr.
Auer- und Birkhähne vom 2. Aug. bis 1. Febr. inclusive der Balzzeit.
Hasel-, Schnee- und Steinhühner vom 2. August bis 1. Febr.
Enten vom 2. Juli bis ultimo Febr.
Waldschnepfen und Bekassinen vom 2. Juli bis 14. April, im Hochgebirge bis 30. April.
Das übrige Federwild, wie auch wilde Tauben, Krammetsvögel können das ganze Jahr hindurch geschossen und gefangen werden, nur nicht im April und Mai.

Sachsen.

Roth- und Damwild vom 16. Juli bis 31. März.
Alle übrigen jagdbaren Säugethiere, mit Ausnahme des Schwarz- und Raubwildes, vom 1. Septbr. bis 31. Jan.
Enten vom 1. Juli bis 31. März.
Schnepfen, Auer-, Birk- und Haselhähne vom 1. Septbr. bis 31. Jan. und vom 1. März bis 14. Mai.
Lerchen werden vom 15. Septbr. bis 15. Oct. gefangen.
Krammetsvögel vom 1. Oct. bis 31. Jan.
Rebhühner und alle übrigen jagdbaren Vögel exclusive der Raubvögel vom 1. Septbr. bis 31. Jan.

Würtemberg.

Männliches Rothwild vom 1. Juli bis 15. Oct. Weibliches Rothwild vom 19. Oct. bis 31. Dec.

Digitized by Google

Männliches Damwild vom 1. Juli bis 15. Nov. Weibliches Damwild vom 16. Oct. bis 31. Jan.
Rehböcke vom 1. Juni bis 31. Jan.
Ricken im November.
Roth-, Dam- und Rehwildkälber dürfen nicht geschossen werden.
Dachse vom 1. Septbr. bis 31. Jan.
Hasen vom 16. August bis 31. Jan.
Füchse vom 1. Oct. bis 30. April.
Auer- und Birkhähne vom 1. Septbr. bis 15. Mai.
Auer- und Birkhennen vom 1. Nov. bis 31. Dec.
Haselwild, Fasanen und Rebhühner vom 16. August bis 30. Nov.
Enten vom 16. Juli bis 31. März.
Schnepfen und Bekassinen vom 1. Septbr. bis 14. April.
Wachteln vom 16. August bis 30. Febr.
Wilde Tauben und Krammetsvögel vom 1. Juli bis 30. Febr.
Lerchen vom 1. Septbr. bis 31. Jan.
Alle übrigen Wildarten können das ganze Jahr hindurch geschossen werden.

Baden.

Hirsche, Rehböcke, Schwarzwild, Auer- und Birkhähne, Kaninchen, Raub- und anderes schädliches Wild werden das ganze Jahr geschossen, alles übrige Wild vom 24. August bis 1. Febr.

Hessen.

Männliches Roth- und Damwild, Rehböcke, Schwarzwild, Raubzeug und Kaninchen, wilde Tauben und jede Wildart, welche im Großherzogthum oder in dessen Umgebung nicht setzt oder brütet, wird das ganze Jahr geschossen.
Auer-, Birk- und Haselhähne vom 26. August bis 6. Febr. und vom 16. April bis 20. Mai.
Im Großherzogthum und in dessen Nähe brütende Schnepfen, Trappen, Brachvögel und Kibitze, vom 1. Juli bis 30. April.
Desgl. alle Enten vom 1. Juli bis 30. Febr.
Alles übrige Wild vom 26. August bis 6. Febr.

Digitized by Google

Mecklenburg-Schwerin und Strelitz.

Alles Haarwild vom 26. Juli bis 30. Febr.
Das Federwild hat keine gesetzliche Schonzeit, soll aber pfleglich behandelt werden.

Weimar.

Alle Raubthiere, Trappen und Kaninchen werden zu jeder Zeit geschossen. Zug- und Strichvögel nur zur Zeit des Zuges oder Striches.
Roth-, Dam-, Schwarz- und Rehwild, Hasen, Auer- und Birkwild vom 16. Juni bis 30. Jan.
Alles der hohen und mittleren Jagd nicht ausdrücklich zugewiesene Wild vom 16. Septbr. bis 30. Jan.
Auer- und Birkhähne auch in der Balzzeit.

Oldenburg.

Männliches Roth-, Dam- und Rehwild vom 1. Juli bis ultimo Febr.
Weibliches Roth- und Damwild und deren Kälber vom 16. Oct. bis 31. Dec.
Ricken vom 16. Oct. bis 14. Dec. Rehkälber dürfen nicht geschossen werden.
Birk- und Fasanenhähne vom 1. Septbr. bis 31. Dec. und vom 1. März bis 31. Mai.
Wilde Enten, Strandläufer und Kiebitze vom 1. Juli bis 31. März.
Hasen, Dachse, Birk- und Fasanenhühner, Rebhühner und Wachteln vom 1. Septbr. bis 31. Dec.
Schwarzwild, Kaninchen, Raubzeug, Schnepfenarten, Schwäne, Gänse und Taucher ꝛc. werden das ganze Jahr geschossen.

Meiningen.

Männliches Roth- und Rehwild vom 15. Juni bis 15. Oct.
Weibliches Roth- und Rehwild, Hasen und alles Niederwild vom 1. Septbr. bis 31. Jan.
Auer- und Birkwild vom 1. August bis 31. Jan. inclusive der Balzzeit.

Digitized by Google

Rebhühner vom 24. August bis 31. Jan.
Raubthiere das ganze Jahr.

Altenburg.

Hoch- und Schwarzwild; Raubthiere, Kaninchen und Zugvögel das ganze Jahr.
Rehböcke vom 1. Juli bis 31. Jan.
Ricken, Rehkälber und Dachse, Hasen und Fasanen vom 1. Oct. bis 31. Jan.
Auer- und Birkwild, Rebhühner vom 1. Septbr. bis 31. Jan.
Während der Balz- und Paarzeit können auch Hähne vom Auer- und Birkwild und den Rebhühnern, zu Ostern und Pfingsten auch Festhasen geschossen werden.

Coburg.

Roth- und Rehwild vom 20. Juni bis 2. Febr.
Alles übrige Wild vom 26. August bis 2. Febr.
Auer- und Birkhähne, Raub- und Zugvögel das ganze Jahr.

Gotha.

Das zur hohen Jagd gehörige Wild, inclusive des Rehwildes, kann das ganze Jahr hindurch geschossen werden.
Das zur niederen Jagd gehörige Wild vom 15. Septbr. bis 1. Febr.

Schwarzburg-Sondershausen.

Alles zur hohen und mittleren Jagd gehörige Wild kann geschossen werden vom 1. Juni bis 31. Jan.
Das zur niederen Jagd gehörige Wild vom 24. August bis 31. Jan.
Wasservögel und Schnepfenarten das ganze Jahr; Auer- und Birkhähne während der Balzzeit.

Schwarzburg-Rudolstadt.

Das Wild, welches zur niedern Jagd gehört, vom 1. Oct. bis 31. Jan.
Die Feststellung der Jagdzeit für die übrigen Wildarten bleibt den jagdberechtigten Grundeigenthümern, der Staatsverwaltung und den Gemeinden überlassen.

Digitized by Google

Waldeck.

Roth-, Dam- und Schwarzwild und alles Raubzeug wird das ganze Jahr geschossen.
Rehböcke vom 25. Juni bis 31. Jan.; Ricken vom 1. Oct. bis 31. Jan.
Hasen vom 1. Septbr. bis 31. Jan.
Auer-, Birk- und Haselwild vom 1. Septbr. bis 31. März. Hähne auch in der Balzzeit.
Rebhühner vom 1. Septbr. bis 31. Dec.
Gänse, Enten, Schnepfen und Zugvögel sind nur in der Brütezeit zu schonen.
Schmalrehe, Schmalböcke und Rehkälber werden nicht geschossen.

Lippe-Detmold.

Nur Hasen und Hühner haben eine Schonzeit vom 1. Febr. bis zu dem von der Regierung alljährlich bekannt zu machenden Tage.

Lübeck.

Hirsche, Schwarzwild, Raubthiere, Schnepfenarten, Enten und Gänse werden das ganze Jahr hindurch geschossen, alles übrige Wild vom 1. August bis 31. Jan..

Bremen.

Hasen und Rebhühner vom 1. Septbr. bis 31. Jan.; alles andere Wild das ganze Jahr.

Elsaß und Lothringen.

Nach den noch geltenden, französischen Gesetzen werden Anfang und Schluß der Jagd alljährlich bekannt gemacht.

Anmerkung. Leider sind die Zeitpunkte, in denen das Wild in den verschiedenen Ländern geschossen werden darf, sehr verschieden und zur Erhaltung des Wildes oft nicht günstig gelegt. Es wäre daher sehr wünschenswerth, wenn in Deutschland die Schonzeiten des Wildes, soweit es die Verhältnisse gestatten, mehr in Uebereinstimmung gebracht würden, um dem unschädlichen Wilde eine größere Schonung angedeihen zu lassen und um eine bessere Controle in den Schonzeiten über die Wildfrevel und Jagdcontraventionen führen zu können.

Digitized by Google

Auch ist die Annahme, welche Thiere jagdbar sind, sehr verschieden und nicht klar dargelegt, und sei hier nur bemerkt, daß als jagdbare Thiere alle diejenigen gerechnet werden müßten, welche im Freien leben und dem Menschen zur Nahrung und Kleidung gereichen, soweit sich die Jäger mit ihrer Erlegung befassen. — Dieser Begriff ist jedoch in den verschiedenen Theilen des deutschen Reiches nicht immer festgehalten, vielmehr in den Gesetzen der einzelnen Staaten verschieden, z. B. in dem Theile des preußischen Staates, in dem das allgemeine Landrecht gilt, dahin festgestellt, daß, soweit nicht in den Jagdordnungen der einzelnen Provinzen etwas Anderes bestimmt ist, nur die zur Speise dienenden vierfüßigen Thiere und Vögel zum jagdbaren Wilde gehören. — Im Königreich Preußen ist ein neues Jagd-Polizeigesetz, verbunden mit einem Wildschonungsgesetze, pro 1877 in Aussicht gestellt, worin vielleicht einige wenige Abänderungen in Bezug auf Schonzeit der Thiere vorkommen dürften. Ebenso stehen im Königreich Sachsen Abänderungen im Jagdgesetze zu Gunsten der besseren Schonung einiger Wildarten bevor.

Digitized by Google

Digitized by Google

Eintheilung

der zur Jagd in Deutschland gehörigen Thiere, wie sie uns schon aus alter Zeit überliefert worden ist, und in den meisten Ländern noch besteht.

Obgleich die Eintheilung der Jagd in hohe, mittlere und niedere Jagd fast in allen Ländern Deutschlands durch die neuen Gesetze und besonders seit Aufhebung des Jagdrechts auf fremdem Grund und Boden ihre Hauptbedeutung ganz verloren hat, so muß dieselbe dennoch im Munde der Jägerei beibehalten werden.

Es sind daher hier die Wildarten aufgeführt, wie man sie zu den verschiedenen Jagdarten von jeher rechnete und noch heute dazu rechnen muß.

Manche Gesetzbücher und Forstordnungen in Deutschland kennen blos hohe und niedere Jagd, andere wieder auch noch eine Mitteljagd. Wo blos eine hohe und niedere Jagd besteht oder bestand, gehören:

1) Zur hohen Jagd:

Elch-, Roth-, Dam-, Schwarz-, Gems- und Rehwild, der Luchs und der Wolf.

Schwäne, Trappen, Fasanen, Auer-, Birk- und Haselwild, große Brachvögel und Kraniche.

Manche alte Jagdschriftsteller und Autoritäten im Jagdfache rechneten früher, als noch die Beize mit Falken in Deutschland exercirt wurde, auch zur hohen Jagd:

Reiher, Adler, Uhu, Wander-, Hühner-, Lerchenfalken und Sperber, was hier nur beiläufig bemerkt wird.

2) Zur niederen Jagd:

Hasen, Kaninchen, Dachse, Füchse, Biber, Murmelthiere, Fischottern wilde Katzen, Baum- und Steinmarder, Iltis und die Wiesel.

Digitized by Google

Rebhühner, Wachteln, Schnee= und Steinhühner, Schnepfenarten, Strandläufer, Sumpfvögel, Gänse, Enten, Möven, Kiebitze (letztere beiden besonders wegen der Eier), alle Drosselarten und Lerchen.

3) Wo eine Mitteljagd besteht oder bestand, gehören zu dieser Jagdart:

Rehe, wilde Schweine und Wölfe.
Birk= und Haselwild und große Brachvögel.*)

---

*) Nach näher angestellten Ermittelungen verstand man wunderbarer Weise unter große Brachvögel zwei ganz verschiedene Vogelarten, die jedoch beide gegessen werden und früher gebeizt wurden. Dies sind
1) der Keilhaken oder Doppelschnepfe (Numenius arquatus) und
2) der große Regenpfeifer oder die dickknieige Trappe (Charadrius oder Otis oedicnemus).

Abbalzen. Wenn die Auer- Birkhahn- u. Fasanenbalz vorüber ist, sagt man: das Geflügel hat abgebalzt.
Abbäumen, auch abfliegen sagt man vom Wild, welches einen Baum erstiegen hatte, und denselben verläßt.
Abbiß heißt alles stehen gebliebene Gras etc. wo ein Wild sich geäst hat
Abbrunften. Wenn die Brunftzeit vorüber ist, sagt man: Er hat abgebrunftet.
Abdecken. Ein zusammengerolltes Teil abbinden lassen; Aufdecken ein Teil zusammenlegen.
Abziehen: 1. Ein Revier abziehen 2. Vom Stande abziehen 3. Wenn der Hund aufhört, ein Wild zu verfolgen.
Abführen. Das Abrichten der Hunde bei Vorstehern.
Abrufen - schreien - pfeifen - blasen, Jäger oder Hunde zurückrufen
Abstehen, sich: Wenn ein angeschossenes Wild an seinem Schuß [illegible] abstirbt.
Abtreiben: einen Distrikt durch Treiber
Alt-Ruf: natürlicher Ruf, der schon gesetzt hat.
Anbrüchig, angegangen: übelriechendes Wildpret.
Angehen = verbellen
Anschlagen: das Bellen der Hunde auf frischer Fährte
Atzung: Futter der Vögel

Digitized by Google

Die waidmännischen Ausdrücke

sind in den einzelnen Ländern Deutschlands und sogar in den Provinzen sehr verschieden. Es sind hier nur die gebräuchlichsten und bei den einzelnen Wildarten nicht schon angegebenen Worte und Namen aufgeführt, soweit die Jägerei sie kennen muß, um sich nach Jägerbrauch ausdrücken zu können.

Aasjägerei betreiben, heißt die Jagd unwaidmännisch betreiben; Wild in der Setz- und Brütezeit schießen; und Wild anschießen und nicht nachsuchen oder verderben lassen.

Abfallen sagt man, wenn ein Hirsch nach der Begattung vom Thiere steigt.

Abfangen oder **Abnicken** heißt ein angeschossenes, noch nicht verendetes Stück Wild mit dem Hirschfänger oder Genickfänger tödten.

Abfedern heißt: alles zur niederen Jagd gehörige Federwild durch einen Stich im Genick mit einer starken Feder tödten.

Abführen oder **Arbeiten** sagt man, wenn man einen Schweißhund abrichtet. Man führt ihn an einem Schweißriem ab; andere Hunde an der Leine oder Strick. Die Hühnerhunde dressirt man.

Ablösen sagt man statt abschneiden, wenn man Wild zerwirkt, z. B. das Blatt ablösen.

Abnehmen oder **Abtragen** den Schweißhund, wenn er z. B. auf falscher Fährte ist.

Absprung nennt man die Stelle, wo ein Stück von der begonnenen Fährte seitwärts springt oder umdreht. Auch die Stelle, wo ein Marder vom Baum oder Dache springt.

Abspüren heißt Fährten aufsuchen; einen Weg oder Forstort abspüren.

Abstreichen sagt man vom Federwilde, wenn es von einem Baume fortfliegt, nur vom Auerhahn sagt man Abreiten oder Ausschwingen.

Abstreifen sagt man, wenn man den Balg des Hasen, der Kaninchen ꝛc. und der vierläufigen Raubthiere abzieht.

Abtritt sind die abgetretenen Grashalme in der Hirschfährte.

Abwerfen, das Geweih verlieren. Der Hirsch hat abgeworfen.

Digitized by Google

Aesung ist die Nahrung des eßbaren Wildes, nur beim Schwein heißt diese Fraß.

Affter oder Geäffter auch Oberrücken heißen die kleinen Schalen hinten am Laufe des Hoch-, Reh- und Schwarzwildes.

Anlegen, die Hunde auf einer Fährte, um nachzusuchen oder anzuhetzen.

Annehmen oder Begehren thut ein Hirsch oder Schwein ꝛc. einen Jäger, wenn sie angeschossen sind, um diesen zu verletzen; auch sagt man: das Wild hat die Fütterung angenommen.

Anschießen heißt ein Stück Wild verwunden.

Anschneiden thut der Hund und Fuchs ꝛc., wenn er ein verendetes Stück Wild anfrißt.

Ansprechen, einen Hirsch nach dem Geweih oder der Fährte, wie stark er ist.

Anspringen, wenn man sich dem Auerhahn, während er balzt, durch Sprünge nähert.

Anstand oder Ansitz ist die Stelle, wo ein Jäger Wild auf dem Wechsel oder Paß erwartet.

Aufblocken thut der Raubvogel, wenn er bäumt.

Aufbrechen heißt: das Gescheide und Geräusch aus einem Stück Wild nehmen. Auswerfen sagt man beim Hasen und Kaninchen.

Auffallen thut der Hund, wenn er eine Fährte markirt.

Aufnehmen heißt das hingeworfene Futter fressen.

Aufsetzen, d. h. das Geweih erneuern. Der Hirsch hat gut aufgesetzt.

Aufsprengen oder Sprengen, auch hoch machen, wenn man ein Stück Hochwild aus seinem Bette aufscheucht.

Aufstieg ist die Stelle, wo ein Marder auf einen Baum oder Gebäude steigt.

Aufzug, die gesammten jungen Fasanen in einer Fasanerie.

Ausführen thut der Dachs und Fuchs, wenn sie Erde aus dem Bau scharren.

Ausmachen, den Aufenthalt des vierläufigen Raubzeuges ermitteln.

Ausstieg heißt die Stelle, wo ein Biber oder eine Fischotter ans Land zu gehen pflegt.

Auswechseln thut das Wild, wenn es seinen bisherigen Stand verläßt.

Ausziehen sagt man vom Federwilde, wenn man diesem mit einem Häkchen die Eingeweide auszieht.

Bache heißt das Weibchen vom Schwarzwild.

Balg, das Fell von dem zur niederen Jagd gehörigen Wilde.

Ballen ist der erhabene, harte und hintere Theil der Fußsohle eines Stück Wildes. Besonders beim Rothhirsche sind in der Fährte die Ballen stark abgedrückt.

Balzen heißt begatten des zur hohen und mittleren Jagd gehörigen Federwildes, daher sagt man: Balzzeit, Balzplatz.

Digitized by Google

Bast nennt man die rauhe Haut an den Geweihen, so lange diese noch nicht ausgewachsen und reif sind.

Bau, die unterirdischen Röhren der Wildarten, welche in der Erde leben.

Bäumen thun die Marder, wenn sie auf einen Baum klettern.

Befahren ist ein Bau, wenn sich ein Dachs oder Fuchs ꝛc. darin frisch spürt.

Behänge nennt man die Ohren der Jagdhunde.

Beschlagen heißt vom Hochwilde, sich begatten.

Bestätigen, d. h. fest bestimmen, ob Wild in einem Forstorte steckt.

Bette heißt das Lager eines Stück Hochwildes.

Betze heißt die Füchsin. (**Fehe**).

Blatt ist der oberste Theil des Vorderschenkels beim Haarwilde. Blattschuß; auch nennt man einen breiten Hirschfänger so, den man zum Zerlegen des Wildes gebraucht und womit früher die Jäger bei der Jagd bestraft wurden, d. h. Pfunde erhielten, wenn sie sich eines unwaidmännischen Ausdruckes bedienten.

Blatten heißt in der Brunftzeit der Rehe, den Bock dadurch anlocken, daß man den Ton eines Schmalrehes nachahmt. Der Bock springt aufs Blatt.

Blume ist der Schwanz des Hasen, Kaninchen und die äußerste Spitze der Ruthe beim Fuchs und Wolf.

Borsten heißen die langen Haare des Schwarzwildes, die im Kamm heißen Federn.

Brandadern nennt man die dicken Adern in den Keulen, die am Schlosse endigen und die man aufsticht beim Aufbrechen eines Stück Hochwildes.

Brandfuchs ist solcher, der eine schwarze Kehle und schwarze Blume hat.

Bringen heißt beim vierläufigen Raubzeuge gebären. Es bringt Junge.

Brocken oder Stellbrocken ist ein Stückchen Fleisch ꝛc. was an einer Falle oder Eisen angebracht ist, bei dessen Berührung die Falle oder das Eisen zuschlägt.

Brunsten heißt beim Hoch-, Schwarz- und Rehwilde sich begatten, daher Brunftzeit, Brunftplatz, Brunftthirsch.

Brunftruthe ist das männliche Glied des vorbenannten Wildes.

Brunftkern ist der vordere Theil des Hochwildes zwischen den Blättern.

Contrafährte nennt man solche, wo ein Stück Wild auf derselben Fährte zurückgewechselt ist.

Contrajagen ist solches, wo das Wild von zwei Seiten vor die Schützen getrieben wird.

Cürée heißt der Act nach einer Parforcejagd, wenn den Hunden ihr Jägerrecht, d. h. das Geräusch, die Rippen oder Schweiß im Kreise der Jagdgesellschaft gegeben wird. Cürée machen.

Digitized by Google

Decke, die Haut des Hochwildes.

Decken heißt, wenn mehrere Hunde ein Schwein oder einen Hirsch festhalten.

Dick gehen heißt bei den vierläufigen Raubthieren tragend sein.

Donenstieg nennt man im Holze die Linie, auf welcher die Donen zum Vogelfang befestigt sind.

Drossel ist die Luftröhre beim Wilde.

Drosselknopf ist der dicke Theil am Ende der Luftröhre, wo diese und der Schlund zusammenhängen.

Drücken sagt man vom Wilde, wenn es sich auf der Erde oder einem Aste niederstreckt, um sich zu verbergen.

Durchbrechen thut das Wild, wenn es flüchtig durch die Treiber geht. Zurückbrechen.

Durchlegen oder Durchrinnen sagt man vom Hochwilde, wenn es durch Wasser schwimmt.

Einfallen sagt man vom Federwilde, wenn es sich auf die Erde setzt.

Eingriff nennt man die tief eingedrückte Fährte, welche ein Stück Wild nach dem Schusse mit den Schalen beim ersten Satze macht.

Einkreisen, d. h. bei Schnee einen Walddistrikt abspüren, um festzustellen, was für Wild darinsteckt.

Einschieben thut sich das Schwarzwild, wenn es sich niederlegt.

Einschwingen thut sich das Auer- und Birkwild, wenn es sich auf einen Baum setzt. Auf den Einschwung stellt man sich des Abends an.

Einsprung ist eine Vorrichtung im Wildzaun, um einen Park, wo das Wild ein-, aber nicht wieder herausspringen kann.

Eisbein nennt man die Knochen beim Haarwilde, die das Schloß bilden.

Engerlinge heißen die weißen Maden, welche das Hochwild und die Rehe vom Februar bis Mai unter der Decke sitzen hat und in dieser Zeit die Haut unbrauchbar machen, weil die Bremsen, welche hieraus sich entwickeln, sich durch die Haut durchfressen, um ausfliegen zu können.

Erdmast ist die Nahrung, welche das Schwarzwild in der Erde findet, wie Insekten, Larven, Puppen ꝛc.

Erlegen heißt Tödten des Wildes.

Eulenköpfe nennt man die Waldschnepfen, welche besonders groß sind und am Ende der Zugzeit in Norddeutschland eintreffen.

Fährte nennt man mehrere Abdrücke hinter einander auf der Erde oder im Schnee des unteren Theiles der Läufe bei allem zur hohen Jagd gerechneten, eßbaren vierläufigen Wilde. Bisweilen wird auch ein einzelner Abdruck statt Tritt so genannt. Warme Fährte sagt man,

Digitized by Google

wenn diese noch frisch ist, und die Hunde noch Witterung von ihr haben, sonst ist sie kalt.

Fänge sind die Eckzähne des vierläufigen Raubzeuges und die Füße der Raubvögel.

Fängisch stellen thut man ein Netz oder eine Falle, wenn man diese aufstellt, so daß sich das Wild darin fangen kann.

Fahren, aus- oder in den Bau, thun die Thiere, welche in solchen leben, wenn sie ihn schnell verlassen oder hineinschlüpfen.

Federn sind die kleinen, schmalen Knochenerhöhungen auf dem Rückgrat des Haarwildes. Federschuß, wenn solch Knochen durchschossen ist. Das Wild bricht im Feuer zusammen, aber steht bald wieder auf und geht flüchtig ab, ohne daß es ihm etwas schadet.

Federwild sind alle zur Jagd gehörigen eßbaren Vögel.

Fegen oder Schlagen sagt man vom Hirsch und Rehbock, wenn diese den Bast vom Gehörn an Bäumen und Sträuchern abputzen.

Feigenblatt oder Feuchtblatt heißt das Geburtsglied beim Hoch-, Schwarz- und Rehwilde.

Feist ist das Fett des Hochwildes und der Rehe; Weißes hat das Schwarzwild.

Feistzeit ist die, wo das Wild am besten im Stande ist.

Fett sind alle zur niederen Jagd gehörigen Thiere und die 4läufigen Raubthiere, wenn sie wirklich viel Fett haben.

Flucht machen sagt man, wenn das Wild nach dem Schusse einen oder mehrere Sätze in die Höhe nach vorn zu macht.

Flüchtig sein, wenn das Haarwild schnell davon eilt.

Forkeln heißt, wenn im Kampfe ein Hirsch den andern mit dem Geweih spießt, oder auch einen Menschen und Hund.

Fortziehen sagt man vom Hochwilde, wenn es langsam davon geht. Auch ziehen die Zugvögel im Herbste fort.

Fraß oder Gefräß ist die Nahrung des Schwarzwildes; es nimmt den Fraß auf! Das Raubzeug frißt

Frettieren heißt die Jagdart, wo man wilde Kaninchen mit Frettchen aus einem Baue treibt.

Frischen heißt beim Schwarzwilde Junge gebären.

Fromm oder Vertraut ist dasjenige Wild, welches einen Menschen ungewöhnlich nahe herankommen läßt.

Führig ist ein Hund, der sich bequem und ruhig an dem Riem führen läßt.

Fürstenruf ist die Fanfare, mit der man hohe Herrschaften bei Ankunft auf der Jagd begrüßt oder herbeiruft.

Fütterung, die Stelle, wo man Wild füttert.

Gabler ist ein Hirsch, wenn er an der Hauptstange nur Augensprossen hat.

Geäse nennt man das Maul des Hochwildes und der Rehe. Auch nennt man so die Nahrung allen eßbaren Haar- und Federwildes.

Digitized by Google

Gräß ist die im Wanst des Wildes noch nicht verdaute Nahrung.

Gebiß sind die gesammten Zähne der vierläufigen Raubthiere.

Gebreche oder Gebräch heißt der Rüssel des Schwarzwildes. Die Sau steht im Gebreche, wenn sie Fraß in der Erde sucht und wühlt.

Gehecke sind die jungen Raubthiere, die von einer Mutter geboren sind.

Gehöre statt Ohren hat das Schwarzwild.

Gelauf ist die Stelle, wo Federwild gelaufen ist.

Gemsbart heißen die langen Haare auf dem Widerrist des Gemswildes.

Geräusch oder Gelünge nennt man Herz, Lunge, Leber und Nieren beim Hoch-, Schwarz- und Rehwilde.

Gering sagt man vom Wilde statt mager. Geringer Hirsch ist solcher, der noch jung ist und ein schwaches Gehörn trägt.

Gesäuge heißt das Euter des weiblichen Haarwildes.

Gesperr nennt man die von einer Fasanenhenne ausgebrüteten Jungen.

Gewehre sind die Eckzähne im Unterkiefer beim Keiler, die im Oberkiefer nennt man Hadern. Die Keiler theilen damit Schläge aus.

Gewölfe nennt man die von einem Weibchen geborenen Jungen des Wolfes, Fuchses und Luchses.

Gewölle ist der Auswurf der Raubvögel, den sie von sich geben, wenn sie unverdauliche Haare und Federn mit verschluckt haben.

Hab acht! ist der Zuruf der Jäger bei der Jagd, wenn Wild auf der Erde angelaufen kommt.

Haken oder Kraneln und Kusen heißen die beiden glatten Seitenzähne im Oberkiefer des Rothwildes; auch die Eckzähne der Bachen.

Hallali ist das Ende einer Parforcejagd, wenn das Stück Wild erlegt ist.

Handgehörn ist solches, welches in der Krone 5 Enden hat und diese handförmig gewachsen sind.

Hasenklein nennt man das Geräusch, Kopf, Hals, Vorderblätter und Wammen der Hasen.

Hauptjagen ist ein großes Zeugjagen, in dem das Wild zusammengetrieben und mit Zeug eingestellt ist.

Hauptschwein oder Hauendes Schwein ist 5 Jahr alt oder darüber.

Haut, auch Decke, nennt man das Fell des Hochwildes und der Rehe.

Herd nennt man die Stelle, wo man durch Lockvögel anderes Federwild herbeilockt und diese durch Schlagnetze fängt; daher Vogelherd.

Hesse nennt man die dicke Sehne beim Haarwilde, die über dem Kniegelenk der Hinterläufe nach oben zu geht. Man hesset einen im Feuer erlegten Hirsch, wenn man diese Sehne mit dem Hirschfänger durchschlägt, damit er nicht wieder entfliehen kann. Man hesset einen Hasen ꝛc.

Digitized by Google

wenn man einen Hinterlauf durch ein gestochenes Loch zwischen Sehne und Knochen durchzieht, um ihn so aufzuhängen.

Himmelsspur ist die Stelle, wo ein Hirsch an einem Baum geschlagen hat.

Hochwild nennt man vorzugsweise Roth-, Elch-, Dam- und Gemswild, weil es stets zur hohen Jagd gehört. In manchen Gegenden bezeichnet man auch damit alles Wild, was zur hohen Jagd gehört.

Horst nennt man das Nest der Raubvögel und Reiher.

Hornfessel ist der Riem, woran das Jagdhorn getragen wird.

Hubertus ist der heilige Schutzpatron des edlen Waidwerkes. Er war ein Sohn des Bertram von Guyenne und lebte am Hofe Pippins von Heristal als leidenschaftlicher Jäger. Als er am Charfreitage im Ardennerwalde jagte, erschien ihm ein weißer Hirsch, der ein umstrahlendes Crucifix zwischen dem Geweih trug. Da fiel Hubertus auf die Knieen, und als er eine warnende Stimme hörte, bekehrte sich der große Jäger, that ein Gelübde, nie wieder auf Jagd zu gehen und wurde Mönch. Am 3. November starb er, und seit jener Zeit wird dieser Tag von der Jägerei zum Andenken gefeiert.

Jagdbar ist ein Elch- oder Rothhirsch, wenn er 10 Enden oder mehr hat.

Jagdzeug, alle zu einem Jagen erforderlichen Materialien und Utensilien.

Jägerrecht ist der Antheil am erlegten Hoch-, Schwarz- und Rehwilde, welches dem Administrator einer Jagd zusteht. Man rechnet dazu das Geräusch, die Meerbraten und das inwendig sitzende Feist.

Kälberstich ist beim Hochwilde die Vertiefung in der Brust unter dem Halse. Man fängt daselbst auch einen Hirsch ab.

Kahlwild nennt man das weibliche Hochwild und deren Kälber.

Kamm nennt man die langen Borsten auf dem vorderen Theil des Rückens eines Stück Schwarzwildes.

Kämpfen thun sich das männliche Hochwild, die Rehböcke, das Schwarzwild in der Brunftzeit, ebenso das zur hohen Jagd gehörige Federwild in der Balzzeit.

Keiler oder Keuler heißt das männliche Schwarzwild.

Kelle heißt der Schwanz des Bibers.

Kessel ist das Lager einer oder mehrerer Stücken Schwarzwild und die erweiterten Röhren im Dachs-, Fuchs- und Biberbau, worin diese ranzen und werfen.

Kesseljagen ist ein solches, wo man Hochwild durch hohe Tücher eingestellt hat und dasselbe durch Treiber an die im Treiben angestellten Schützen gebracht wird.

Digitized by Google

Kesseltreiben ist ein solches, wo man ein möglichst rundes Terrain auf dem Felde mit Schützen und Treibern umstellt oder von einem Punkte auslaufen läßt. Ist dies geschlossen, so gehen dieselben auf eine in der Mitte des umstellten Treibens aufgestellte Fahne los, so daß der Kreis immer kleiner wird.

Keule ist der obere Theil des Hinterschenkels beim Haarwilde.

Kirrung oder Körnung nennt man die Stelle, wo man Wild durch Futter anlockt.

Klagen thut alles Haarwild, welches aus Schmerz oder Angst einen lauten Ton ausstößt.

Kolben nennt man die Geweihe, so lange sie noch nicht vollständig ausgewachsen und noch weich sind.

Koppel oder Kuppel, wenn zwei Hunde zusammen an eine Leine gebunden sind.

Krallen nennt man die Klauen des Luchses, der wilden Katzen und der Raubvögel. Bei den übrigen vierläufigen Raubthieren sagt man: Klauen.

Kreisen heißt einen Forstort ganz umspüren.

Krickel heißen die Hörner der Gemsen.

Kröpfen sagt man von den Raubvögeln, statt fressen.

Krone ist der obere Theil eines Rothhirschgeweihes, wenn daselbst drei oder mehr Enden sitzen; daher Kronenhirsch.

Kümmerer ist ein Hirsch, der in Folge einer Verwundung gering am Körper ist.

Kurzwildpret heißen die Testikel beim Hoch-, Reh-, und Schwarzwild. Geilen oder Geschröt bei dem anderen Haarwilde.

Lager ist die Stelle, wo vierläufiges Raubzeug oder ein Hase geruhet hat oder noch liegt.

Lappen nennt man Schnüre, woran Federn oder Stücken Leinwand befestigt sind und die man beim Treiben an Stöcken oder Bäumen befestigt, um das Wild zurückzuscheuchen; daher Feder oder Tuchlappen. Man verlappt ein Treiben oder die Flügel.

Lauberbock oder Zoddelbock ist ein starker, alter Gemsbock.

Lauf ist der Fuß des Haarwildes; auch die Stelle, wo im eingestellten Jagen das Wild vorgetrieben und geschossen wird.

Lauscher sind die Ohren des Bibers und der vierläufigen Raubthiere.

Laut, die Hunde jagen laut; Standlaut geben sie, wenn das Wild sich stellt.

Leier auch Pürzel ist der Schwanz des Schwarzwildes.

Lichter hat das Hochwild statt Augen.

Löffel heißen die Ohren der Hasen und Kaninchen.

Losung, die Exkremente des zur Jagd gehörigen Wildes; es löset sich.

Lunte, Ruthe und Standarte heißt der Schwanz des Wolfes, Fuchses und der wilden Katze.

Digitized by Google

Mahnen oder sich melden thut das Roththier, wenn es plötzlich einen Menschen windet oder etwas Verdächtiges vernimmt.

Malbaum ist ein solcher, woran das Roth- und Schwarzwild sich nach dem Suhlen gerieben und Erde und Schlamm daran zurückgelassen hat.

Mauserzeit ist die, wo die Vögel ihr Gefieder wechseln; sie mausern sich gewöhnlich im Spätsommer.

Mehrbraten sind die beiden Fleischstreifen am hintern, inwendigen Theil des Rückgrates, welche beim Rindvieh Filet heißen. Wenn diese durchschossen werden, ist der Schuß stets tödtlich.

Meute ist eine Anzahl Hunde, die zum Hetzen des Wildes verwendet wird und meist zusammenjagt. Man hat dazu Sau-, Hirsch-, Fuchs- u. Hasenhunde.

Mutterwild nennt man das weibliche Hochwild.

Nachhängen heißt mit einem Schweißhunde am Riem eine Fährte verfolgen.

Nässen thut der Hirsch, wenn er harnt.

Naht ist die Stelle im Schloß des Wildes, wo dies zusammengewachsen ist. Beim Aufbrechen des Schlosses muß man diese genau in der Mitte mit dem Genickfänger verfolgen, da man daneben den Knochen nicht durchschneiden kann.

Neue ist frischer Spurschnee.

Niederthun sagt man vom Hochwilde, wenn es sich setzt.

Niederziehen thun die Hunde ein Stück Hochwild.

Nothröhre ist solche, die ein Fuchs oder anderer Erdbewohner sich gräbt, um darin nur einen vorübergehenden Aufenthalt zu nehmen.

Nuß ist das weibliche Glied des zur niederen Jagd gehörigen Wildes und der vierläufigen Raubthiere.

Paarzeit ist die, wo sich die zur niederen Jagd gehörigen Vögel begatten.

Parforcejagd ist solche, wo das zu jagende Wild wohl schneller ist, als die Hunde, es sich jedoch zuletzt aus Müdigkeit oder Gereiztheit stellt, und nach verzweifelter Gegenwehr von diesen gedeckt wird.

Paß nennt man den Stieg oder die Stelle, den das zur niederen Jagd gehörige vierläufige Wild öfters zu nehmen pflegt.

Perlen sind die kleinen Erhabenheiten an den Gehörnen.

Pfrim ist das männliche Glied der vierläufigen Raubthiere.

Pinsel nennt man den Haarbüschel am Ende der Scheide der Brunftruthe beim männlichen Hoch-, Schwarz- und Rehwilde.

Platzhirsch ist ein solcher, der vermöge seiner Stärke auf einem Brunftplatze keinen anderen schwächeren Hirsch duldet, sondern vom Rudel abkämpft.

Plätzen heißt vom Hoch- und Rehwilde, wenn dieses in der Brunftzeit an einer Stelle das Gras und Laub mit den Läufen fortscharrt.

Digitized by Google

Pürschen oder Waidwerken sagt man, wenn man im Walde umherschleicht oder fährt, um Hochwild zu erlegen, daher Pürschgang, Pürschwagen, Pürschwege ꝛc.

Pürzel ist der Schwanz des Dachses und Schwarzwildes.

Rammeln heißt begatten der Hasen und Kaninchen. Rammler heißt das Männchen, Häsin das Weibchen. Beim Kaninchen sagt man auch Bock statt Rammler.

Ranzen heißt begatten des vierläufigen ~~Haar~~wildes.

Rauben oder Reißen thut der Wolf und Fuchs, wenn er anderes Wild fängt.

Rauhzeit ist die, wo sich die Gänse und Enten mausern, d. h. das Gefieder wechseln, daher Rauherpel, wenn er nicht fliegen kann.

Rauschen, Rollen oder Brunften heißt das Begatten des Schwarzwildes.

Reihen heißt von den Enten und Gänsen sich begatten.

Reizen heißt Füchse und Katzen durch Nachahmen der Töne von Hasen und Mäusen anlocken.

Rose nennt man den rothen, warzigen Fleck um den Augen der hühnerartigen Vögel. Ferner den geperlten Ring an den unteren Enden der Hirschstangen.

Rotte sagt man von dem Schwarzwilde und Wölfen, wenn mehrere Stück beisammenstehen.

Rudel sagt man vom Hochwilde und den Sauen, wenn sich mehrere Stücke zusammenhalten.

Ruder sind die Füße der Schwimmvögel.

Ruthe ist der Schwanz aller vierläufigen Raubthiere.

Salzlecke ist ein Gemisch von Lehm und Salz, welches man in einen festen hölzernen Rahm einstampft, um das Hochwild anzulocken, und ihm ein Abführungsmittel zu geben.

Saufang ist eine fest umzäunte kleine Fläche im Walde, worin eine solche Vorrichtung (Stellung) angebracht ist, daß die Sauen sich darin von selber fangen.

Saufeder ist ein scharfes, spitzzulaufendes, zweischneidiges Eisen, an einem dicken Stil befestigt, um damit Sauen abzufangen oder auflaufen zu lassen.

Saugarten ist eine größere, feste Umzäunung im Walde, worin man Sauen längere Zeit einsperrt oder Frischlinge zieht.

Schalen sind die hornartigen Theile an den gespaltenen Klauen des Hochwildes, der Rehe und Sauen.

Schaufeln sind die Gehörne des Elch- und Damwildes.

Scheide heißt die Haut, womit das männliche Glied umgeben ist.

Digitized by Google

Scherzen sagt man vom Hochwilde, wenn es mit einander spielt, oder geringe Hirsche mit den Geweihen außer der Brunftzeit sich spießen.

Schild heißt die dicke Haut auf den Blättern des Schwarzwildes; auch die Flügeldeckfedern beim Fasan und der rothbraune Fleck auf der Brust der Rebhühner, an welchem man auch die Hähne erkennt.

Schlagen thut der Raubvogel, wenn er einen anderen Vogel in der Luft fängt. Der Dachs und Keiler schlagen, und zwar ersterer, wenn er beißt, letzterer, wenn er mit dem Gewehr um sich haut.

Schleichen thut der Jäger, wenn er vorsichtig pürscht und sich dem Wilde zu nähern sucht.

Schleifen ist der letzte Ton beim Balzen des Auerhahns, welcher dem Wetzen einer Sense ähnlich ist.

Schleppe ist ein künstliches Mittel, das Raubwild nach einer Falle, einem Eisen oder nach einer Luderhütte zu locken, indem man Gescheide ꝛc. an einen Bindfaden befestigt und im Revier weit umherschleppt.

Schloß nennt man die Knochenhöhle beim Haarwilde, durch welche der Mastdarm geht.

Schmälen sagt man von der Ricke, wenn sie Wind bekommt oder etwas vernimmt. Vom Bock sagt man Schrecken.

Schnalle ist das weibliche Glied aller Jagdhunde.

Schneider nennt man auch einen ganz geringen Hirsch.

Schnüren sagt man vom Haarwilde, wenn es die Fährten genau hinter einander setzt, wie der Fuchs, Wolf ꝛc.

Schof nennt man die von einer Gans oder Ente ausgebrüteten Jungen.

Schreien sagt man von den Hirschen in der Brunftzeit, wenn diese brüllende Töne ausstoßen. Der Rothhirsch orgelt und tränset auch.

Schürze nennt man die Haarbüschel am weiblichen Gliede der Ricken.

Schüsseln heißen die Ohren des Elch- und Rothwildes.

Schwarte ist die Haut des Dachses und des Schwarzwildes.

Schweiß hat alles zur Jagd gehörige Wild statt Blut.

Schweißhund ist ein solcher, mit dem man angeschossenes Hochwild und Sauen nachsucht und den Schweiß verfolgt.

Schwungfedern sind die ersteren großen Flügelfedern (meist 10—12 Stück) der Vögel, welche an der Handwurzel des Flügels sitzen. Nach ihrer Länge bestimmt man häufig mit die verschiedenen Species der Vögel.

Seher heißen die Augen der Hasen, Kaninchen und der vierläufigen Raubthiere.

Setzzeit ist die, wo das Hochwild und die Rehe Junge bringen; sie setzen, versetzen sagt man, wenn sie todte Junge zur Welt bringen.

Sichern oder Aeugen thut das Rothwild, wenn es nach einen verdächtigen Gegenstand hinäugt.

Digitized by Google

Spannhaut ist bei den Landvögeln das Häutchen, welches bis an das erste Zehengelenk reicht.

Spiegel heißt beim Hochwilde und den Rehen der hellere Rahm, welcher sich um das Waidloch herum bis auf den hinteren Theil der Keulen erstreckt; ferner der metallfarbene oder weiße Fleck der Enten auf den Flügeln und der weiße Fleck auf den Flügelecken des Auer- und Birkwildes.

Spiel ist der Schwanz des Fasan und Birkhahn.

Sprengen heißt ein Rudel Wild vereinzeln; auch sprengt man einen kranken Hirsch aus dem Bette, wenn er weiter zieht.

Sprung nennt man mehrere Rehe in einem Trupp zusammen.

Spur nennt man den Abdruck der Läufe des zur niederen Jagd gehörigen Haarwildes und des vierläufigen Raubzeuges.

Spüren heißt nach Fährten suchen. Man hat ein Stück Wild gespürt.

Stand heißt die Stelle, wo sich ein Jäger hinstellt, wenn er Wild erwartet; sei es beim Treiben oder beim Anstande; auch sagt man: das Wild hat seinen Stand in einem Forstorte, der Auerhahn auf einem bestimmten Baume.

Ständer heißen die Füße des eßbaren Federwildes, welche nicht zu den Schwimmvögeln gehören.

Standvogel ist ein solcher, der seinen Geburtsort nicht weit verläßt.

Standwild, was nicht weit auswechselt und seinen bestimmten Aufenthalt hat.

Stange ist der Haupttheil eines Geweihes beim Roth- und Rehwilde, an welchem die Enden sitzen.

Stechen sagt man vom Dachs und den Schnepfenarten, wenn diese Nahrung in der Erde suchen. Auch wenn ein Männchen der letzteren das Weibchen während der Paarzeit in der Luft verfolgt und treibt, so stechen sie sich, z. B. die Waldschnepfen.

Stehen sagt man vom Vorstehhunde, wenn er Wild in die Nase bekommt und stehen bleibt.

Steiß ist der Schwanz des Auer- und Birkwildes rc. Beim Auerhahn sagt man auch Stoß.

Stellen thut sich ein Stück Wild vor einem Hunde, wenn es sich zur Wehre setzt. Auch stellt man Jagdzeug, d. h. man richtet es auf; auch Fallen stellt man.

Stifte heißen beim Auerhahn die kleinen hornartigen Franzen an den Zehen der Ständer, diese verliert er, wenn die Balz zu Ende geht.

Stopfen thut man eine Meute Hunde, wenn man diese aufhält und sammelt.

Strecke heißt eine oder mehrere Reihen geschossenen Wildes nach Stärke und Gattung geordnet nach einer beendeten Jagd hinlegen.

Streifen heißt den Balg abziehen.

Digitized by Google

Strichzeit oder Zugzeit ist die, wo die Vögel fortziehen oder aus dem Süden wiederkehren. Auch nennt man so die Zeit des Abends, wenn Schnepfen, Enten ꝛc. umherziehen.

Strichvögel sind solche, die sich nicht weit von ihrem eigentlichen Aufenthalte entfernen.

Strick nennt man mehrere zusammengekoppelte Wind- und Hetzhunde.

Suhle nennt man die Stelle, wo sich Elch-, Roth- oder Schwarzwild im Sumpf, Morast oder an einer nassen Stelle wälzt, um sich abzukühlen.

Talg nennt man das Feist des Hochwildes, wenn es ausgebraten ist; Hirschtalg.

Thier nennt man das Weibchen vom Elen-, Roth- und Damwild.

Thränenhöhle ist die Vertiefung unter den Lichtern beim Elen-, Roth- und Damwild.

Tire haut (tirho) ist der Zuruf der Jäger, wenn Federwild gestrichen kommt.

Traben thut der Wolf und Luchs statt laufen.

Treiben sagt man vom Hirsch und Rehbock, wenn diese ein Thier oder eine Ricke umherjagen, um es zu beschlagen.

Tritt nennt man den einzelnen Eindruck, den das Hochwild beim Auftreten mit den Schalen und Ballen auf der Erde oder im Schnee zurückläßt.

Trupp sagt man von Trappen, wenn mehrere beisammen stehen.

Verbrechen thut man die Stelle, wo ein Stück Wild angeschossen ist, oder wo Schweiß liegt, indem man dieselbe durch einen abgebrochenen Zweig bezeichnet. Man verbricht den Anschuß oder eine Fährte.

Vereckt haben die Hirsche ihre Geweihe, wenn sie fertig ausgebildet sind.

Verenden thun alle jagdbaren Thiere in Folge eines Schusses, und gehen ein, wenn sie vor Alter oder durch Krankheit sterben.

Verhören thut man die Hirsche, den Auerhahn, die Rebhühner des Morgens und Abends, wo sie ihren Stand und Aufenthalt haben.

Verklüften oder Versetzen thut sich der Dachs und Fuchs im Bau, wenn sie die Röhre, worin sie liegen, mit Erde zuscharren, damit ihnen der Hund nicht folgen kann.

Vernehmen thut das Hochwild, wenn es etwas Verdächtiges bemerkt, sich sichert.

Verschießen thut sich ein Hund, wenn er die verfolgte Fährte verliert.

Vertraut ist das Wild, wenn es keinen Argwohn hat, vom Jäger verfolgt zu werden.

Digitized by Google

Wachshaut ist die an der Schnabelwurzel einiger Vogelarten sich befindliche, lederartige Haut, wie beim Schwan.

Wammen sind die Dünnungen beim Hoch-, Schwarz- und Rehwilde.

Wanst oder Pansen ist der Magen des Hoch- und Rehwildes.

Wechsel sind die Steige oder Stellen, welche das Hoch-, Schwarz- und Rehwild vorzugsweise zu nehmen pflegt, wenn es zur Aesung zieht oder getrieben wird.

Wechselwild, was nicht festen Stand hält, sondern auch andere Gegenden oder Reviere aufsucht.

Wedel heißt der Schwanz des Hochwildes.

Weidelöffel oder Lecker ist die Zunge des Hochwildes.

Weidwund ist ein Schuß, der durch den Wanst oder durch das kleine Gescheide gegangen ist.

Werfen oder Bringen heißt beim vierläufigen Raubwilde Junge gebären.

Widersinnig ist jedes Gehörn, welches nicht regelmäßig geformt ist.

Wiedergang heißt das Umkehren des Hirsches auf seiner eigenen Fährte.

Wildpret auch Wildbrät heißt das Fleisch aller zur Jagd gehörigen, eßbaren Thiere.

Witterung nennt man eine zusammengesetzte Masse, womit man Raubzeug an den Fangestellen anlockt und fängt. Auch sagt man: die Hunde haben Witterung vom Wilde, von der Fährte.

Wolle hat der Fuchs, Hase und das Kaninchen statt Haare.

Zeichen nennt man die Bewegung eines Stück Wildes, wenn es den Schuß bekommt. Der Hirsch machte ein gutes, ein schlechtes Zeichen.

Zerwirken oder Zerlegen heißt ein Stück Hoch-, Schwarz- oder Rehwild in Stücke zerschneiden, um diese für die Küche vorzubereiten. Die einzelnen Stücke sind außer der Haut, Kopf, Hals, Blätter, Bruststück, Wammen, Zimmer oder Ziemer und Keulen.

Ziehen thut das Hoch-, Schwarz- und Rehwild, wenn es langsam geht; legen oder rinnen thut das Elch-, Roth- und Damwild, wenn es durch das Wasser schwimmt.

Zugvögel sind solche, welche im Frühjahr weit aus dem Süden nach Deutschland kommen, hier oder weiter nördlich brüten und im Herbst wieder nach dem Süden ziehen, um dort zu überwintern.

Zwangtreiben ist das letzte Treiben bei Einrichtung eines eingestellten Jagens, wodurch man das Wild in einen engen Raum einschließt, um es beim Beginn der Jagd schnell auf den Lauf vor die Schützen zu bringen.

Zwerchfell ist die fleischige Haut, welche die Herzkammer vom Unterleibe trennt.

Digitized by Google

Wildfährten und Spuren.



Digitized by Google

Schwarzwild.

Gemse.

Reh.

Haase.

Wolf.

Digitized by Google



Digitized by Google

Digitized by Google

Das Haarwild.

Das Roth- oder Edelwild (Cervus elaphus).

Es ist das edelste aller zur Jagd gehörigen Wildarten und ein Wiederkäuer.

Die Kennzeichen desselben sind: 8 Vorderzähne im Unterkiefer, 12 Backenzähne oben und unten. Im Oberkiefer hat es auf jeder Seite einen Haken oder Kraneln und Kusen genannt. Beim Mutterwilde sind diese sehr viel kleiner als beim männlichen Wilde, und je älter ein Stück Wild oder Hirsch ist, desto dunkelbrauner sind sie von Farbe. Ein Gehörn trägt nur das Männchen und besteht dasselbe aus runden Stangen, welche mit Enden besetzt sind. Es hat Thränenhöhlen und einen Wedel von $1^1/_2$ Decimeter Länge. Das Gesäuge des Mutterwildes hat 4 Zitzen. Die gespaltenen Klauen an den Läufen bestehen aus zwei hornartigen Schalen und hinten über den Ballen sind schmale Afterklauen vorhanden.

Das Rothwild ist durch ganz Deutschland in größeren Waldungen verbreitet und nährt sich vom Laube und von den jungen Trieben aller Laub- und Nadelhölzer, besonders der Weiden, Haseln, Espen, Rüstern, Eichen und Buchen, allen Feld- und Waldfrüchten, Haidekraut, Gräsern, Pilzen, Moosen u. s. w. Es schält an Fichten, Kiefern, Eichen und Buchen, besonders bei mangelhafter, einseitiger Aesung. Im Winter nimmt es Heu, Erbs- und Bohnenstroh, Lupinen, Hafergarben, Kastanien, Eicheln, Bucheckern und Kartoffeln sehr gern an.

Digitized by Google

Die Farbe des Edelwildes ist rothbraun, im Winter faler und dunkler. Bei den Hirschen wird in der Brunftzeit der Bauch theilweise schwarz, und heißt die schwarze Stelle Brunftschild oder der Brand. Es giebt auch weißes Edelwild und Bläßwild, welches letztere häufig weiße Läufe hat. Die Färbezeit, d. h. die Zeit wo sie die Haare wechseln, ist im April und October. Die Brunftzeit ist in den meisten Gegenden von Mitte September bis Mitte October, jedoch differirt diese oft um 8—10 Tage, je nach der Gegend und der früher eintretenden rauhen Witterung. In dieser Zeit wechseln die älteren Hirsche 10—12 Meilen weit, wobei sie sich nicht an breite Flüsse kehren, um Mutterwild aufzusuchen. Die Hirsche kämpfen dann mit einander, durch Eifersucht dazu veranlaßt. Der Sieger beim Kampf heißt Platzhirsch und schlägt alle geringen Hirsche von seinem Rudel ab. Ein jagdbarer Hirsch kann 20—25 Stück Mutterwild sicher beschlagen. Das alte Thier geht 40 Wochen tragend und setzt Ende Mai und im Juni gewöhnlich 1 Kalb, sehr selten 2 Kälber, die bis im August weiß gefleckt sind. Das Rothwild kann sehr alt werden und sicher bis 50 Jahre.

Das Abwerfen der Gehörne geschieht im März und April. Ende Juli haben die Hirsche ihre neu aufgesetzten Geweihe wieder vereckt und fegen den Bast von denselben Anfang August ab.

Während der Brunftzeit schreien die Hirsche, besonders des Abends und Morgens bei rauhem Wetter. Sie suhlen sich dann in morastigen Wasserlöchern, um sich abzukühlen, und können Wasser nicht entbehren. Nach der Brunftzeit rudeln sich die stärkeren Hirsche wieder zusammen, bis sie im folgenden Jahre anfangen zu fegen.

Starke Hirsche stehen im Sommer und Winter fast niemals beim Mutterwilde und halten sich stets sehr heimlich.

Der Rumpf der Hirsche, die Form und die Stärke der Geweihe sind sehr von einander abweichend, je nachdem sie im Gebirge, in der Ebene und in fruchtbaren Gegenden leben und alt werden. Die Stärke der Hirsche hat an Gewicht und Gehörnen mit der

Digitized by Google

fortschreitenden Cultur in Deutschland sehr abgenommen. Dies hat seinen Grund darin, daß sie nicht mehr so alt werden, weniger Ruhe haben, und nicht mehr die freie, beliebige Aesung wie in alten Zeiten. Gegenwärtig ist ein Hirsch von über 200 Kilo ohne Aufbruch und von 16 Enden schon eine große Seltenheit, obwohl es immer noch einzelne alte Hirsche von obiger Schwere, sogar bis 22 Enden hin und wieder giebt. In Ostpreußen sind entschieden noch die stärksten Hirsche vorhanden.

Das weibliche Wild oder Thier heißt im Geburtsjahre bis Neujahr: Wildkalb, dann Schmalthier bis es beschlagen ist; dann Altthier, und wenn dies nicht beschlagen ist: Geltthier.

Das männliche Wild heißt im ersten Jahre bis Neujahr: Hirschkalb, im zweiten Jahr, bis es seine ersten Spieße vereckt hat: Schmalspießer, dann Spießer, und im dritten Jahre setzt er bei schlechter Aesung bisweilen nochmals aber stärkere Spieße auf, oder wird Gabler, oder bei guter Aesung auch 6-Ender. Im vierten und fünften Jahre wird er 6- bis 8-Ender und heißt bis dahin geringer Hirsch. Im sechsten und siebenten Jahre trägt der Hirsch gewöhnlich nochmals 8 Enden, doch finden auch Abweichungen hierbei statt. Später bekommt er 10 Enden und heißt dann jagdbar, von 12 Enden an nennt man ihn Kapitalhirsch. Stets werden die Rothhirsche nach Endenzahl angesprochen. Haben die Hirschstangen eine unegale Endenzahl, so zählt man die Enden an der Stange, an welcher die meisten Enden sich befinden, doppelt, und der Hirsch ist so z. B. ein ungerader 12-Ender, wenn er an einer Stange 6 und an der anderen nur 5 Enden hat. Hat ein Hirsch an beiden Stangen gleich viel Enden, z. B. 5, so ist er ein gerader 10-Ender. Als Ende wird noch gerechnet, wenn es so lang ist, daß man daran die Hornfessel oder einen Handschuh anhängen kann.

Derjenige Theil des Schädels, auf welchem das Geweih sitzt, heißt Rosenstock, und je kürzer dieser ist, je älter ist der Hirsch. Der krause, geperlte Ring am unteren Theil einer Stange heißt: Rose. Augensprossen heißen die Enden dicht über der Rose,

Digitized by Google

dann folgt die Eissprosse, dann die Mittelsprosse. Sind oben am Ende 3 und mehr Enden, so nennt man diese zusammen: die Krone, daher Kronenhirsch. Ein sehr alter Hirsch trägt ein gutes, braves oder kapitales Geweih. Nicht selten setzen diese, wenn sie über 10—12 Jahre alt sind, zurück, d. h. sie setzen weniger Enden an, als früher, dafür werden aber die Stangen und Enden stärker und länger.

Bisweilen sind die Geweihe widersinnig, d. h. nicht regelmäßig, sondern verkrüppelt gewachsen, was durch Verletzung am Körper, besonders des Kurzwildprets oder der Gehörne selber in der Kolbenzeit, wenn diese noch weich sind, seinen Grund hat. Die Form der Geweihe erbt sich auch fort, ebenso, wie die Widersinnigkeiten. In mehreren Gegenden kommen sogar gehörnlose Hirsche vor, was wahrscheinlich aus Mangel an abwechselnder, nicht kräftiger Aesung, oder durch Inzucht herrührt, da man sie hauptsächlich in eingefriedigten Wildgehegen, wo sie meist Haidekraut und schlechtes Gras äsen, antrifft. Wo im Winter die Hirsche mit Kastanien und Hafer gefüttert werden, oder wo es oft Eichel- und Buchelmast giebt, setzen die Hirsche die stärksten Geweihe auf.

Eine eigene Kunst des Jägers ist das richtige Ansprechen der Hirsche, und erfordert dies eine große Uebung. Man spricht dieselben entweder in Folge der Anschauung selber, oder nach der Fährte an. Die Stärke des Hirsches, die ganze Figur, besonders der Hals und Kopf, das Gehörn und die Farbe giebt den Anhalt, nach welchem man das Alter und Geschlecht ansprechen kann. Die Hirsche sind stärker, haben eine dunklere Farbe, einen dickeren Hals, der auch im Herbst und Winter mit längeren Haaren versehen ist, als das Mutterwild. Alle diese Merkmale und das Ansprechen des Wildes nach der Fährte werden Zeichen genannt, und nur der Jäger ist ein hirschgerechter zu nennen, der sich durch genaue Kenntniß und fortwährende Beobachtung des Wildes u. s. w. die Geschicklichkeit erworben hat, richtig und bestimmt danach anzusprechen. Natürlich wird dabei vorausgesetzt, daß er auch die

Digitized by Google

Jagd auf Hochwild waidgerecht zu handhaben und das Wild zu pflegen versteht.

Die hauptsächlichsten Kennzeichen, wodurch man den Rothhirsch vom Mutterwilde an der Fährte unterscheidet sind folgende:

Der Schrank oder das Schränken. Es besteht darin, daß, wenn der Hirsch feist ist, beim ruhigen Ziehen die Fährte der rechten und linken Läufe nie gerade hinter, sondern neben einander zu stehen kommen. Je weiter der Schrank ist, desto stärker und schwerer ist der Hirsch. Nur das tragende Thier schränkt auch auffallend stark. — Der Hirsch schreitet schon im vierten Jahre weiter aus, als das alte Thier, und heißt dies der Schritt.

Der Zwang oder die Zwänge. Diese entsteht dadurch, daß der Hirsch die in der Fährte zusammengepreßte Erde mit den Spitzen der Schalen und dem Ballen fest zusammenzieht. Die Ballen sind scharf abgedrückt und geben so das sicherste Zeichen einer Hirschfährte.

Der Burgstall. Dies ist eine in der Mitte der Fährte sich befindende kleine, gewölbte, der Länge nach ausgedehnte Erhabenheit, welche ebenfalls durch das feste Zusammenziehen der Schalen und des Ballen entsteht.

Das Fädlein ist in der Mitte des Trittes ein kleiner schmaler, erhabener, nach oben zugeschärfter Längsstreif, den man im feuchten Lehmboden deutlich sieht.

Der Kreuztritt entsteht, wenn die durch die vorderen Schalen gebildeten Fährten von den Fährten der hinteren Schalen gleichsam gespalten werden und sonach kreuzförmig erscheinen. In diesen Doppeltritten sind dann drei Ballen und nur drei Afterklauen abgedrückt.

Das Geäfter oder die Oberrücken drückt sich hinter den Tritten stumpfer ab, als beim Thier.

Der Hirsch hat stets stumpfere und vorn abgerundetere, breitere Schalenabdrücke, und heißen diese die Stümpfe. Beim Ziehen hält der Hirsch die Schalen vorn stets fest zusammen, das Thier dagegen spreizt die Schalen mehr auseinander. Auch tritt derselbe

Digitized by Google

sehr selten mit den Hinterläufen ganz in die Vorderfährte. Im Gebirge hat das Rothwild stets sehr stumpfe, abgerundete Schalen, doch ist die Fährte eines Hirsches schon im dritten Jahre allezeit stärker, als die eines starken alten Thieres, und drücken sich die Ballen besonders stark ab.

Der Hirsch schneidet mit den Schalen das grüne Gras und junge Getreide scharf ab, das Thier quetscht die Halme blos und heißt dies Zeichen: der Abtritt. Sind die Halme welk, so ist die Fährte alt.

Der Schloßtritt entsteht, indem ein Hirsch sich aus dem Bette erhebt, mitten in demselben einen Tritt macht und die Spitzen der Schalen tief abdrückt.

Das Schlagen und Fegen an den Bäumen und Sträuchern, auch Himmelsspur genannt, ist ein Zeichen, daß Hirsche vorhanden sind. Je stärker der Hirsch ist, an desto stärkeren Bäumen fegt er, und desto höher hinauf ist die Baumrinde abgeschlagen.

Endlich auch ist der Hirsch an der Losung zu erkennen.

Findet man sogenannte Fladen von Ende April ab, wie eine Faust groß, so rühren diese von einem starken Hirsche her. Ebenso die Losung in Zäpfchen im Mai und Juni, wenn diese weich sind. Ferner die Losung in starken Trauben im Juli, wenn diese runzelig und schleimig ist, und schließlich kennzeichnet den Hirsch, wenn die Losung im September und später aus vereinzelten Kötteln besteht und stark runzelig und gut verdauet ist.

Beiläufig ist hier zu bemerken, daß Hirsche, welche in kleineren, geschlossenen Räumen zum Vergnügen gehalten werden, in der Brunftzeit vom vierten Jahre ab sehr böse werden, und Jeden rücksichtslos forkeln, der sich ihnen nähert, selbst ihre Wärter. Es ist daher stets Vorsicht nöthig, wenn man sich ihnen nähert, da sie Menschen leicht tödtlich verwunden können.

Die Ausübung der Jagd auf Rothwild geschieht auf dem Anstande, dem Pürschgange, dem Pürschenfahren, bei Treibjagden und sehr selten noch durch Lancieren, d. h. ver-

Digitized by Google

folgen mit dem Leithunde, da diese Hunderasse fast ausgestorben ist.

Das Pürschen zu Fuß und zu Wagen ist unstreitig die interessanteste, aufregendste und waidgerechteste Jagdart. Beim Pürschen in der Brunftzeit lassen sich manche Hirsche durch Nachahmen von alten Thieren oder eines schreienden Hirsches anlocken. Das Anfahren des Wildes oder das Zutreiben durch einen Wagen im lichten Holze, ist eine besondere Kunst, die man nur durch aufmerksame Beobachtung des Wildes in seinen Manieren und durch langjährige Erfahrung lernt. Selbstredend muß man dabei sehr lokalkundig sein und die Wechsel des Wildes kennen.

Vor Allem muß man bei der Hochwildjagd den Wind strenge beobachten und den Stand des Wildes genau wissen.

Die Treibjagden können freie Treiben oder eingestellte Jagen sein. Letztere werden mit hohen Tüchern, Netzen, Lappen oder Culturgattern umstellt. Auch läßt man wohl von einzelnen Jägern Dickungen, worin Wild eingewechselt ist, stille abgehen oder mit einem Leithunde verfolgen, wobei die Schützen sich auf den Hauptwechseln vorstellen. Das Wild geht stets gern gegen den Wind, wenn es getrieben wird, und besetzt man daher auch die Rückwechsel, oder man treibt das Wild gegen den Wind, stellt vorn im Winde einzelne Treiber auf, und die Schützen alle hinter die durchtreibenden Treiber. Im Gebirge stellt man auch einzelne Schützen mitten durchs Treiben entweder in den Thälern und Schluchten oder auf den Bergrücken an. Sonst ist das Rothwild, wie auch Dam- und Schwarzwild schwer vor die Schützen zu bringen.

Jeder Jäger sollte sich bei der Jagd, besonders im Walde, niemals auffällig kleiden, damit das Wild ihn nicht so leicht äugt. Er muß alle zu dunklen und zu hellen Farben zu seinem Anzuge meiden und womöglich eine Baum-, Moos- oder Laubfarbe, sogenanntes Naturelltuch wählen und Mütze, Rock und Beinkleid von derselben Farbe nehmen. Die Fußbekleidung muß wasserdicht sein

Digitized by Google

und darf niemals knarren, da das Wild diesen Ton sehr weit vernimmt.

Beim Schießen auf ein Stück Hochwild muß man sich den Anschuß genau merken, auf den Kugelschlag achten und auf das Zeichen, welches das angeschossene Stück nach dem Schusse macht. Man verbreche den Anschuß mit einem Bruche und suche nach abgeschossene Haare und Schweiß. Ist die Kugel mitten durch die Herzkammer gedrungen und macht das Wild einen hohen Satz nach vorn zu und geht in voller Flucht davon, so findet man bald hellrothen, blasigen Schweiß, und kann in den meisten Fällen darauf rechnen, daß das angeschossene Stück nach höchstens 150 Schritten verendet ist. Es liegt dann fast immer auf der Seite, wo der tödtliche Anschuß geschah.

Ist der Schuß weidwund, d. h. durch den Wanst oder durch das kleine Gescheide gegangen, so schnellt das Stück mit beiden Hinterläufen zugleich aus und geht flüchtig mit gekrümmtem Rücken ab, thut sich aber gewöhnlich nach 200—300 Schritten nieder. Man findet dann wässerigen, hellen Schweiß und Geäß. Bei solchem Schusse lasse man dem kranken Stück mindestens zwei Stunden Ruhe, damit es kränke wird, ehe man mit dem Schweißhunde nachhängt, oder in Ermangelung dieses allein nachgeht, um einen zweiten, guten Schuß anzubringen.

Bei Keulenschüssen findet man in der Fährte dunkelrothen Schweiß, und ist der Knochen zerschossen, so wird das Stück Wild bald sehr krank. Laufschüsse markiren sich dadurch, daß das getroffene Stück beim ersten Satze nach dem Schusse vorn oder hinten zusammenbricht und der Lauf seitwärts schlenkert. Man findet dann immer nur drei Tritte, mehr hellrothen Schweiß, Knochensplitter und Marks. Bei solchem Schusse muß man das Stück sofort mit dem Hunde anhetzen oder ihm eine zweite Kugel geben, da es sonst weit fortzieht und immer besser ziehen oder trollen lernt. Bricht ein Stück unter dem Feuer zusammen, so daß es auf dem Rücken oder ganz zur Seite liegt, so ist der Halsknochen oder Rückgrat durchschossen oder gestreift. In beiden Fällen beeile man

Digitized by Google

sich, an das Stück heranzukommen, um ihm den Fang oder eine zweite Kugel zu geben, denn ist dasselbe blos am Rückgrat gestreift, oder eine Feder durchschossen, was man ja nie vorher weiß, so springt es bald auf Nimmerwiedersehen auf!

Einen jagdbaren Hirsch fängt man mit dem Hirschfänger hinterm Blatte ab, einen geringen Hirsch oder ein Thier mit dem Genickfänger im Genick.

Ist nun ein Stück Wild verendet, so ist es möglichst bald aufzubrechen, und verfährt man dabei folgendermaßen:

Ein Hirsch wird zunächst auf den Rücken gestreckt und das Geweih unter den Hals gebracht. Dann schärft man die Haut vom Drosselknopfe bis an den Brustkern auf, legt die Drossel und den Schlund ganz frei, löst den Drosselknopf ab und trennt den Schlund von der Drossel ganz los, durchsticht diesen mit dem Nickfänger der Länge nach etwa einen Finger lang vom Ende und zieht das Ende drei bis vier Mal durch die Oeffnung, und bildet so einen Knoten, damit beim Herausziehen des Gescheides kein Geäß herausquillt. Dann tritt man zwischen die Hinterläufe des Hirsches und löst das Kurzwildpret und die Brunftruthe heraus, indem man die Haut zwischen beiden Testickeln bis an das Ende der Scheide durchschärft. Dann schärft man die Haut bis zum Weidloch auf und durchschneidet das Wildpret darunter bis zum Schloß. Hierauf macht man in die Bauchmuskel dicht über dem Schloß eine kleine Oeffnung, sticht Zeige- und Mittelfinger der linken Hand in diese und legt die Spitze des Nickfängers zwischen beide Finger und schärft den Bauch, mit der linken Hand nachschiebend, bis zum Brustkasten auf. Nun nimmt man das Netz heraus, ergreift dann zwischen Wanst und Zwergfell den Schlund und zieht das Gescheide behutsam heraus, bevor man noch die Leber vom Wanst losgelöst hat.

Hierauf durchschneidet man das Schloß genau in der Mitte und löst den Mastdarm und die Blase heraus und sticht die Brandadern zu beiden Seiten der Keulen auf. Dann schärft man das Zwergfell von den Rippen ab, hebt den Hirsch vorn hoch

Digitized by Google

und läßt den Schweiß herauslaufen. Zuletzt ergreift man in der Herzkammer die Drossel und zieht diese mit dem Geräusch, d. h. Herz, Lunge und Leber, nach hinten heraus. Nun ziehe man das aufgebrochene Stück an eine schattige Stelle und decke es recht dicht mit Zweigen zu, besonders im Sommer und Herbst, damit keine Schmeißfliegen daran kommen können.

Das Zerwirken oder Zerlegen geschieht zu Hause, indem man die Meerbraten auslöst und das Gehörn abschlägt, dann das Stück Wild auswirkt, d. h. die Haut abzieht. Letzteres geschieht, indem man die Haut zuerst längs der Brust vollends aufschärft. Hierauf macht man einen ringförmigen Schnitt unter den Knieen der Läufe, und von hier aus schärft man die Haut an der inwendigen Seite, erst an den Vorderläufen bis zur Brust, dann an den Hinterläufen bis zum Wedel auf. Dann löst man die Haut allmälig von vorn nach hinten zu mit der zusammengeballten Faust vom Wildpret ab und bedient sich nur des Nickfängers, wenn die Haut fest angewachsen ist, wobei man sich vorsehen muß, nicht in dieselbe einzuschneiden. Letztere reibt man mit Asche, Salz oder Alaun ein und hängt sie an einem luftigen Ort über einer Stange auf. Zuletzt löst man die Blätter, Keulen, den Kopf, Hals, das Bruststück und die Wammen vom Zimmer- oder Ziemer ab, und dies theilt man gewöhnlich noch in zwei oder drei Theile, und zwar in das Vorder-, Mittel- und Hinterzimmer.

Das Damwild (Cervus dama).

Die Kennzeichen, Jagdart, Nahrung und Jagdausdrücke u. s. w. hat es mit dem Rothwilde in der Hauptsache gemein, nur fehlen ihm die Haken im Oberkiefer, und die Geweihe sind vom vierten Jahre ab nach oben schaufelförmig mit endenartigen Fortsetzungen nach hinten zu gebildet und werden Schaufeln genannt. Das Damwild ist sehr viel kleiner und hat einen verhältnißmäßig

Digitized by Google

längeren Wedel als das Rothwild. Im Sommer hat es eine hellrothe Farbe mit kleinen runden, weißen Flecken, fast über den ganzen Körper, hat einen fast schwarzen Strich auf dem Rücken und einen weißen Längsstrich an den Seiten. Im Winter färbt es sich dunkelbraun, und sind die Läufe und der Bauch stets weiß. Der Wedel ist dunkelbraun und hat einen weißen Rand. Die Färbezeit ist im Juni und Anfang October. Es giebt auch schwarzes und weißes Damwild, was seine Farbe im Sommer und Winter nicht ändert. Es ist von Asien nach Europa versetzt, in Deutschland überall verbreitet, nur nicht im Gebirge, und hält sich weit besser in Kiefernheiden als das Rothwild, da es mit dürftigerer Aesung vorlieb nimmt. Dennoch wird es sehr feist, und die Hirsche haben nicht selten in der Feistzeit drei Centimeter hohes Feist auf dem Rücken. Das männliche Damwild ist vom zweiten Jahre ab stärker als das Mutterwild, und ein guter Schaufler in der Feistzeit wiegt ohne Aufbruch in freier Wildbahn zwischen 70 und 90 Kilo. In Holstein giebt es das stärkste Damwild, und finden sich dort Schaufler, welche in der Feistzeit über 100 Kilo ohne Aufbruch wiegen.

Die Brunftzeit ist in den meisten Gegenden von Ende September bis Anfang November. Das Wild hat dann seine bestimmten Brunftplätze, wohin die Hirsche wechseln und bisweilen auch, wenn sie nicht gestört werden, am Tage stehen bleiben. Die Brunftplätze machen sich dadurch kenntlich, daß die Schaufler 3 Dm. Tiefe und $1^1/_4$ Meter weite Löcher scharren, worin sie sich am Tage niederthun und abkühlen. Suhlen thut sich das Damwild nicht und kann auch Wasser eher entbehren als das Rothwild. Die Schaufler kämpfen in der Brunftzeit sehr eifrig mit einander, und nicht selten bleibt ein Schaufler verendet auf dem Kampfplatze. Sie schreien dann, und ist der Ton ein kurz abgebrochener, mehr rollender Laut. Die Spießer brunften nicht. Das Mutterwild wird ebenso genannt, wie das Rothwild. Das männliche Wild nur bis zum dritten Jahre ebenso. Vom Herbste des dritten bis fünften Jahres heißt es geringer

Digitized by Google

Hirsch oder Schaufler; vom sechsten bis achten Jahre Halbschaufler und später starker Schaufler oder Kapitalhirsch, also nicht nach Endenzahl, sondern nach der Breite der Schaufeln angesprochen. Die Hirsche werfen Ende Mai und Juni die Schaufeln ab, und fegen die neu aufgesetzten Ende August und Anfang September. Die Augensprossen haben sie wie die Rothhirschgeweihe, und sind diese die alleinigen, richtig ausgebildeten Enden; die anderen, mehr oder weniger stumpfen Enden haben keinen besonderen Namen. Die Fährte ist im Verhältniß zu ihrer Breite lang und nur an den stärkeren Tritten ist der Hirsch vom Thier zu unterscheiden, denn nicht immer sind diese vorn abgerundeter und gezwängt. Sonst giebt es an der Fährte keine Unterscheidungszeichen. Das Damwild hat die Eigenschaft, wie keine andere Wildart, daß es bisweilen, wenn es flüchtig wird, lange Strecken mit allen vier Läufen zugleich auftritt und sich in großen Sätzen so fortschnellt. Ferner giebt das Mutterwild und die Kälber im Herbste beim Treiben, wenn es sich zusammengerudelt hat und unruhig umhertrollt oder zieht, einen lauten, klagenden Ton von sich, auch leidet es mehr wie alle anderen Wildarten vom Milzbrande. Alles Uebrige gilt auch vom Damwilde, was beim Rothwilde schon erwähnt ist.

Das Elch- oder Elenwild (Cervus alces).

Es ist der größte hirschartige Wiederkäuer und hat auch Thränenhöhlen. Die Zahnbildung ist wie beim Damwilde, also auch ohne Haken. Der Hirsch, auch Schaufler genannt, setzt im vierten Jahre und später ein schaufelförmiges, am äußeren Rande mit Enden besetztes Geweih auf, welches nach den Seiten zu steht und bauchig gebogen ist. Je älter ein Hirsch ist, desto breiter werden die Schaufeln, und desto mehr Enden setzt er an.

Unter der Drossel (Kehle) haben beide Geschlechter einen

Digitized by Google

lang behaarten, hautartigen Beutel, welchen man Bart nennt, und welcher beim Hirsch bis 18 Cm. lang wird. Beim Mutterwilde ist er stets kürzer. Der Kopf ist groß und lang und wird nach vorn zu geradeaus getragen. Die Läufe sind hoch und mit großen Schalen versehen, weshalb das Elchwild sich sehr stark spürt. Ebenso hat es starke, abgerundete Afterklauen. Das Gewicht eines etwa zehn Jahre alten Hirsches schwankt zwischen 360 und 500 Kilo. Der Hirsch wird über 2 Meter hoch, von den Schalen bis zum Widerrist 'gemessen. Seine Länge beträgt vom Brustkasten bis am Ende des nur 5 Cm. langen Wedels circa $2^1/_3$ Meter, wobei zu bemerken ist, daß das hiesige Elchwild größer und stärker ist, als in dem benachbarten Rußland.

Die Farbe ist schwarzbraun, im Sommer mehr hellbraun, nur die Läufe und der Bauch sind weiß oder weißgrau, und färbt es sich im April und October. Seine Aesung besteht aus Blättern, Nadeln und jungen Trieben fast aller Laub- und Nadelhölzer, vorzugsweise liebt es Werftweiden, es äset aber auch Heidekraut, Baumrinde und die jungen Schößlinge des Rohres.

Das Elchwild kommt in Deutschland nur in Ostpreußen vor und lebt dort meistens in den großen Erlenbrüchen in der Nähe des Kurischen Haffes. Die Brunftzeit ist im September, wo die Schaufler sehr 'erbittert mit einander kämpfen. Sie suhlen sich und können Wasser nicht entbehren. Das alte Thier geht 40 Wochen tragend, setzt ein und zwei, bisweilen drei Kälber. Starke Hirsche werfen die Schaufeln im December ab, geringe oft erst im Januar. Sie fegen den Bast von den Schaufeln im Juli und August ab. Sie schreien in der Brunftzeit besonders des Nachts und bei rauhem Wetter. Das Schreien ist ein kurz rollender, etwas melancholischer, nicht sehr kräftiger Ton.

Das Weibchen wird je nach dem Alter ebenso genannt, wie das weibliche Rothwild. Das männliche Wild nur bis zum Sommer des dritten Jahres ebenso, denn dann heißt er Gabler (was der Rothhirsch nicht immer wird). Vom vierten Jahre ab bis siebenten Jahr ist er 6- bis 8-Ender oder geringer Schaufler.

Digitized by Google

Von 10 Enden ab, die er erst nach dem achten Jahre ansetzt, wird er jagdbar und heißt dann starker Schaufler und später Kapitalhirsch, nach Endenzahl angesprochen, die er bis 24 ansetzt, wenn er ein hohes Alter erreicht.

Die gespaltenen Klauen an den Läufen bestehen aus zwei großen Schalen, sind beim Hirsche bisweilen etwas abgestumpfter, als beim Thier. Auch hält er dieselben beim ruhigen Ziehen auf hartem Boden mehr zusammen, wohingegen das Thier diese stets auseinanderspreizt. Im Allgemeinen aber kann man an der Fährte den Hirsch vom alten Thiere nicht mit Bestimmtheit unterscheiden. Man hat nicht die sicheren Kennzeichen bei der Fährte, wie beim Rothwilde. Wenn der Hirsch die Schaufeln abgeworfen hat, so erkennt man ihn an dem Pinsel, (ein Haarbüschel am Ende der Scheide der Brunftruthe), dem langen Haarkamm auf dem Widerrist und an dem Rosenstock auf dem Kopfe.

Das Elchwild wird meistens auf der Treibjagd erlegt, wegen seines schwer zugänglichen Standortes, und weil es die Wechsel sehr gut hält, wenn es angeregt wird. Auch läßt es sich besser vorwärts treiben, wie anderes Hochwild. Man kann es jedoch auch beim Pürschenfahren, selten beim Pürschengehen erlegen, besonders bei Schnee, wenn das Wild seinen Stand im Winter in einem alten zu befahrenden Forstort genommen hat, wo es einen Wagen und Schlitten gut aushält.

Beim Treiben bleibt das Wild, wenn es hoch gemacht ist und vorwärts zieht, jeden Augenblick stehen, horcht und windet, ist langsam in seinen Bewegungen, und äugt oft den Jäger längere Zeit erst an, selbst wenn dieser ganz frei steht, ehe es wieder flüchtig wird oder umdreht; daher ist es auch bei einiger Ruhe des Schützen nicht schwer zu schießen. Es hat aber eine große Lebenskraft, und die Hirsche gehen mit den besten Blattschüssen oft noch 400 Schritte weit durch die dichsten und morastigsten Bestände, ehe sie zusammenbrechen und verenden, weshalb man gut thut, einem einmal angeschossenen Hirsch, wenn irgend möglich, gleich eine zweite Kugel zu geben. Man erspart sich dadurch häufig eine große

Digitized by Google

Mühe, weil es immer schwer ist, ein solch starkes Thier aus dem Bruche bis zu einem Wege zu transportiren.

Alles Uebrige gilt auch vom Elchwilde, was beim Rothwilde gesagt ist.

Das Rehwild (Cervus capreolus).

Die Zahnbildung ist wie beim Damwilde, nur sehr selten und ausnahmsweise kommen im Oberkiefer Haken vor. Es gehört zu den Wiederkäuern, aber Thränenhöhlen fehlen und hat keinen äußerlich sichtbaren Wedel. Die Farbe ist rothbraun und der Spiegel weiß. Im Winter hat es ein sehr viel dichteres und längeres Haar, wie fast alle vierläufigen Wildarten, und ist die Farbe dann mehr graubraun. Die Haare wechselt es im Mai und October. Es giebt ganz schwarze, weiße und gescheckte Rehe, doch brunften die verschiedenfarbigen unter einander, und fallen die Kälber, wie beim Roth- und Damwilde, gewöhnlich nach der Farbe des Männchens. Schwarze Rehe giebt es in größerer Anzahl nur in der Königl. Oberförsterei Haste in der Provinz Hessen. Sie stammen aus Portugal und sind zuerst im angrenzenden Fürstenthum Bückeburg ausgesetzt, von wo aus sie sich verbreitet haben. Einzelne schwarze Rehe kommen noch in der Provinz Hannover und in der Altmark vor, doch noch niemals haben sie das rechte Elbufer betreten. Weiße Rehe giebt es besonders in Mecklenburg und im Regierungsbezirk Merseburg, Provinz Sachsen. Die übrigen rothbraunen Farben sind über ganz Deutschland verbreitet. Das Reh lebt lieber in ebenen Laubholzwaldungen, wo Felder und Wiesen in der Nähe sind, als im Gebirge und großen öden Nadelholzrevieren. Im Sommer steht es gern im Getreide, doch wechselt es nicht sehr weit von seinem Geburtsorte aus. Je weiter nach Norden und Osten, desto stärker ist das Rehwild; denn es giebt in Ostpreußen Böcke, die ohne Aufbruch noch 30—35 Kilo wiegen. Die stärksten Böcke haben nicht immer die stärksten Gehörne, denn z. B. in

Digitized by Google

Schlesien sind die Böcke nicht so schwer wie in Ostpreußen und dennoch haben sie bisweilen ganz enorm starke Gehörne. Das Reh nährt sich ganz wie das Rothwild, nur schält es nicht. Im Winter bei Schnee nimmt es die Knospen und äußersten Zweigspitzen von Eichen, Espen und Weiden, Erbs- und Bohnenstroh, Lupinen und Hafergarben an, Heu jedoch fast niemals.

Die Brunftzeit ist von Mitte Juli bis Mitte August, in welcher Zeit der Bock mehrere Ricken und Schmalrehe beschlägt. Er treibt sich gewöhnlich mit einer Ricke so lange umher, bis sie nicht mehr brunftig ist, dann erst sucht er ein anderes Reh und verläßt auch seinen Standort auf einige Zeit. Erst nach der Brunft leben die Rehe gesellig in einem Sprunge von 3—10 uhd noch mehr Stücken, wobei die Ricken mit den Böcken zusammenbleiben bis zur Setzzeit. Die Ricke geht 10 Monate tragend, und das Embryo ist mit bloßen Augen erst im Januar sichtbar.

Hieraus ist der frühere Irrthum entstanden, daß man glaubte, die Rehbrunft sei im December, bis man endlich das kleine schlafende Embryo schon im October entdeckte. Die Ricke setzt im Mai 1—3, meistens aber zwei Kälber, die kleine weiße Flecke über den ganzen Körper bis Ende Juli haben. Das Rehwild vermehrt sich ziemlich schnell, doch wird es vom Raubzeuge, durch Krankheiten und durch strenge Winter sehr decimirt.

Die Böcke werfen die Gehörne im November ab, und bis Ende April haben sie wieder vollständig aufgesetzt und fegen dann den Bast ab, was jedoch nach der Gegend und Witterung um 14 Tage differiren kann. Widersinnigkeiten bei der Gehörnbildung sind nicht selten, und einen krankhaften Zustand zeigen sogenannte Perrückengehörne, die aus einer porösen, knochenartigen Masse bestehen, mit vielem Schweiß angefüllt und mit einer lappigen, behaarten Haut bedeckt sind, an der kleine Schweißgefäße, wie Berlocks herunterhängen. Meistens gehen die Böcke daran ein, wenn sie nicht geschossen werden.

Das weibliche Rehwild heißt bis Neujahr des ersten Jahres: Kitzchen oder Rehkalb, dann Schmalreh, und wenn es be-

Digitized by Google

schlagen ist: Ricke oder Altreh. Ein altes Reh, was nicht mehr beschlagen ist, heißt Gelte Ricke.

Das männliche Reh heißt bis Neujahr: Bockkalb oder Rehkalb, dann Schmalbock, Spießbock, Gabelbock, Sechserbock, starker oder Kapitalbock.

In den meisten Fällen setzen die Böcke erst vom vierten Jahre ab 6 Enden an und nur sehr selten mehr. Ausnahmsweise setzen die Bockkälber schon im Herbst ihres Geburtsjahres kleine 3 Cm. lange Spieße auf, setzen aber dann im zweiten Jahre nochmals Spieße, aber längere auf. Dies kommt gewöhnlich nur in fruchtbaren Gegenden vor, und wo die Kälber eine sehr gute Mutter hatten. Auch zahme Rehkälber setzen oft schon im ersten Jahre kleine Spieße auf, wenn diese gut gepflegt und mit Hafer gefüttert werden. Selten setzen auch die Ricken Gehörne auf.

An der Fährte kann man den Bock von der Ricke nicht unterscheiden. Hat er abgeworfen, so erkennt man ihn an dem Pinsel, auch ist er meist stärker, dunkler und hat einen dickeren Kopf. Die Ricke hat am Geschlechtstheil im Spiegel einen nach hinten stehenden Haarzopf, den man Schürze nennt.

Gezähmte Rehböcke werden im dritten Jahre stets sehr böse und sind für Menschen durch ihr spitzes Gehörn sehr gefährlich.

Was bei Ausübung der Jagd u. s. w. beim Rothwilde gesagt ist, gilt auch hier, nur sucht man ein angeschossenes Reh gewöhnlich mit einem Hühnerhunde nach. Man schießt die Böcke in der Brunftzeit auch beim Blatten, indem man sie dadurch anzulocken sucht, daß man den Ton eines Schmalrehes nachahmt. Häufig springen aber auch dabei Ricken, und muß man sehr vorsichtig sein, daß man sich nicht irrt und glaubt einen Bock vor sich zu haben. Die Ricken, welche springen, müssen glauben, daß das Blatten von einem Kitzchen herrührt, welches ihrer Hülfe bedarf. Bei dieser Jagdart muß man ohngefähr wissen, wo die Böcke ihren Stand haben, was sich durch das Plätzen auf der Erde und Schlagen mit dem Gehörn an Sträuchern oder kleinen Pflanzstämmchen

Digitized by Google

verräth. Man wähle zu dieser Jagd die Zeit vom 26. Juli bis 12. August, und womöglich an einem schwülen, warmen Tage in den Vormittagsstunden von 9 bis 1 Uhr; stelle sich stets recht verdeckt mit gutem Winde auf, da alte Böcke oft sehr vorsichtig angeschlichen kommen, kreisen und winden. Haben die Böcke Ricken bei sich, so trennen sie sich nicht gern von diesen, oft kommt aber zuerst eine Ricke an, und folgt dann der Bock sicher. Bei dieser Gelegenheit kann man meist eine Kugel anbringen.

Die waidmännischen Ausdrücke sind fast überall dieselben, wie beim Rothwilde, nur daß man Sprung statt Rudel sagt, wenn mehrere Stück in Gesellschaft vereinigt sind, und daß der Bock im Sommer und Herbst schreckt, die Ricke schmält, wenn sie Wind vom Menschen bekommen, oder plötzlich etwas Ungewöhnliches vernehmen und dann einen lauten Ton ausstoßen. Das Aufbrechen, Zerwirken u. s. w. geschieht ebenso, wie beim Rothwilde.

Das Gemswild (Antilope rupicapra).

Es gehört zum Geschlecht der Antilopen, sind Wiederkäuer und haben Thränenhöhlen. Die Zahnbildung ist wie bei den Rehen. Der Wedel ist circa 10 Cm. lang, und am Gesäuge haben sie vier Zitzen. Beide Geschlechter haben Hörner, die vom zweiten Jahre ab oben hakenförmig gekrümmt sind und spitz und glatt auslaufen. Diese heißen Krickel, sind hohl, sitzen auf einem Stirnzapfen und werden nicht abgeworfen, sondern wachsen von Jahr zu Jahr länger bis $1^3/_4$ Dm. hoch. Hinter jedem Krickel befindet sich eine kleine Vertiefung mit einer Drüse, die beim Bock in der Brunftzeit anschwillt und einen unangenehmen Geruch hat. Sie haben eine nackte Nasenscheidewand und nackte Stelle über der Oberlippe. Die Farbe ist im Sommer rothbraun, der Bauch gelblich, Kehle fahlgelb, längs des Rückens haben sie einen schwarzbraunen Streifen, der Nacken ist weißgelb. Von den Lichtern bis

Digitized by Google

zum Geäse ist ein schwarzer Backenstrich vorhanden. Der Wedel ist oben schwarz. Im Winter sind sie dunkler und mehr schwarzbraun. Bauch und Läufe sind heller, die Haare dann sehr lang. Auf dem Widerrist und Rücken haben besonders die Böcke bis $1^1/_2$ Dm. lange Haare, die den Gemsbart bilden und sehr elektrisch sind, was man bemerkt, wenn man diese durch die Finger streicht. Die Jungen sind stets von hellerer Farbe und mehr rothbraun. Die Färbezeit ist im Mai und October. Weiße und gescheckte Gemsen sind sehr selten.

In Deutschland kommen die Gemsen nur in den baierischen Hochalpen vor. Sie nähren sich von Gräsern, Kräutern, Knospen der Laub- und Nadelhölzer, der Alpenrosen und mehreren Moosen und Flechten.

Im Wanst der Gemsen findet sich bisweilen eine äußerlich glatte, teichartige, schwarzbraune Kugel von der Größe einer Wallnuß, die aus unverdauten, faserigen Vegetabilien besteht und einen eigenthümlichen Geruch hat.

Die Brunftzeit ist Ende October und Anfang November, wo die Böcke mit einander kämpfen, und beschlägt der Bock diverse Geis, die er vielfach umhertreibt, ehe er dazu gelangt. Außer der Brunftzeit stehen die alten Böcke, die auch Lauberböcke heißen, allein, und während derselben sind sie beim Mutterwilde, wo sich Rudel von 10—30 Stück zusammenziehen. Die Geis geht 21 Wochen tragend und setzt dann 1, selten 2 Kitz zu Ende des April und im Mai. Der Bock ist im Herbst und Winter nur in nächster Nähe von der Geis zu unterscheiden und eine alte gelte Geis fast gar nicht, nur wenn bei einer einzelnen Gemse ein Kitz sich befindet, ist es sicher eine Geis. Die Böcke sind stärker und dunkler als die Geis, auch sind die Krickeln der Böcke höher und stärker und stehen mehr nach auswärts gebogen, wogegen die der Geis mehr parallel stehen. Auch an der Fährte ist der Bock nicht von der Geis zu unterscheiden. Beide spüren sich stets mit gespaltenen Schalen. Die Gemsen springen und klettern vermöge ihrer starken und kräftigen Läufe an den steilsten Felsen herauf

Digitized by Google

und herunter mit großer Sicherheit. Im Sommer haben sie ihren Stand meist in den höchsten Bergen, bis zur ewigen Schneeregion, im Winter halten sie sich mehr unten in den geschützten Thälern auf den Südhängen.

Bei jedem Rudel ist eine alte Geis, die man Vorgeis nennt, welche dasselbe stets anführt und bewacht. Bemerkt solche Vorgeis oder auch eine andere Geis etwas Verdächtiges, oder bekommt sie Wind von Menschen, so stößt sie einen weit hörbaren Pfiff aus, um so die nöthige Flucht des Rudels anzudeuten. Sie winden und äugen sehr scharf und sind überhaupt sehr scheu, wachsam und klug, weshalb die Gemsenjagd stets sehr schwierig und mühsam ist. Die Gemsenjäger müssen mühsam, zähe, muskulös, wetterfest, mit guten Lungen versehen und sowohl mit dem Gebirge, als auch mit der Lebensweise der Gemsen vertraut sein. Selbstredend auch gute Schützen.

Die Ausübung der Jagd geschieht von Ende Juli ab beim Pürschgange, selten durch den Anstand, meistens durch Treiber, wobei sich die Jäger auf die sicheren Wechsel an den Felsen oder in Schluchten mit gutem Winde sehr versteckt anstellen. Bei klarem Wetter steigt im Gebirge die Luft nach oben und stellt man sich dann auf den Kämmen der Berge an, bei trübem Wetter schlägt der Wind nach unten und stellt man sich in diesem Fall tief in die Thäler und Schluchten, damit die Gemsen nicht Wind bekommen.

Die waidmännischen Ausdrücke, das Aufbrechen u. s. w. sind sonst dieselben, wie bei dem übrigen Hochwilde.

Das wilde Schwein oder Schwarzwild (Sus ferus).

Der Kopf ist lang und mit einem scharf abgeschnittenen Rüssel versehen, welcher Gebrech heißt. Der Hals ist kurz und der Körper gedrungen, hat einen dünnen, mit langen Borsten versehenen Pürzel (Schwanz) von 2 bis $2^1/_2$ Dm. Länge und kurz

Digitized by Google

anliegende Gehöre. Im Oberkiefer hat es vier einander zugekehrte und dahinter zwei kleinere, scharfe Vorderzähne, dann kommen zwei lange nach außen gekrümmte Eckzähne; dicht dahinter folgen auf jeder Seite sieben Backenzähne, die oben und unten nach hinten zu immer breiter und stärker werden. Im Unterkiefer sind vier lange und zwei kurze nach vorn zu gerichtete Vorderzähne vorhanden, dann folgen die Eckzähne, die beim Keiler besonders scharf, spitz, lang und dreikantig sind. Diese heißen beim Keiler Gewehre, bei der Bache Haken. Die Gewehre des Keilers wachsen von Jahr zu Jahr, und kann man bei einiger Uebung auch nach der Stärke, Länge und Abgenutztheit derselben, namentlich der im Oberkiefer, etwa bis zum achten Jahre das Alter der Keiler bestimmen. Eine eigenthümliche Erscheinung ist, daß die Gewehre des Unterkiefers sich an denen des Oberkiefers abschleifen und nachwachsen, wie die Schneidezähne der Nagethiere. Sie wachsen sogar auch wieder nach, wenn sie beim Kämpfen oder sonst zufällig abbrechen, oder ihnen abgesägt, d. h. rasirt werden. Die Eckzähne im Oberkiefer wachsen nicht wieder nach, denn wenn man z. B. einen überlaufenen Keiler (der also über 1 Jahr alt ist) die Eckzähne im Oberkiefer ausbricht, so erneuern sich diese nicht, und da dann die Gewehre des Unterkiefers sich nicht mehr abschleifen können, so wachsen diese dann so hoch und gekrümmt heraus, bis sie das Gebreche erreichen.

Das Gesäuge, welches längs des Bauches sitzt, hat fünf bis sechs Paar Zitzen, wovon gewöhnlich nur so viele Milch haben und angeschwollen sind, als Frischlinge vorhanden sind.

Die Klauen bestehen aus zwei gespaltenen Schalen, von denen bei jungen Schweinen gewöhnlich die äußere länger ist. Auch haben sie stumpfe Afterklauen an allen Läufen, die sehr nach auswärts gerichtet sind.

Die Farbe ist schwarz oder graustichelig. Die Frischlinge sehen bis im October röthlich aus und haben gelbliche Streifen über den ganzen Körper. Es giebt auch ganz weiße Sauen, die rothe Lichter und weiße Schalen haben. Auch kommen graue,

Digitized by Google

schmutzigweiße, ins Gelbliche übergehend, mit einzelnen schwarzen, runden Flecken über den ganzen Körper vor.

Die Borsten der Haut oder Schwarte sind auf dem Rücken oder Kamm besonders lang und stehen am Unterhalse und Hinterbauche nach vorn zu gerichtet. Unter den Borsten befindet sich im Winter ein dickes, wolliges Haar.

Das Schwarzwild ist in ganz Deutschland, sowohl im Gebirge als in der Ebene verbreitet, dabei wechselt es 10 bis 15 Meilen weit von einer Gegend zur andern, wenn es öfter beunruhigt wird oder Mangel an Nahrung hat. Es hält sich meist in den größeren Waldungen auf und liebt sehr die Brücher, da es sich gern suhlt und nicht ohne Wasser existiren kann. Im Walde macht es sich dadurch sehr nützlich, daß es Larven, Puppen und Mäuse in großer Menge vertilgt.

In größerer Anzahl kommt das Schwarzwild nur noch in eingefriedigten Wäldern und Parks vor, da ihm im Freien überall wegen des Schadens, den es den Feldern zufügt, sehr nachgestellt wird.

Sein Fraß (Nahrung) besteht aus Vegetabilien und animalischen Stoffen. Es nimmt alle Wald- und Feldfrüchte, Obst, Pilze, Gras, Puppen, Würmer, Mäuse, selbst lebende Kälber des Hoch- und Rehwildes, Fallwild und Luder.

Die Brunft-, auch Rausch- und Rollzeit genannt, ist von Ende November bis Anfang Januar. Die starken Keiler stehen das ganze Jahr meist allein, sind sehr heimlich, treten in der Brunftzeit zum Rudel und schlagen die schwächeren Keiler ab, wobei es oft zu den heftigsten Kämpfen kommt. Die Bache frischt 16 Wochen, nachdem sie gebrunftet hat, 2 bis 10 Frischlinge im März und April. Je älter eine Bache ist und je bessere Nahrung sie hat, desto mehr Frischlinge hat sie. Bei guter Nahrung frischen die alten Bachen bisweilen zum zweiten Male im September, und vermehren sich überhaupt sehr schnell, wenn die Bachen stets geschont werden. Nach dem zwölften Jahre frischen sie gewöhnlich nicht mehr und werden dann gelte. Das Schwarzwild kann ein Alter von circa 25 Jahren erreichen, und die Eck-

Digitized by Google

zähne der Keiler im Oberkiefer schleifen sich immer mehr ab und werden mit dem Alter kürzer und ganz stumpf.*)

Das Schwarzwild heißt im ersten Jahre bis Neujahr Frischling, im zweiten Ueberläufer, dann zwei- und dreijährige Bache oder zwei- und dreijähriger Keiler. Später heißen die Bachen: starke Bachen.

Wenn ein Keiler 4 Jahre alt ist, heißt er: angehendes Schwein, und wenn er 5 Jahre alt oder älter ist: Haupt- oder hauendes Schwein.

An der Fährte kann man den Keiler nicht von der Bache unterscheiden, und erkennt man den Keiler an dem Pinsel und an den Gewehren. Auch ist seine ganze Figur gedrungener. Von der Rothwildfährte unterscheidet sich die Fährte des Schwarzwildes dadurch, daß die Afterklauen sich immer in der Erde oder im Schnee deutlich und nach auswärts stehend und stumpf abdrücken.

Die Jagd auf Sauen wird ausgeübt: auf dem Anstande, der Treibjagd, mit einem Saufinder oder durch Parforcejagd. Endlich fängt man die Sauen auch in Saufängen, um sie in denselben todtzuschießen, oder auch, um sie lebendig wo anders hin zu transportiren.

Das Fangen der Sauen ist im Winter bei Frost und Schnee nicht schwierig, wenn diese ganze Angelegenheit richtig gehandhabt wird.

Will man in einem Saufange die Sauen lebendig fangen, so geschieht dies in einem mit Luftlöchern durchbohrten starken Kasten, der auf einer Seite eine Schiebethür hat. Solchen Kasten schiebt man an die Fallthür des Saufanges dicht heran; ein Mann stellt sich auf den Kasten und schiebt den Schieber desselben hoch und ein anderer zieht die Fallthür hoch, dann fährt die Sau bald von selber in den Kasten, weil sie glaubt, daselbst entfliehen zu können. Der

*) Verfasser dieses schoß im Winter 1875 in der Oberförsterei Königs-Wusterhausen ein Hauptschwein, welches die Forstbeamten bereits 18 Jahre lang kannten. Die Gewehre dieses Keilers haben eine Länge von 25 Cm.

Digitized by Google

Schieber des Kastens muß dann schnell herunter gelassen werden und die Sau ist gefangen.*)

Der Anstand geschieht entweder an den Feldern oder bei einer Kirrung des Abends spät oder des Nachts, weil die Sauen meist erst sehr spät die Dickungen verlassen. Man sitzt dann auf einer Kanzel oder in einer Erdhütte, wo man die Sauen erwartet, damit sie keinen Wind bekommen können, weil sie stets eine Kirrung umkreisen, ehe sie dieselbe aufnehmen. Am leichtesten kirret man die Sauen durch ein todtes Pferd, Gerste, Kartoffeln u. s. w. an, und gießt Heringslake auf der Kirrung umher.

Die Treibjagd, welche man am liebsten bei Schnee abhält, kann ohne und mit Hunden stattfinden. Im letzteren Falle hat man eine Menge Hunde, 40 bis 50, vereinigt, die eine Meute oder Saurüde genannt, und von einem Jäger, der Rüdemann heißt, durch Hornsignale und Rufe geführt und geleitet werden. Eine solche Meute besteht aus einigen Saufindern und aus größeren, nicht zu schweren, ziemlich schnellen Hunden, die nur auf Sauen jagen, und bemüht sind, dieselben aus den Dickungen und vor die Schützen zu bringen. Saupacker, was große schwere Hunde sind, gebrauchte man früher bei den Saujagden zum Hetzen und Festhalten der Sauen. — Die eingestellten Jagen auf Sauen werden ebenso eingerichtet wie die auf Rothwild, nur brauchen die Netze und Tücher nicht so hoch zu sein. Die Lappen respectiren sie häufig nicht.

Bei der Jagd mit dem Saufinder ist gewöhnlich nur ein Jäger thätig. Dieser löst den Finder vor einer Dickung auf einer einzelnen, womöglich starken, frischen Keilerfährte und wartet dann ab, bis der Hund den Keiler stellt und standlaut giebt. Dann schleicht man sich mit gutem Winde behutsam dorthin, wo der Hund laut ist, und sucht das Schwein zu erlegen. Solche Jagd kann oft lange dauern und mühsam sein, da die Keiler häufig

*) Ueber die Anlage und Handhabung der Saufänge steht eine nähere Beschreibung im Waidmann, Band 3, Nr. 23 u. 24 und Band 4, Nr. 10.

Digitized by Google

wieder weiter wechseln, ehe sie sich nochmals stellen, und ehe man zu Schuß kommt, dafür ist es aber eine der aufregendsten und amüsantesten Jagden.

Bei der Parforcejagd, welche zu Pferde abgehalten wird, werden die Hunde und die ganze Jagd von Piqueuren geführt und geleitet. Die ganze Jagdgesellschaft folgt dem angehetzten Schweine so lange nach, bis es sich stellt und die Hunde es decken. Dann wird es von einem Herrn, der zuerst herankommt, am linken Hinterlauf ausgehoben und so lange gehalten, bis der Vornehmste der Jagdgesellschaft herankommt, um es abzufangen.

Beim Aufbrechen und Zerwirken des Schwarzwildes verfährt man ebenso, wie dies beim Rothwilde beschrieben ist, nur daß man den Hals nicht aufschärft, sondern blos den Schlund unter dem Drosselknopf absticht, damit man nicht den Kopf unansehnlich macht, weil dieser stets die Zierde einer gedeckten Tafel ist. Dann löst man beim Zerwirken zuerst den Kopf mit der Schwarte dicht an den Blättern vom Halse nach dem Genick zu ab und läßt möglichst viel vom Halse daran.

Der Hase (Lepus timidus).

Derselbe gehört zu den Nagethieren, hat im Ober- und Unterkiefer zwei Nagezähne, die vorn gefurcht sind, und hinter den oberen noch zwei kleinere, die hinten gefurcht sind. Auf jeder Seite des Oberkiefers 6, des Unterkiefers 5 stark gefurchte Backenzähne, Oberlippe ist gespalten. An den Vorderläufen 5 und an den längeren Hinterläufen 4 Zehen, und die Sohlen der Läufe sind behaart. Er bewegt sich hüpfend. Die Löffel sind länger als der Kopf mit stets schwarzen Spitzen. Seher sind groß und zur Seite stehend. Die Blume ist kurz und oben schwarz mit weißem Rande. Das Bauchgesäuge hat 4 bis 8 Paar Zitzen. Von seinen Sinneswerkzeugen ist nur der Geruch scharf, weshalb er weit

Digitized by Google

windet. Die Farbe ist über den ganzen Körper verschieden und ein Gemisch von grau, braun, gelb, roth, schwarz und weiß. Auf dem Rücken ist er stets am dunkelsten. Es giebt auch weiße und gelbe Hasen, doch sind diese im Sommer grau, haben rothe Seher, eine weiße Blume und keine schwarzen Spitzen an den Löffeln. In den Hochalpen und in Ostpreußen kommt eine andere, ganz constante Species vor, die Lepus variabilis heißt, die sich nur von dem gewöhnlichen Hasen dadurch unterscheidet, daß die kürzeren Löffel an der Spitze und der obere Theil der Blume schwarz sind, keine rothen Lichter haben und im Sommer weißlich grau aussehen. Die Färbezeit ist im April und October.

Der Hase ist über ganz Deutschland verbreitet, doch vorzugsweise im wärmeren Klima auf fruchtbaren Feldern und in Feldhölzern, seltener im Gebirge und in größeren zusammenhängenden Waldungen. Seine Nahrung besteht aus jungen Getreidearten, Futterkräutern, Gemüsearten, Raps, Gras, Rüben jeder Art, Rinde von Obstbäumen, Espen, Akazien u. s. w.; letztere liebt er ganz besonders. Im Winter füttert man die Hasen mit Erbsstroh, Kleeheu, Rüben u. s. w. Die Hasen müssen in der Nahrung stets viel Abwechselung haben und lieben die Freiheit, weshalb sie sich in kleinen Hasengärten für die Dauer nicht vermehren.

Die Rammelzeit ist gewöhnlich vom Februar bis August, doch beginnt sie in milden Wintern schon im Januar. Die Häsin geht 30 Tage tragend und setzt das erste Mal gewöhnlich im März zwei bis vier Junge. Sie setzt dann während des Sommers noch zwei bis drei Mal. Der erste Satz, wenn er nicht im Frühjahr durch Schnee und Frost wieder verloren geht, setzt noch im Sommer des Geburtsjahres.

Stets werden sehr viel mehr Rammler als Häsinnen gesetzt. Die Hasen haben sehr viele Feinde, die sie verzehren, und sind außerdem vielen Krankheiten ausgesetzt; sonst würde die Vermehrung noch sehr viel größer sein.

Auch die Wilddiebe thun ihnen in manchen Gegenden durch

Digitized by Google

Stellen von Drahtschlingen viel Abbruch, da sie sich in denselben sehr leicht fangen, wenn diese in den Furchen zwischen den Getreidefeldern gestellt werden.

Den Rammler kann man, wenn er flüchtig ist, daran erkennen, daß er die Blume hoch trägt, die Häsinnen dagegen halten sie zur Erde gesenkt.

Einen jungen Hasen, der etwa $^2/_3$ ausgewachsen ist, nennt man Dreiläufer.

Die Jagd auf Hasen geschieht auf dem Anstande, der Suche mit dem Vorstehhunde und auf der Treibjagd. Man jagt ihn mit Bracken im Holze, wo sie selten sind, und hetzt ihn im Freien mit kleinen Parforce- und Windhunden.

Die Treibjagd auf Hasen ist die am meisten übliche Jagdart und kann diese in Vorstehe-, Kessel- und Streiftreiben bestehen, je nachdem das Terrain beschaffen ist. Die Arten der Hasenjagden noch näher zu beschreiben, ist hier nicht der Zweck und Ort.

Das Auswerfen und Abbalgen der Hasen geschieht in derselben Weise, wie bei dem vierläufigen Raubzeuge, und ist dies mehr Sache der Wildhändler und des Küchenpersonals.

Das wilde Kaninchen (Lepus cuniculus).

Alles was vom Hasen gesagt ist, gilt auch vom Kaninchen, mit Ausnahme dessen, was hier noch bemerkt werden soll.

Es ist kleiner als der Hase, hat eine graue Farbe mit weißer Blume, die Löffel sind kürzer als der Kopf; es lebt unter der Erde in einem Bau und kommt am Tage nur bei trockenem Wetter und Sonnenschein heraus; sonst verläßt es denselben erst des Abends, wenn es auf Aesung auswechselt. Es bleibt dann stets in der Nähe seines Baues.

Hat es Mangel an Nahrung, so wechselt es von Jahr zu Jahr stundenweit von seinem Geburtsorte, macht sich dann neue

Digitized by Google

Baue oder versteckt sich unter Bund- und Klafterholz, in Hecken und Gärten. Seine Vermehrung ist sehr groß, wenn es nicht durch Menschen, Füchse oder strenge Winter stets vermindert wird.

Die Kaninchen rammeln und setzen zu derselben Zeit, wie die Hasen, doch haben sie im Laufe des Jahres mindestes fünf Mal und stets 4 bis 6 und noch mehr Junge.

Man schießt die Kaninchen auf dem Anstande, der Treibjagd, bei schönem Wetter, wenn sie die Baue verlassen haben, im Holze, und beim Frettiren, indem man Frettchen in einen Bau läßt, welche die Kaninchen zwingen, denselben zu verlassen.

Treibt man nach Kaninchen, so muß man kurz vor Beginn der Jagd in aller Stille die Hauptbaue zustopfen, damit sie nicht gleich wieder, sowie die Treiber laut werden, in die Baue fahren.

Das Wildpret ist nicht so schmackhaft, wie das der Hasen, doch wird es in Frankreich und England in großen Massen gegessen.

Das Kaninchen thut durch Benagen der Bäumchen und durch Abäsen der jungen Holzpflanzen und der Feldfrüchte, sowie auch durch Unterminiren des Erdbodens häufig nicht unbeträchtlichen Schaden, wenn sie in größerer Menge vorkommen.

Der Biber (Castar fiber).

Dieser gehört zu den Nagethieren und bildet eine eigene Familie derselben. Er hat im Ober- und Unterkiefer zwei lange starke Nagezähne, die vorn safrangelb und ganz glatt sind. Am oberen Ende sind diese wie ein scharfer Meißel geformt und wachsen, wie bei allen Nagethieren, wenn sie abgenutzt werden, immer wieder nach. Außerdem hat er oben und unten vier, bisweilen unten fünf Backenzähne auf jeder Seite in den Kinnladen, die verschieden gefurcht sind. Er wird, wenn er ausgewachsen ist, bei-

Digitized by Google

nahe 1 Meter lang, incl. des $2^3/_4$ Dm. langen Schwanzes, welcher auch Kelle genannt wird. Der Leib ist plump, hinten dicker, Kopf platt, Augen sehr klein, mit einer Nickhaut versehen. Die Lauscher sind kurz und abgerundet. Das Weibchen hat vier Zitzen vorn nach der Brust zu, die erst anschwellen und besser sichtbar werden, wenn es Junge hat. Die Läufe sind kurz und stark, die hinteren etwas länger, und die fünf Zehen der Hinterläufe durch eine Schwimmhaut verbunden. Nur selten kann man die Fährte des Bibers deutlich spüren, da sie meist, trotz der langen Krallen, wenn er zu Lande steigt, von dem Schwanze wieder zugestrichen werden, indem dieser stets auf der Erde lang schleppt. Die einzelne Fährte ähnelt entfernt im nassen Boden dem Abdrucke eines Gänsefußes.

Die Kelle besteht aus einer reinen Fettmasse, ist ganz platt, hinten abgerundet, in der Mitte 11—12 Cm. breit und mit blaugrauen, breiten, vorn runden Schuppen bedeckt, die den Fischschuppen sehr ähnlich sind.

Der Biber kann lange tauchen, schwimmt außerordentlich geschickt und behende, aber nur durch den Gebrauch der Hinterläufe und Kelle. Die Vorderläufe hält er beim Schwimmen stets nach vorn zu ausgestreckt. Er schneidet an den Bäumen, auf dem Hintertheil sitzend, und nimmt kleine Stücken Holz, die er abnagt, zwischen die Vorderläufe. Aeußerlich ist das Männchen vom Weibchen nicht zu unterscheiden, da die Harn- und Geschlechtstheile in den Mastdarm münden. In der Bauchhöhle, nahe am After, liegen zwei Drüsen, welche in die Geschlechtstheile münden und das sogenannte Bibergeil enthalten, was in der Apotheke hoch bezahlt wird.

Das kastanienbraune Fell besteht aus einem dichten, seidenartigen Wollhaar und 3—4 Cm. langen, steifen, glänzenden Oberhaar. Seine Färbezeit ist im Mai und October, doch ändert er die Farbe wenig. Er kommt in Deutschland nur noch an der Elbe, Saale und Mulde, zwischen Dessau und Magdeburg, hauptsächlich in der Königlichen Oberförsterei Löddertz und daselbst

Digitized by Google

an kleinen Seen oder tiefen Wasserlöchern vor, die mitten im Holze liegen.

Er lebt hier paarweise, und dulden die alten Biber die Jungen nur bis im Spätherbst des Geburtsjahres bei sich. Das Weibchen bringt im Mai, 9 Wochen nach der Begattung, welche im Februar und März ist, zwei, selten mehr Junge, die blind geboren werden.

Die Biber nähren sich von der Rinde der Weiden, Aspen, Traubenkirschen, Eichen, Rüstern, Eschen und Haseln, auch nehmen sie Schilfwurzeln, besonders Kalmus zu sich. Sie schneiden Schößlinge von 2—4 Cm. und Bäume bis zu 3 Dm. Stärke über der Erde ab. An letzteren schneiden sie aber Monate lang, oft mit längerer Unterbrechung. Am stehenden Holze äsen sie nicht, sondern schneiden dies erst ab und verkürzen es in 1—1½ Meter lange Stücke. Von starken Stämmen, die sie stets auf der Wasserseite am tiefsten einschneiden, damit diese ins Wasser stürzen, nehmen sie nur die Rinde der Aeste und Spitzen.

Sie leben in der Erde in einem Bau am Ufer des Wassers und führen vom Grunde des Wassers ihre Röhren nach oben zu, bis etwa 1 Meter unter der Oberfläche des Erdbodens, so daß oft die Baue nicht zu bemerken sind. Bisweilen an einsamen Orten haben sie auch Ausgänge nach dem Lande zu. Auch bauen sie sich sogenannte Burgen, dicht am Wasser, was meilerförmige, 2—2½ Meter hohe Haufen von Reisighölz sind, die durch Lehm und Schilf fest verbunden werden. Hierin liegen sie meist bei Tage oder bei Hochwasser. Werden auch diese überschwemmt, so flüchten sie sich auf Kopfweiden oder anderes Kopfholz, was sie besteigen können, und wo der Kopf des Baumes dicht über dem Wasserspiegel hervorragt. Sie nehmen da ihren Aufenthalt, bis die Burgen und Baue wieder frei vom Wasser sind. Ihre Sinnesorgane sind sehr scharf, es sind kluge Thiere, die mit Ueberlegung bei ihren Bauten handeln. Dennoch sind sie im Tellereisen, die dicht unter dem Wasserspiegel auf ihren Ausstiegen gelegt werden, sehr leicht zu fangen, ebenso zu schießen, wenn man sich in der

Digitized by Google

Dämmerstunde mit gutem Winde in der Nähe derselben anstellt. Trotzdem, daß sie auf den Königl. Revieren ganz geschont werden, so vermehren sie sich doch nicht in der genannten Gegend. Es bleibt dort immer ein kleiner Bestand von vielleicht 15—20 Stück, da sie häufig durch Hochwasser und Eis unfreiwillig auf Privatjagden gelangen, wo sie dann meist zufällig von Jägern geschossen oder von Fischern in Netzen gefangen werden.*) Sonderbarer Weise findet man nach jedem ungewöhnlichen Hochwasser, wie auch wieder im Winter 1876, immer mehrere eingegangene Biber, die ertrunken oder verhungert sein müssen, weil sie weit und breit kein Land finden. —

Das Aufbrechen und Abbalgen geschieht wie bei den vierläufigen Raubthieren, nur muß man die Drüsen, in denen sich das Bibergeil befindet, recht vorsichtig auslösen, oder gleich abbinden, damit hiervon nichts verloren geht. Die Kelle läßt man am Körper.

Bei ganz niedrigem Wasserstande kann man sie auch mit einem scharfen Teckel aus dem Bau jagen und in, vor den Röhren aufgestellten Netzen lebendig fangen.

Das Murmelthier (Arctomys marmota).

Auch dies gehört zu den Nagethieren, hat in jedem Kiefer, oben und unten zwei braungelbe Nagezähne und fünf Backenzähne. Der Leib ist plump und schwerfällig, der Kopf breit, die Schnauze abgestumpft, die Lauscher kurz und abgerundet. Die Behaarung, welche aus kurzem Wollhaar und langen Grannhaaren besteht, ist

*) Nach dem Hochwasser und während desselben im Frühjahr 1876 sind in der Umgegend von Barby 7 Biber verendet gefunden, welche ertrunken und theilweise wohl verhungert waren, da sie lange Zeit weit und breit kein Land fanden, wo sie ihrer Nahrung nachgehen konnten. Die Biber können im Schwimmen kein Holz abschneiden und auch nicht die Rinde abnagen.

Digitized by Google

dicht und von braunschwarzer oder dunkelröthlich brauner Farbe. Schnauze und Läufe sind braungelb. Die Hinterläufe haben 5 Zehen und sind länger als die vorderen, letztere nur 4 Zehen.

Es wird fast 6 Dm. lang, wovon 1 Dm. auf die Ruthe kommen, und 11 Cm. hoch. Das Gesäuge hat vier Zitzen. Gehör und Geruch sind vortrefflich. Die Ranzzeit ist im April, und wirft das Weibchen nach sechs Wochen 2—4 Junge.

Das Murmelthier kommt in Deutschland nur in den baierischen Hochalpen vor und bildet daselbst auch wegen seines Wildprets und Pelzes einen Gegenstand der Jagd. Es lebt in Bauen, und zwar im Sommer bis zur ewigen Schneeregion, im Winter bis dahin, wo auch Nadelholz wächst. Es hat somit einen Sommer- und einen Winterbau, in dem es paar- oder familienweise, nicht selten zu 8 und 10 Stück lebt. Die Baue sind stets frei gelegen, an Berghängen oder auf Plateaus, nur nicht auf den Nordhängen, weil es die Sonne liebt. Außerdem hat es viele kleine Fluchtröhren, wohin es fliehet, wenn es bei Gefahr den Hauptbau nicht erreichen kann. Seine Nahrung besteht aus Gras, Alpenkräutern und Wurzeln, und trägt es im Herbst getrocknetes Gras in seinen Bau, in welchem es den ganzen Winter schläft, und wo es die Ausgänge von inwendig mit Steinen, Erde und Heu fest verstopft. Erst im Frühjahr, wenn es Grünes giebt, kommt es wieder zum Vorschein und bezieht dann wieder seinen Sommerbau mehr hoch in den Alpen. Es bedarf viel Wasser zu seiner Nahrung. In Baiern sowohl, wie in allen Alpengegenden wird es geschont und pfleglich behandelt, und bei Ausübung der Jagd auf dasselbe dürfen seine Baue nie gegraben oder zerstört werden. Man schießt es nur auf dem Anstande oder dem Pürschgange, wenn die Localität es gestattet, daß man es anschleichen kann. In den meisten Fällen werden sie auch von den Gemsenjägern mit der Büchse geschossen, da schwer nahe heranzukommen ist, um sie mit der Flinte zu erreichen. Es kommt des Morgens in der Dämmerstunde aus seinem Bau, und wenn man es auf dem Anstande schießen will, so muß man sich schon lange vor Tages Anbruch gut versteckt unter Wind

Digitized by Google

sehr still anstellen. Hört oder windet es etwas Verdächtiges, so giebt es einen lauten, pfeifenden Ton von sich, fährt mit seiner Umgebung schnell zu Baue und kommt erst lange nachher sehr vorsichtig wieder zum Vorschein, so daß man Stunden lang stehen muß, ehe man einen Schuß anbringen kann.

Der Dachs (Ursus meles).

Derselbe gehört zu den Raubthieren, hat im Ober- und Unterkiefer sechs Vorderzähne. An jeder Seite, oben und unten, zwei Fänge, d. h. Eckzähne, und oben fünf, unten sechs Backenzähne. Die Schnauze ist spitz und rüsselartig, Lauscher kurz. Die grau mit schwarz melirte Schwarte ist auf dem Grunde kurzwollig und borstenartig behaart. Das Weibchen hat Brust- und Bauchgesäuge und zusammen 6 Zitzen, bisweilen 8. Die Ruthe und Läufe sind kurz; letztere mit langen Krallen an den 5 Zehen versehen. Der Kopf ist weiß und hat auf jeder Seite von der Nase bis zum Halse einen schwarzen Streifen. Die ganze Figur ist hinten stärker als vorn. Die Läufe und der Bauch sind schwarz. Färbezeit ist im Mai und September. Im zweiten Jahr ist er ausgewachsen und heißt dann: starker Dachs oder Dächsin.

Seine Nahrung besteht aus Obst, Eicheln, Bucheln, Rüben, Weinbeeren, Hülsenfrüchten, Larven, Würmern, Eiern und sogar allen jungen Vögeln. Er lebt meistens paarweise.

Die Ranzzeit ist gewöhnlich im November, die Dächsin geht neun Wochen dick und wirft 2—4 blinde Junge.

Der Dachs ist über ganz Deutschland verbreitet, lebt im Walde nur in Bauen, die er gewöhnlich nur des Nachts verläßt, doch macht er dann über eine Stunde weite Ausflüge. Sein Bau hat einen großen Kessel und viele Röhren, sogar häufig etagenweise über einander liegend. Es giebt alte Dachsbaue, die eine

Digitized by Google

große Ausdehnung haben und ein ganzes System von unterirdischen Gängen bilden. Diese können wegen ihrer Tiefe und Lage an hohen Ufern und unter Felsen nicht aufgedeckt und gegraben werden, und nennt man solche Baue Mutterbaue, weil dort alle Jahre Dächse liegen und sich vermehren. Im Winter bei Frost und Schnee verläßt er den Bau nur sehr selten. Er kann deshalb lange Zeit ohne Nahrung bestehen, und sagt man daher, daß er von seinem eigenen Fett lebe, indem er aus dem sogenannten Fettloch, was eine mit Fett angefüllte Vertiefung unter dem Pürzel ist, das darin befindliche Fett aussaugt.

Sein Fett ist zu essen und als Heilmittel gegen Wunden vortrefflich. Die Spur des Dachses läßt sich leicht an den großen Ballen und langen Krallen an den Zehen erkennen, da letztere stets tief in den Boden eingreifen.

Die Jagd auf den Dachs exercirt man auf dem Anstande am Bau des Abends, womöglich bei Mondschein, da er denselben erst spät verläßt; dann durch Ausgraben mit dem Dachshunde aus dem Bau, oder man fängt ihn in Fallen und Eisen. Auch legt man wohl des Nachts, wenn der Dachs ausgewandert ist, Netze vor und in die Röhren seines Baues und sucht mit einem scharfen Hunde, der den Dachs gern annimmt, die Umgegend des Baues ab. Wird der Dachs vom Hunde gefunden und verfolgt, so fährt er bald in das Netz und fängt man ihn so lebendig. Ein zweiter Jäger muß beim Bau bleiben, damit er den Dachs sofort abfängt oder todtschlägt, da er sich sonst sehr bald wieder durchschneidet, d. h. freimacht. Der Dachs hat ein ungemein zähes Leben und tödtet man ihn durch Stockschläge im Genick oder auf der Nase, doch nehme man sich vor seinen gefährlichen Schlägen, d. h. Bissen in Acht. Den Fasanerien und Rebhühnerjagden wird er sehr schädlich und kann daher in der Nähe derselben nicht geduldet werden, weil er die Eier und selbst die junge Brut frißt.

Seine Schwarte wird vorzugsweise zu den Tornistern der Jägerbataillone und das Haar zu Pinseln und Cocarden verwendet.

Digitized by Google

Beim Abstreifen der Schwarte verfährt man ganz wie beim Schwarzwilde, nur daß man den Kopf mit abstreift und die Rübe des Pürzels mit auslöst.

Der Wolf (Canis lupus).

Der Wolf ist das größte Raubthier, welches in Deutschland vorkommt, und gehört zur Gattung der Hunde. Er hat ein gewaltig scharfes Gebiß, sechs Vorderzähne in jedem Kiefer, Fänge oben und unten, die etwas gebogen sind, und Backenzähne 6 oben und 7 unten auf jeder Seite. Sein Körper ist vorn höher als hinten und sehr kräftig, so daß er einen Rehbock bequem forttragen kann. Er wird $1^2/_3$ Meter lang, wovon 4 Dm. auf seine Standarte kommen, und seine Höhe beträgt am Widerrist circa 7 Dm. An den Vorderläufen hat er hinten, etwa 8 Cm. über der Fußsohle, einen kleinen, warzenartigen Ballen, und 5 dick behaarte Zehen, von denen die eine sehr hoch nach hinten sitzt. An den Hinterläufen 4 behaarte Zehen mit stumpfen starken Krallen, von denen die beiden mittelsten länger sind. Das Gesäuge der Wölfin hat 10 Saugwarzen. Der Kopf ist dick, der Rachen spitz und weit geschlitzt, Lauscher kurz, zugespitzt und aufrecht stehend. Die Ruthe, der Hinterkopf und Hals ist dick behaart und wird ausgestreckt, etwas nach unten gebogen getragen.

Die Farbe des Wolfes, welcher in Deutschland vorkommt, ist in der Hauptsache gewöhnlich gelblich grau mit schwarzen Haarspitzen, im Sommer röthlicher, die Läufe vorn schwarzbraun, die Kehle und Blume weißlich. Die Färbezeit ist im April und October, und der Pelz stets vom November ab am besten; die Sinne des Wolfes sind sehr scharf, er ist schlau, listig und besitzt eine große Mordlust, die er stets des Nachts ausübt. Er reißt alle Wildarten und zahmes Vieh, die er bewältigen kann, oft mehr, als er zu seiner augenblicklichen Sättigung bedarf. Auch reißt er alle Arten zahmen und wilden Geflügels. Größere Wildarten, wie

Digitized by Google

Elen- und Rothwild, jagt er gewöhnlich nur in Gesellschaft mit anderen Wölfen. Diese werden von einem Rudel Wölfen so lange verfolgt, bis sie ermatten, und dann fassen die Wölfe ihre Beute bei der Kehle und würgen sie so ab.

In Deutschland kommt er noch am häufigsten links des Rheines vor, sonst findet er sich nur ganz einzeln in den östlichen Provinzen Preußens, wohin er aus Rußland meistens in strengen Wintern einwandert. Niemals hält er sich aber lange in derselben Waldgegend auf, sondern wechselt unruhig weit hin und her, oft 20 Meilen weit in einer Nacht, wenn er nicht große, wildreiche Forsten findet, in denen er sich verbergen kann.

Die Ranzzeit ist gewöhnlich von Ende December bis Anfang Februar. Der Wolf und die Wölfin hängen bei der Begattung wie die Hunde. Nach 13—14 Wochen wölft die Wölfin in einsamen, großen Dickungen, gewöhnlich in kleinen Löchern, die mit Moos und Gras ausgefüllt sind, 4—6 Junge, die 9 Tage blind sind. Im dritten Jahre ist der Wolf ausgewachsen.

Man hat schon öfters Versuche gemacht, den Wolf mit einer passenden Hündin zu begatten, um daraus Schweißhunde für die Jagd zu züchten, doch sind die Jungen stets mehr nach dem Wolf geschlagen und so böse geworden, daß sie nicht zur Jagd haben benutzt werden können. Namentlich sind diese Bastarde jedesmal sehr aufgeregt und böse geworden, wenn sie frischen Schweiß gewittert hatten.

Die Spur des Wolfes ist meist schnürend, der eines großen Fleischerhundes ähnlich. Sie ist mehr lang, als breit und stehen die beiden mittleren Zehen parallel und weit vor den anderen. Auch drücken sich die Ballen im weichen Boden und Schnee und die Haare an den Zehen deutlich mit ab.

Man erlegt den Wolf auf Treibjagden, wo große Districte umstellt und die Flügel verlappt werden, da er sonst bald Wind bekommt oder Treiber und Schützen vernimmt, wenn solche Treiben nicht weit von seinem Lager in aller Stille umstellt werden. Auch kann man ihn in Eisen fangen, und in früheren

Digitized by Google

Zeiten, wo es noch viel Wölfe in Deutschland gab, fing man ihn auch in sogenannten Wolfsgruben. Gegenwärtig wird er bei Schnee eingekreist oder zufällig beim Treiben erlegt.

Das Abstreifen des Balges geschieht so, daß man ihn von den Ballen ab an den Vorderläufen bis zu den Blättern, an den Hinterläufen bis an das Weidloch aufschärft und an den Zehen ablöst. Dann wird der Balg von den Keulen abgestreift und hängt man den Wolf an einem Haken bei den Hessen auf, zieht die Rübe aus der Ruthe heraus, krempelt den Balg an der Ruthe um und streift ihn bis an den Kopf herunter, nachdem die Vorderläufe herausgenommen sind. Der Kopf wird mit dem Nickfänger behutsam bis zur Nasenspitze abgeschärft. Den Balg zieht man dann, die haarige Seite nach innen gekehrt, über ein glattes Brett, was nach dem Kopfe zu schmäler und der Stärke des Balges angemessen ist. Endlich reibt man die kahle Seite mit Asche und Salz ab und läßt ihn so trocknen. Auch ist es praktisch, die Haare mit Insektenpulver oder Kampfer zu bestreuen, um den Pelz vor Motten zu schützen.

Der Fuchs (Canis vulpes).

Die Kennzeichen, daß der Fuchs zu den Raubthieren gehört, sind dieselben, wie beim Wolf, und ist er der nächste Verwandte von diesem und dem Hunde. Der Kopf läuft in eine sehr spitze Schnauze aus. Die Seher sind leuchtend und schielend mit senkrechter Sehspalte. Die Farbe der in Deutschland vorkommenden Füchse ist vorherrschend roth oder bräunlich roth, bisweilen dunkler oder heller im Sommer, nur die wollartigen Unterhaare sind grau. Die Wolle (Haare) wechselt er im April und October, und sein Pelz ist vom November bis im Februar am schönsten.

Die Spitze der hochstehenden Lauscher und die Läufe sind stets schwarz. Die Lunte, welche sehr elektrisch ist, ist lang und dicht behaart, und die Blume (Spitze derselben) entweder schwarz

Digitized by Google

oder weiß, ebenso die Kehle, der Blume entsprechend. Die mit schwarzer Kehle und Blume nennt man Brandfüchse.

Etwa 5 Cm. vom Körper ab ist auf dem oberen Theil der Lunte eine Drüse, welche Viole heißt und einen veilchenartigen Geruch hat. Es kommen in Deutschland auch bisweilen weiße Füchse vor, die stets rothe Seher haben, wie alle solche Wildarten, die so außergewöhnlich weiß geboren werden. Auch kommen rothe Füchse mit einzelnen kleinen weißen Flecken über den ganzen Körper vor, doch stammt diese Erscheinung von der Räudekrankheit her, wenn dieselbe wieder auscurirt wird. Dieser Krankheit ist er oft ausgesetzt und geht häufig daran ein. Auch steckt er andere Füchse und selbst Hunde an, wenn letztere einen solchen räudigen Fuchs apportiren. Der Fuchs ist mit sehr scharfen Sinneswerkzeugen begabt, wenn über ein Jahr alt ist er sehr listig, vorsichtig und mißtrauisch, wohingegen die jungen Füchse eher dumm zu nennen sind.

Seine Spur ist beim langsamen Schleichen und im Trabe stets schnürend. In Deutschland ist er überall verbreitet, besonders in wildreichen Gegenden. Er lebt in dichten und größeren Waldungen der Laub- und Nadelhölzer, in Brüchen und trockenen Rohrgelegen, hat Baue im Walde, doch wölft er auch im Getreide, wo er sich neue Baue gräbt. Im Bau hält er sich nur bei Regen- und Schneewetter oder auch in der Ranzzeit auf, zu welcher Zeit die Füchsin häufig mehrere Männchen bei sich hat. Bei trockenem Wetter, besonders bei Sonnenschein, ist er außerhalb des Baues und raubt Tag und Nacht. Seine Nahrung besteht hauptsächlich in Mäusen, Reh- und Damwildkälbern, jungen Hasen, Kaninchen, Hamstern, allem Geflügel und Luder; sogar Frösche und Larven verschmäht er nicht.

Der Jagd wird er sehr schädlich, besonders in der Zeit, wo er Junge hat, doch macht er sich nützlich durch Vertilgung der Mäuse im Walde und Felde.

Die Ranzzeit ist gewöhnlich im Februar und läßt sich der Fuchs dann des Nachts oft bellend oder heulend hören. Fuchs und Füchsin hängen bei der Begattung. Letztere geht 9 Wochen trächtig

Digitized by Google

und wölft vier bis neun blinde Junge im Baue, den sie dann eine Zeit lang nicht verläßt, indem der zärtliche Gatte stets frische Beute herbeischafft. Später, wenn die Jungen zehn bis zwölf Tage alt sind, macht auch die Füchsin ihre Jagden oft Stunden weit vom Bau und schleppt ihre Beute sehr weit zu den Jungen. Sie legen sich ganze Vorrathskammern im Baue an, denn man findet in demselben beim Ausgraben der jungen Füchse oft zu gleicher Zeit Rehkälber, junge Hasen, Fasanen, zahmes Geflügel, Hamster und dergl., die noch unversehrt sind. Werden die Füchse vor einem Bau gestört, oder spüren sie wiederholt einen Menschen, so trägt oder führt die Füchsin ihre Jungen sofort nach einem andern Bau, und man findet häufig, wenn man sie ausgraben will, den leeren Bau, selbst wenn man die Jungen noch Tags vorher davor hatte spielen sehen. Man gehe daher nie an einen frischen, mit jungen Füchsen besetzten Bau zu nahe heran, und revidire denselben nie in Gesellschaft eines Hundes, wenn man sie ausgraben will.

Natürlich müssen die Füchse überall da, wo man einen Rehstand, viel Hasen und Federwild erhalten will, zu jeder Jahreszeit vertilgt werden, denn sie ziehen sich stets wieder aus weiter Ferne nach wildreichen Gegenden hin.

Die Ausübung der Jagd auf Füchse wird in sehr verschiedener Weise gehandhabt, denn man fängt sie in Eisen, gräbt die Jungen und Alten vermittelst des Teckels, hetzt sie mit Windhunden, jagt sie mit Bracken oder Parforcehunden und schießt sie auf Treibjagden, aus Luderhütten oder durch Reizen, indem man einen klagenden Hasen oder den Ton einer Maus nachahmt. Die localkundigen Forst- und Jagdbeamten kennen gewöhnlich die Fuchsposten genau, und ist es eine besondere Eigenthümlichkeit der Füchse, daß sie ihren Paß immer so genau halten, wie keine andere Wildart. In vielen Revieren haben daher die Fuchsposten schon eine gewisse Berühmtheit erlangt. Die Füchse halten gewöhnlich die strengsten Dickungen oder Holzecken, um so lange wie möglich gedeckt zu sein, ehe sie einen Weg oder Blöße passiren. Man sei daher

Digitized by Google

beim Fuchstreiben gleich beim Beginn des Treibens schußfertig, denn oft sind die Füchse schon wenige Minuten nachher bei den Schützen. Stillestehen auf dem Stande ist eine Hauptsache, und nicht immer ist der Fuchs ein leichter Schuß, denn enge Stangenhölzer, Dickungen, hohes Heidekraut, Gras, Bulten im Bruch und schmale Wege verlangen stets einen gewandten Schützen. Er hat ein sehr zähes Leben und kann einen starken Schuß vertragen. Macht ein angeschossener Fuchs Miene fortzukriechen oder hat er den Kopf noch hoch, so spare man nie den zweiten Schuß, respective laufe schnell zu und schlage ihn todt; sonst geht er oft noch davon oder fährt in einen benachbarten Bau.

Das Abstreifen des Balges geschieht, wie es beim Wolf erwähnt ist.

Der Luchs (Felis lynx).

Derselbe gehört zu dem Katzengeschlecht und ist ein gefährliches Raubthier für alle Wildarten. Das Gebiß und die Krallen sind wie bei der wilden Katze, nur stärker, und der letzte Backenzahn ist dreispitzig. Die Ruthe ist nur $1^1/_4$ Dm. lang und am Ende schwarz. Er hat einen starken, gedrungenen Körper, wird 1 Meter lang und $^2/_3$ Meter hoch. Die Lauscher sind zugespitzt, auswendig schwarz und enden in einem kegelförmigen, schwarzen, hochstehenden Haarbüschel von 6 Ctm. Länge. Auf der Oberlippe hat er einen steifen, langen Schnurrbart. Sein Balg ist oben röthlichbraun und weißlich gemischt und mit roth- und graubraunen Flecken gezeichnet. Der Bauch und die inwendige Seite der Läufe schmutzig weiß. Im Sommer ist der Balg mehr röthlich. Die Jungen in demselben Gewölfe haben alle Farbenschättirungen. Seine Nahrung besteht in allem Haar- und Federwilde, und ist sogar das alte Hochwild nicht sicher vor seiner Mordlust. Er schleicht sich bis in die Nähe des Wildes und überrascht dies durch einen 4 Meter langen Satz. Bei größeren Wild-

Digitized by Google

arten springt er nach dem Genick und beißt und krallt sich da so lange fest, bis das Stück verendet ist. Auch erwartet er seine Beute häufig auf einem Baume, von wo er auf dieselbe herabspringt. Er lebt paarweise. Die Ranzzeit fällt Ende Januar und Februar und nach 9 Wochen wirft die Luchsin in dichten Waldungen und Felsenhöhlen 2, höchstens 3 Junge, welche vierzehn Tage blind sind.

Im zweiten Jahre ist der Luchs ausgewachsen und spürt sich im ruhigen Ziehen oder beim Trabe, wie alle Katzenarten, schnürend.

In Deutschland kommt er nur noch etwa alle zehn Jahre ganz einzeln in Ostpreußen vor, wo er aus Rußland weit her einwandert.*) Sein Aufenthalt ist in den dichtesten Waldungen, Felsenspalten und Höhlen. Er wird dann auch nur im Winter bei Schnee durch Einkreisen bei einer Treibjagd oder zufällig erlegt. Das Abstreifen des Balges geschieht in derselben Weise wie beim Wolf.

Die wilde Katze (Felis ferus).

Das Gebiß ist, wie bei allen anderen Raubthieren, durch die vier scharfen auswärts gebogenen Fänge (Eckzähne) und zackigen, mehr spitzigen Kauzähne sehr ausgezeichnet. Vorderzähne sind sechs in jedem Kiefer, Backenzähne vier oben, drei unten auf jeder Seite Die letzten Backenzähne sind zweispitzig. An den Vorderläufen befinden sich fünf, an den Hinterläufen vier Zehen mit zurückziehbaren scharfen Krallen. Sie hat vier Bauch- und vier Brustzitzen. Die Farbe ist graubraun und röthlich, auf dem Rücken und an der Seite befinden sich mehrere schwarze Längsstreifen. Die Ruthe ist $3^1/_2$ Dm. lang und dick behaart mit drei schwarzen Ringeln und schwarzer Spitze. Diese enthält, wie der ganze Balg,

*) In Ostpreußen sind 1875 wieder 2 Stück und zwar ein Pärchen erlegt.

Digitized by Google

viel elektrischen Stoff, und legt man diesen bei rheumatischen Schmerzen mit Erfolg auf die kranke Stelle.

Der Kopf ist dick und rund, die Seher kurz und leuchtend, die Lauscher aufrechtstehend, der lange Schnurrbart aus steifen Haaren bestehend. Die Haare wechselt sie im Mai und October. Im dritten Jahre ist sie ausgewachsen, und ein alter Kater erreicht die Stärke eines Fuchses. Das Weibchen ist stets kleiner.

Die Nahrung besteht aus allen jungen Wildarten, nur Elch- und Rothwild ausgenommen, Mäusen und Vögeln. Sie leben meist einzeln, nur in der Ranzzeit, welche im Februar ist, sucht der Kater die Weibchen auf und läßt dann des Nachts dieselben miauenden Laute hören, wie die zahme Katze. Das Weibchen geht neun Wochen trächtig, wirft im April und Mai vier bis sechs blinde Junge in alten verlassenen Dachs- oder Fuchsbauen, hohlen Bäumen und Felsenspalten, wo sie sich auch bei schlechtem Wetter aufhalten. Sie kommen vorzugsweise in deutschen Gebirgen und selten in der Ebene vor, wohin sie nur zeitweise, doch aber 10 bis 12 Meilen weit auswandern, und halten sie sich dann nur im größten Dickicht auf. Sie klettern und springen sehr geschickt auf den Bäumen und haben ein scharfes Gehör und Gesicht, spüren sich, wie eine zahme Katze schnürend, nur ist die Spur sehr viel größer.

Die Katzen thun der kleinen Jagd viel Schaden, weshalb man ihnen das ganze Jahr hindurch nachstellt. Man gräbt sie mit dem Dachshunde aus dem Bau, schwefelt sie aus hohlen Bäumen heraus und fängt sie in Fallen und Eisen, doch größtentheils werden sie zufällig auf Treibjagden oder Pürschgängen erlegt. Im letzteren Falle lassen sie sich auch reizen, d. h. anlocken durch Nachahmung einer Maus oder eines klagenden Rehkalbes und Hasens. Das Abstreifen des Balges geschieht, wie bei den anderen vierläufigen Raubthieren.

Digitized by Google

Die Fischotter (Mustela lutra).

Dies Raubthier hat oben und unten in jedem Kiefer sechs Vorderzähne, zwei gekrümmte Eckzähne und fünf Backenzähne, wovon die vordersten kleiner, und nach hinten zu stärker und zackig sind. An den kurzen Läufen hat die Otter fünf lange, durch eine lappige Schwimmhaut verbundene Zehen. Die Krallen sind ausgekehlt und an den Vorderläufen lang und spitz, an den Hinterläufen kurz, breit und stumpf.

Der Kopf, den sie gesenkt trägt, ist klein und platt gedrückt. Die Schnauze breit und abgerundet. Lauscher und Seher klein; letztere mehr oben auf dem Kopfe liegend. Die Zunge ist rauh. Die spitzig zulaufende Ruthe halb so lang, als der gestreckte Körper, und das Weibchen hat am Bauchgesäuge vier Saugwarzen und eine sackförmige Falte unter der Nuß. Beim Männchen liegen die Geilen verborgen im Bauch. Am Ende des Mastdarmes befinden sich zwei kleine Drüsen mit bisamartigem Geruch. Brust und Bauch sind mehr ins Graue übergehend, ebenso das weiche Unterhaar. Der Balg ist zu jeder Jahreszeit zu gebrauchen und nimmt, so lange die Otter lebt, kein Wasser an, auch ist derselbe mit viel Elektricität geschwängert.

Sie lebt im Wasser und auf dem Lande, ist ein ausgezeichneter Schwimmer und Taucher. Ihr Geruch und Gesicht ist äußerst scharf.

Sie nährt sich hauptsächlich von Fischen und liebt von diesen besonders Forellen, doch nimmt sie auch Krebse und alle Arten von Wassergeflügel, die sie bezwingen kann. Ihre Beute schleppt sie ans Land und verzehrt diese erst dort, wodurch sie ihre Gegenwart verräth, da sie den Kopf und die Fischgräten zurückläßt. Sie thut den Fischen großen Abbruch, namentlich auch den Karpfenteichen. *)

*) Auf dem Rittergute Seggerde (Provinz Sachsen) wurde im vorigen Jahre am Ufer des dortigen Schloßteiches ein Hecht gefunden, der von einer Fischotter ganz frisch dorthin geschleppt war. Sie hatte von demselben nur etwa 1 Kilo verzehrt, dennoch wog der Hecht noch über 10 Kilo. Ein Beweis, welche Kraft und Geschicklichkeit eine Otter besitzt.

Digitized by Google

Ihr Vorkommen ist in ganz Deutschland an fischreichen Flüssen, Bächen, Seen und Teichen, und wandert sie weit über Land, um Fischteiche aufzusuchen. Am Tage kommt sie selten zum Vorschein, sondern liegt dann gewöhnlich am Ufer in einem versteckten Bau oder zwischen Baumwurzeln, in hohlen Bäumen oder alten Erlenstöcken.

Die Spur ist stets an der abgedrückten Schwimmhaut zu erkennen, und daß die Abdrücke derselben je zwei und zwei schief neben einander stehen.

Das Wildpret der Otter wird in der Fastenzeit von den Katholiken hoch bezahlt, weil sie es dann wie das Fischfleisch essen dürfen.

Die Ranzzeit, in der sich das Männchen ein Weibchen aufsucht, ist im Februar, und geben sie in dieser Zeit des Nachts oft einen pfeifenden Ton von sich. Nach neun Wochen bringt das Weibchen in einem Bau oder zwischen Wurzeln und in dichtem Gestrüpp am Ufer zwei, selten mehr blinde Junge, die im dritten Jahre ausgewachsen sind und dann $1^1/_4$ Meter incl. der $3^1/_2$ Dm. langen Ruthe messen. Die Höhe beträgt nur $2^1/_2$ Dm. Jung eingefangen lassen sie sich zähmen, laufen ihrem Herrn wie ein Hund nach, sind sehr gehorsam und lassen sich sogar zum Fischfang abrichten.

In Deutschland erlegt man die Ottern auf dem Anstande bei Mondschein an ihrem Ausstiege oder auf dem Eise an offenen Stellen, wobei der Wind sehr berücksichtigt werden muß, oder man fängt sie in Eisen, die dicht unter der Oberfläche des Wassers auf ihren Ausstiegen gelegt werden.

Die interessante Otternjagd mit Hunden, wie sie in England betrieben wird, kennt man in Deutschland nicht.

Das Abstreifen des Balges geschieht wie bei allen Raubthieren, nur schärft man die Ruthe vom Waidloch bis an die Spitze längs der unteren Seite auf, um die Rübe dann bloßlegen zu können.

Digitized by Google

Die Sumpfotter oder der Nörz (Mustela lutreola).

Dies kleine Raubthier hat dasselbe scharfe Gebiß wie die Fischotter, nur hat es im Oberkiefer blos vier Backenzähne auf jeder Seite.

Der Pelz dieser Otter ist braun und auch im Sommer zu gebrauchen, dieser besteht aus glatt anliegenden, starken Haaren, unter denen sich ein dichtes gelblichbraunes Wollhaar befindet. Die Kehle ist weißlichgelb, die Schnauze weiß, die Lauscher sind schwarz. Der Kopf ist spitz und dem des Iltis ähnlich. Es spürt sich auch diesem sehr ähnlich, nur daß die Zehen durch eine kleine Schwimmhaut verbunden und behaart sind. Die Vorderläufe sind länger als die Hinterläufe. Auf dem Lande läuft sie ungeschickt mit gekrümmten Rücken, ist aber ein geschickter Schwimmer und Taucher.

Ihre Nahrung besteht aus Fischen, Krebsen, Fröschen, Wasserratten, Wasserkäfern, Eiern und jungen Wasser- und Sumpfvögeln.

Die Ranzzeit ist im März, und bringt das Weibchen nach neun Wochen 2 bis 4 Junge, die im zweiten Jahr ausgewachsen sind und $4^1/_2$ Dm. lang werden, wovon auf die Ruthe $1^1/_2$ Dm. kommen.

In Deutschland kommt sie nur im nördlichen Theil, und zwar nur sehr vereinzelt vor, doch werden noch fast alle Jahre in Holstein, Mecklenburg, den Marken und Pommern einzelne Exemplare zufällig oder bei Spurschnee erlegt oder in Tellereisen gefangen. Ihr Aufenthalt ist meist in unzugänglichen Brüchen oder an kleinen Bächen und Seen, wo sie am Tage in einem kleinen Bau oder zwischen Baumwurzeln, in alten Erlenstöcken und hohlen Bäumen liegt. Wegen ihrer großen Seltenheit interessirt sie den Jäger nur wenig.

Digitized by Google

Der Baummarder (Mustela martes).

Die Kennzeichen dieses zierlichen Raubthieres sind, daß es in der oberen Kinnlade sechs Schneidezähne, auf jeder Seite einen Fangzahn und fünf Backenzähne hat. In der unteren Kinnlade hat es ebenfalls sechs Schneidezähne und auf jeder Seite einen etwas kürzeren Fangzahn und sechs Backenzähne. Der Leib ist lang gestreckt, zierlich gebaut, hat lebhafte braune Seher, kurze abgerundete Lauscher. Läufe sind kurz, mit fünf behaarten Zehen, die durch eine Haut verbunden sind, und scharfen Krallen versehen. Die Farbe des dicht behaarten Balges ist schön hellbraun, unter welcher eine weißgraue Grundwolle durchschimmert. Im Winter und im späteren Alter wird der Pelz mehr dunkel kastanienbraun. Die Kehle und Brust ist gelb, die Ruthe dicht und lang behaart. Acht Bauchzitzen und kleine Afterdrüsen sind vorhanden.

Der Baummarder lebt überall in Deutschland, aber stets nur in einzelnen Exemplaren, und zwar mehr im Laub- als im Nadelholze, weil er dort mehr Nahrung und mehr hohle Bäume und Nester zu seinem Aufenthalte findet. Nur selten hält er sich in Ställen und Scheunen auf und liebt mehr die einsamen Waldungen, wo er auch nicht selten am Tage, namentlich im Sommer auf seinen Raub ausgeht.

Seine Nahrung besteht hauptsächlich in Mäusen, Eichhörnchen, jungem Geflügel, Eiern, Larven, Puppen, aber auch in jungen Hasen, Heidel- und Vogelbeeren. Häufig sucht er auch die Nester der Hummeln und Wespen auf, um den Honig zu fressen. Dem jungen Auer- und Birkwilde, Fasanen und Rebhühnern wird er sehr schädlich.

Der Baummarder lebt meist allein und findet sich nur in der Ranzzeit das Männchen zu einem Weibchen; er ranzt von Mitte Januar, ab und wirft das Weibchen in hohlen Bäumen und Nestern, selten in Gebäuden, zwei, höchstens vier Junge nach neun Wochen, die zehn Tage blind und im zweiten Jahre ausgewachsen

Digitized by Google

sind. Diese werden dann $5^2/_3$ Dm. lang, wovon die Ruthe $2^2/_3$ Dm. mißt, und $2^1/_2$ Dm. hoch. Es giebt Marder, wo schwer zu bestimmen ist, ob man sie als Baummarder oder als Steinmarder ansprechen soll, da diese bisweilen die dunkle schwarzbraune Farbe der Steinmarder und eine gelbe Kehle haben, dann giebt es wieder Marder mit hellbrauner Farbe und weißer Kehle, so daß man glauben muß, daß dies Bastarde vom Baum- und Steinmarder sind. In der Spur ist zwischen Baum- und Steinmarder kein Unterschied, nur ist die von letzterem gewöhnlich etwas kleiner.

Wenn die Baummarder jung eingefangen und hauptsächlich mit Milch und aufgeweichter Semmel aufgezogen werden und nur wenig Fleisch bekommen, werden sie sehr zahm, und laufen wie die Katzen im Zimmer umher und folgen ihrem Herrn auch nach dem Hofe und Garten.

Sein Balg ist das beste deutsche Pelzwerk, doch nur im Winter.

Er ist ein sehr guter Kletterer und Springer und baumt oft weite Strecken hinter einander von Baum zu Baum, ohne die Erde zu berühren, weshalb das Ausmachen desselben oft sehr schwierig und mühsam ist, da er auch in der Nacht von seinem eigentlichen Aufenthalte weit hin und her wechselt.

Man fängt ihn hauptsächlich in Prügelfallen, aber auch in Tellereisen, und schießt ihn bisweilen auf Treibjagden, oder man macht seinen Aufenthalt bei frischem Spurschnee aus und schießt ihn, indem man ihn aus einem Neste oder hohlem Baume durch Anklopfen an denselben oder durch Ausschwefeln heraustreibt.

Das Abstreifen u. s. w. des Balges ist wie bei den anderen vierläufigen Raubthieren.

Digitized by Google

Der Steinmarder (Mustela foina).

Dieser ähnelt in der Figur in allen Stücken dem Baummarder, nur ist er etwas kleiner und hat einen schmaleren Kopf. Das Haar ist dunkelbraun mit schwarzer Spitze. Die Kehle und Brust ist ganz weiß. Er lebt vorzugsweise in Gebäuden der Städte und Dörfer und isolirt gelegenen Scheunen, doch auch in hohlen Bäumen, unter Stein- und Holzhaufen der Feldhölzer, weniger in einsamen Waldungen. Auch geht er nur sehr selten am Tage aus seinem Versteck, da er dann fest schläft. Erst des Abends spät, wenn Alles auf den Gehöften still ist, sieht man ihn auf den Dächern umherspazieren und sichern, ehe er von dort abspringt, um auf Raub auszugehen.

Er ist es, der unter unserem Federvieh oft arge Verheerungen anrichtet, denn gelingt es ihm, in einen Hühnerstall oder Taubenschlag einzudringen, so würgt er alle Bewohner so lange noch einer lebt; er saugt dann bei vielen das Blut aus, frißt das Gehirn aus dem Kopfe von mehreren und schleppt nur einige junge Exemplare mit nach seinem Versteck. Er frißt aber auch viel junges Federwild im Walde, liebt Eier weniger, und vertilgt viele Mäuse, selbst in Scheunen und Ställen.

Eine wunderbare Eigenschaft von ihm ist, daß er in sehr seltenen Fällen in der Nähe seines Aufenthaltes raubt und die Hühnerställe und Taubenhäuser daselbst verschont.

Die Ranzzeit ist im Februar, wo unter vielem Gebeiße und Gekrächze oft mehrere Männchen ein Weibchen auf den Dächern umbertreiben und sich dadurch verrathen. Nach acht Wochen wirft das Weibchen zwei bis vier Junge, welche vierzehn Tage blind und schon im ersten Jahre ausgewachsen sind. Wegen seiner großen Mordlust läßt er sich nicht zähmen. Aus den Gebäuden, wo er unter dem Dache oder in Heu und Stroh liegt, läßt er sich am Tage, besonders gegen Abend, wo er mobil wird, mit Trommeln und Kuhglocken oder Klingeln sehr leicht herausbringen und erlegen,

Digitized by Google

wenn man sich vor die Löcher, wo er seinen Absprung hat, aufstellt und die Dächer überschießen kann.

Sonst gilt Alles, was vom Baummarder gesagt ist, auch von diesem.

Der Iltis (Mustela putorius).

Er ist kleiner als der Marder, hat ebenfalls ein scharfes Gebiß, in jedem Kiefer einen Backenzahn weniger. Die Lauscher sind breiter und abgestumpft. Läufe sehr kurz: Die fünf Zehen sind ganz getrennt von einander und mit scharfen, weißen Nägeln versehen. Die dicht behaarte Ruthe ist gerade und gestreckt und nur von halber Körperlänge. Die Brust und die Läufe sind schwarz, die hervorragenden Seher sind dunkelbraun und der Blick falsch, das Tageslicht scheuend. Das Weibchen hat vier Bauchzitzen. Die Grundfarbe des Balges ist hellgelb, die längeren Haare oben kastanienbraun oder schwarzbraun. Die Schnauze und der Rand der Lauscher sind weiß. Einen sehr üblen Geruch hat er an sich und wird deshalb auch Stänker genannt, welcher von Drüsen am After ausgeht. Seine Sinneswerkzeuge sind scharf, und ist er nur des Nachts mobil, während er am Tage schläft. Er klettert schlecht und bleibt meist auf der Erde.

In Deutschland ist er überall ziemlich häufig, lebt in Scheunen und Ställen, im Walde mehr am Rande in hohlen Bäumen zwischen ausgehöhlten Baumwurzeln, unter Holz- und Steinhaufen und in kleinen Bauen. Seine Nahrung besteht vorzugsweise in Eiern, zahmem und wildem Geflügel, jungen Hasen und Kaninchen, Fröschen und Mäusen. Der Jagd ist er sehr nachtheilig, obwohl er lange nicht so mordgierig ist wie der Steinmarder, und sich stets nur mit der Beute begnügt, die seinen Hunger stillt.

Die Ranzzeit ist von Ende Februar bis Anfang März; in welcher die Männchen des Nachts mit lautem Knurren und Schreien

Digitized by Google

um ein Weibchen streiten. Nach zwei Monaten wirft das Weibchen drei bis vier Junge, die vierzehn Tage blind sind.

Die Spur des Iltis ist der des Marders ähnlich, doch kleiner und runder, und zeichnen sich die Klauen wegen der weniger behaarten Zehen schärfer im Schnee ab. Auch steht dieselbe immer zwei und zwei etwas schräg neben einander, und macht er keine so weiten Sprünge als der Marder.

Sein Pelzwerk ist lange nicht so gesucht, als das der Marderarten und behält stets einen widrigen Geruch.

Man fängt ihn sehr leicht in Fallen und Tellereisen, besonders im Winter, wenn es ihm an Nahrung mangelt. Man braucht dann nur ein Ei auf das Eisen zu legen und dies mit Laub oder Spreu zu verdecken, fängt er sich jedoch blos mit dem Lauf, so schneidet er sich häufig, wie der Fuchs, aus dem Eisen und entflieht. Auch sucht man beim Spurschnee seinen Aufenthalt auszumachen und gräbt ihn aus seinem Bau oder schwefelt ihn aus hohlen Bäumen heraus, wobei man ihn todtschlägt oder schießt, wenn er herausfährt.

Das große Wiesel oder Hermelin (Mustela erminea).

Das Gebiß und die Zahnbildung ist wie beim Iltis, nur viel kleiner. Es ist ein lebendiges, gewandtes, keckes Thier. Die kleinen schwarzen Seher stehen sehr nach vorn, die kurzen Lauscher liegen dicht am Kopfe an. Der Hals ist lang und mit Kopf und Leib von gleicher Dicke. Im Sommer ist der Pelz rothbraun, im Winter weiß oder gelbweiß, doch kommen häufig auch im Sommer bei uns weiße vor. Die Spitze der Ruthe endigt in einem Haarbüschel, der zu allen Jahreszeiten schwarz ist. Der Bauch, die Kehle und Zehen sind weiß.

Die Hinterläufe sind länger als die Vorderläufe und mit sehr scharfen Krallen versehen.

Digitized by Google

Es bewegt sich hüpfend, klettert gut und durchkriecht alle Ritzen und Gänge, durch welche es den Kopf stecken kann.

Mitte März beginnt die Ranzzeit, und das Weibchen, welches acht Saugwarzen hat, wirft nach fünf Wochen drei bis sechs blinde Junge im Bau, die schon im ersten Jahre ihre vollkommene Größe erreichen und 3 Dm. lang werden, wovon auf die Ruthe 10 Cm. kommen. Die Höhe beträgt nur 6 Cm.

Unter allen Raubthieren ist das Wiesel am zahlreichsten verbreitet, lebt in der Erde in einem kleinen Bau, wozu es auch die Gänge der Maulwürfe und Mäuse benutzt. Seine Baue hat es am Rande der Waldungen, in Feldhölzern, Feldremisen, an Ufern, in Steinbrüchen, unter Steinhaufen, in Dämmen, und selten in hohlen Bäumen.

Sein Vorhandensein in Dämmen, die gegen Ueberschwemmungen schützen sollen, kann sehr gefährlich werden, wie die Anwesenheit von Maulwürfen und Mäusen, da seine Gänge häufig quer durch den Damm gehen, die dann bei Hochwasser leicht veranlassen, daß daselbst Deichbrüche entstehen, wenn die kleinen Röhren, wo das Wasser durchsickert, nicht bei Zeiten zugestopft werden.

Seine Nahrung ist dieselbe, wie die des Iltis, doch vertilgt es sehr viel mehr Mäuse, Maulwürfe und Ratten.

Bei schönem Wetter sieht man es oft auch am Tage, doch gewöhnlich verläßt es seinen Versteck erst in der Dämmerstunde.

Für die Federwildjagd ist es ein sehr schädliches Thier und wird von den Jägern lange nicht genug verfolgt, da es den Eiern, den brütenden Vögeln und deren jungen Brut sehr nachstellt.

Das Pelzwerk wird nur im Winter im weißen Kleide benutzt. Man fängt es in Fallen, kleinen Tellereisen und Drahtschlingen, und die mühsamen Jäger schießen es auch auf dem Anstande in der Nähe seines Versteckes.

Digitized by Google

Das kleine Wiesel (Mustela vulgaris).

Es ist unser kleinstes deutsches Raubthier und unterscheidet sich vom Hermelin nur dadurch, daß es kleiner ist, eine kurze gleichfarbige Ruthe ohne Haarbüschel und auf den Backen einen braunen Fleck hat.

Seine Farbe ist im Sommer und Winter hell braunroth, wobei Kehle und Bauch weiß sind. Bisweilen kommt es auch im Winter bei uns ganz weiß vor; doch sind dies meistens alte Exemplare.

Seine Ranzzeit ist erst Ende März.

Alles Uebrige, was vom Hermelin gesagt ist, gilt auch vom kleinen Wiesel, nur spürt es sich etwas anders.

Der Hund (Canis).

Nur die Hunderaçen sind hier aufgeführt, welche in Deutschland bei der Jagd vorzugsweise noch in Anwendung kommen und unentbehrlich sind.

Das Gebiß und die Zehenbildung sind wie beim Wolf, auch haben sie eine Daumwarze und nur selten eine vollkommene Afterklaue. Der Raçen giebt es unendlich viele, doch die reinen Raçen sind selten geworden, daher ihre Figur, Farbe und Talente sehr verschiedenartig.

Der Schweißhund.

Er wird nur auf angeschossenes, schweißendes Hochwild gebraucht, und nur ganz ausnahmsweise benutzt man in manchen Gegenden alte, firme Hunde noch statt des Leithundes, welche Raçe in Deutschland fast ganz verschwunden ist. Jedenfalls aber ist aus dem Leithunde unser deutscher Schweißhund,

Digitized by Google

theils durch Kreuzung, theils durch die Art und Weise des Abführens hervorgegangen.

Bisweilen findet man auch andere Hunderaçen, die den Schweiß verfolgen und sich oft gut bewähren, wenn sie dazu natürliche Anlagen zeigen.

Die noch rein erhaltenen Raçen der Schweißhunde haben eine rothgelbe, gelbbraune, rothbraune, wolfsgraue oder wolfsstriefige, bisweilen ins Schwarzbraune übergehende Farbe, ohne weiße Abzeichen. Sie sind von mittlerer Größe, haben glatte anliegende Haare, selten langhaarig, lange Behänge; die Brust ist breit, die Läufe sind stark und muskulös. Die Ruthe lang gestreckt und spitz zulaufend, von der Mitte etwas nach oben gebogen. Die Schnauze ist stumpf; ihr Aussehen ruhig, klug und edel.

Die guten Eigenschaften eines Schweißhundes sind:

1) Die schweißige Fährte, auf die er aufgesetzt ist, stets zu halten; selbst wenn sie zu schweißen aufhört; sie mag durch gesunde Fährten, Viehheerden, Wasser, Dickungen oder über Felsen gehen.
2) Er muß am Rieme stets zur linken Hand des Jägers gehen, ohne ihn zu incommodiren und auf dem Pürschwagen ruhig liegen.
3) Auch muß er sich ablegen lassen, und darf nur laut werden, wenn er ein krankes Stück Wild, an welches er angehetzt wird, in Sicht bekommt.
4) Die einzelnen Schweißtropfen muß er mit der Nase zeigen und markiren, überhaupt eine gute Nase haben, so daß er noch nach 10 bis 12 Stunden den Schweiß und die Fährte wittern und verfolgen kann.
5) Endlich muß er, wenn er angehetzt ist, das kranke Wild zum Stellen bringen, und darf es nur in die Hessen beißen, nicht niederreißen, und wenn es sich stellt oder gar verendet ist, so lange verbellen, bis der Jäger herankommt und den Fangschuß giebt.

Das Abführen, d. h. die Dressur eines Schweißhundes ist

Digitized by Google

sehr mühsam und erfordert eine langjährige Praxis. Es läßt sich hierüber allein eine Broschüre schreiben, daher kann dies Kapitel hier nicht weiter berührt werden.*)

Der Hühner- oder Vorstehhund.

Die Figur und Farbe ist durch die vielen Kreuzungen unendlich verschieden, und ist die alte deutsche Hühnerhundsraçe nicht mehr überall vertreten. Dieselbe ist meist glatthaarig, hat gewöhnlich eine kastanienbraune, weißbunte oder grau, braun und weiß gesprenkelte Farbe. Seine Figur ist gefällig, mit gestrecktem Leib und geradem Rücken; Läufe nicht kurz, aber muskulös, der Kopf stark, Schnauze stumpf, Behänge nicht zu lang; Ruthe lang und hochtragend. (Die Ruthe schlägt man in der Jugend so kurz ab, daß sie später nur 2 Dm. lang ist, weil sich die Hunde mit langer Ruthe beim Revieren im Holze stets wund schlagen und diese dann fortwährend schweißt.)

Gegenwärtig, wo man die deutschen Hühnerhunde mit den englischen vielfach gekreuzt hat, kommen alle nur denkbaren Farben und Figuren zum Vorschein. Die von England zu uns gekommenen Hühnerhunde bestehen aus zwei verschiedenen Arten, und zwar aus einer glatthaarigen (Pointer) und einer langhaarigen (Setter), die sich auch bei uns rein fortgepflanzt und eingebürgert haben. Die letzteren arbeiten lieber im Wasser als die Pointer, aber sie haben nicht die Ausdauer, besonders wenn es warm ist, und suchen langsamer.

Beide Raçen können dennoch vorzüglich in ihrer Art sein, doch ersetzen sie nur selten unseren alten deutschen Hühnerhund, indem sie in der Regel die guten Eigenschaften desselben, wie schnell Apportiren, im Wasser, Bruch und Dornen gleich gut arbeiten, in sich nicht immer vereinigen. Dagegen geben die Kreuzungen von deutschen und englischen Hunden ganz vorzügliche Hühnerhunde.

*) In der Gallerie edler Hunderaçen von Baron Nolde wird man eine Abhandlung hierüber finden.

Digitized by Google

Diese gekreuzten Hunde, besonders mit Pointern, haben gewöhnlich eine gute Nase, suchen schnell mit hoher Nase, haben eine große Ausdauer, arbeiten im Wasser und kehren sich nicht an Dornen oder Dickungen, sind überhaupt geborene Jäger und treue Kameraden für Jeden, der die Jagd exercirt.

Die Dressur der Hühnerhunde ist gewöhnlich eine künstliche, zerfällt in die Stubendressur und in die im Freien, und nur sehr selten findet man Hunde, die von Natur allen Anforderungen des Jägers entsprechen. Wenigstens muß den Hühnerhunden das Apportiren und der Appell beigebracht werden.

Der Dachshund oder Teckel.

Diese werden hauptsächlich gebraucht, um Dächse, Füchse und wilde Katzen in einem Baue festzumachen, damit man sie ausgraben kann, oder um diese aus demselben zu treiben und zu schießen. Bisweilen werden sie auch zum Aufstöbern anderer Wildarten in den Dickungen und Bergen benutzt, da sie nie weit und anhaltend jagen. Sogar beim Verfolgen von angeschossenem Wilde sind sie zu benutzen, da sie gern auf Schweiß gehen.

Die echten Teckel sind klein, lang, niedrig, der Bauch eingezogen, der Kopf schmal, Schnauze spitz, Gebiß stark. Die Ruthe ist etwas gekrümmt. Die Läufe muskulös und krumm nach auswärts stehend. Die Farbe ist gelb, grau oder getiegert und schwarz mit gelben Extremitäten, gelber Schnauze und gelben Augenflecken. Sie sind eine höchst eigenthümliche, sehr wachsame Hunderaçe, die sich vor allen anderen Hundearten durch ihre Unverzagtheit und Courage auszeichnet. Sie ist unverträglich, zänkisch und dominirt gern, trotz ihrer Kleinheit, über große Hunde. Mit der größten Todesverachtung lassen sie sich in die unsinnigsten Kämpfe ein und achten die erhaltenen Wunden nicht. Ihren größten Muth entwickeln sie aber unter der Erde in der Finsterniß eines Baues gegen ihre weit stärkeren Feinde.

Junge Hunde werden gewöhnlich von älteren guten Teckeln mit angelernt.

Digitized by Google

Die Bracke.

Man gebraucht diese Hunde vorzugsweise bei uns zum Aufstöbern und Jagen der Hasen und Füchse bei Holzjagden, aber auch bei der hohen Jagd, wo das Hochwild nur als Wechselwild oder einzeln vorkommt, um dasselbe aus den undurchdringlichen Dickungen oder Felsenpartien aufzustöbern und vor die angestellten Schützen zu bringen.

Dieselben sind von mäßiger Größe, haben eine halbgekrümmte Ruthe, die Haare meist glatt anliegend. Die Farbe ist sehr verschiedenartig, aber meistens schwarz, gelb, braun und grau oder weiß mit schwarzen und gelben Flecken. Sie sind nicht schnell, aber halten die Spuren und Fährten gut.

Die Bracken werden nicht dressirt, sondern folgen bei Ausübung ihres Berufes ganz ihrem Instincte und ihrer Passion; sie sind ungestüm und roh, haben weniger Attachement an ihren Herrn als andere Hunderaçen und haben als Lebenszweck stets vor Augen: Wild aufzuspüren und es mit lautem Halse auf der Fährte oder Spur zu verfolgen, bis es erlegt ist oder sie abgerufen werden.

Der Saufinder und der Sauhetzhund.

Beide Arten haben keine besondere Figur, Farbe oder constante Unterscheidungszeichen, da jeder Hirtenhund oder Kreuzungen von diesem mit Schweißhunden, Hühnerhunden und großen Teckeln zur Saujagd zu gebrauchen sind. Sie müssen nur die Eigenschaft haben, blos auf der Fährte vom Schwarzwilde laut zu jagen und den Muth besitzen, diese auch zu attakiren. Die von Hirtenhunden abstammenden Hunde dieser Art haben meist einen spitzen Kopf mit hochstehenden Behängen, geringelter Ruthe und sind von wolfsgrauer oder schwarzbrauner Farbe, mit langen oder krausen Haaren versehen.

Zu Saufindern wählt man jedoch mehr kleinere, langsame

Digitized by Google

aber scharfe Hunde, die von den Sauen nicht so leicht geschlagen werden können, da sich das Schwarzwild vor einem kleinen Hunde auch weit eher stellt und der Jäger schneller an dasselbe schußmäßig herankommen kann. Diese jagen auch stets allein, es sei denn, daß sie bei einer größeren Jagd mit einer Meute von Sauhetzhunden bisweilen gemeinschaftlich jagen, nachdem sie die Sauen im Treiben aufgesucht und verbellt hatten.

Zu Sauhetzhunden benutzt man etwas größere Hunde, die schneller und lebhafter sind, als die Finder. Sie werden gekoppelt geführt und losgelassen, von einem Rüdemann durch Hornsignale und Rufe geleitet. Sie haben den Beruf, bei einer größeren Saujagd das Schwarzwild aus den Dickungen und schwer zugänglichen Berghängen loszumachen und vor die Schützen zu bringen, nachdem ein Finder sie schon vorher gestellt hat. Sie jagen theils in der Meute zusammen, trennen sich aber auch von einander, wenn die Sauen auseinander gesprengt sind. Oft werden von ihnen auch angeschossene und gesunde Schweine gedeckt, die dann möglichst schnell vom Rüdemann abgefangen werden, nachdem die Hunde abgeklatscht sind.

Eine besondere Dressur ist bei ihnen nicht weiter nöthig, als daß sie auf die Hornsignale des Rüdemanns hören und sich sammeln, wenn dieser bläst. Die jungen Hunde lernen von den älteren das Jagen von selber, wenn sie mit diesen zusammen gelöst werden.

Die Parforcehunde.

Diese sind aus England und Frankreich zu uns gekommen, und werden auch noch theilweise von dort sogar in ganzen Meuten bezogen. Sie können ebenfalls nach Größe, Figur und Farbe sehr verschieden sein, und giebt es Parforcehunde, die blos auf Rothhirsche, blos auf Sauen, blos auf Füchse oder Hasen jagen. Die Grundfarbe ist meist weiß mit schwarzen, gelben oder braunen Flecken. Ihre Passion ist ihnen von Natur gegeben, und ihre

Digitized by Google

Dressur besteht hauptsächlich im Beibringen von dem unbedingten Gehorsam, auch daß sie sofort auf ihren Namen hören und das Hornsignal „Sammeln" kennen. Sie werden deshalb von Jugend auf zusammen in einer Meute ungekoppelt ausgeführt, und muß diese stets beim Piqueur dicht aufbleiben, wobei sie mit der Hetzpeitsche vom Pferde aus regiert werden. Wenn sie auf eine frische Fährte losgelassen werden, giebt ihr Gebelle ein schönes, wohlklingendes, weithin hörbares Geläute. Man gebraucht sie erst, wenn sie mindestens 1½ Jahr alt sind, und jagt mit ihnen stets nur so lange kein Schnee und strenger Frost eingetreten ist.

Die Parforcehunde für Rothhirsche und Schwarzwild sind von gleicher Größe und stets viel stärker und höher als die Fuchs- und Hasenhunde. Sie haben große Behänge, eine stets spielende, hochtragende Ruthe und glatte Haare. Die Brust ist breit, Läufe mäßig stark und der Leib schlank. Sie haben ungemein große Passion, einen Rothhirsch oder ein Schwein zu jagen, und müssen sie diese einholen, stellen und decken. Man jagt mit ihnen im Holze.

Die Parforcehunde, die auf Füchse und Hasen benutzt werden, sind, wie schon gesagt, viel kleiner als die vorigen, feiner gebaut, nicht so schnell und haben eine halbgekrümmte Ruthe. Die Farbe ist meist schwarz oder weiß und gelb gefleckt, und giebt es kurze und langhaarige Hunde dieser Art. Ihr Auge ist lebhaft, und haben sie eine thatendurstige Physiognomie und große Ausdauer. Sie werden nur zum Hetzen im freien Felde oder auf großen Heiden benutzt.

Der Windhund.

Ein guter Windhund muß eher groß als klein sein. Er muß einen lang gestreckten und scharf eingezogenen Leib haben und recht muskulös gebaut sein. Sein Kopf ist schmal, die Schnauze spitz mit scharfen Zähnen. Der Hals ist lang, Ruthe dünn und Läufe hoch. Letztere müssen auch harte Ballen haben, damit sie sich nicht

Digitized by Google

durchlaufen. Die Farbe der meisten Windhunde von edler Rasse ist schwarz, weiß oder grau. Das Gesicht muß besonders gut sein, aber auch die Nase. Man jagt mit ihnen nur im freien Felde, auf großen Weideflächen und Heideflächen auf Füchse und Hasen, gewöhnlich mit zwei bis drei Hunden zugleich, obgleich es auch Solofänger giebt. Sein Naturtrieb giebt ihm die Jagdpassion, und besteht seine Dressur meist nur darin, so daß er strickbändig wird, d. h. er muß stets, an der Hetzleine befestigt, neben dem Reiter willig folgen, ganz gleich, ob dieser langsam oder schnell rektet. Gewöhnlich hetzt man junge Hunde mit älteren zusammen ein. Seine guten Eigenschaften sind große Schnelligkeit, Gewandheit im Fangen der Füchse und Hasen und auch, daß sie das gefangene Wild nicht zerreißen.

Digitized by Google

Die Vögel in Deutschland,

soweit sie zur Jagd gehören oder für die Jäger Interesse haben.*)

Die Trappe (Otis tarda).

Sie ist an Gewicht unser größter einheimischer Vogel und gehört zum Hühnergeschlecht. Der Hahn wird bis 14 Kilo schwer. Er erreicht eine Länge, vom Schnabel bis zur Schwanzspitze gemessen, $1^1/_5$ Meter, und wenn die Flügel ganz ausgebreitet sind, von der Spitze der längsten Schwungfeder bis zur anderen gemessen, eine Breite von $2^1/_4$ Meter.

Der Kopf, die obere Brust sind aschgrau, die Federn des Rückens auf rostgelbem Grunde schwarz und in die Quere gebändert. Der Bauch ist weiß, die Schwanzfedern rostroth mit weißen Spitzen und einem schwarzen Querbande. Der Bart am unteren Theile des Schnabels besteht aus vielen, fast 1 Dm. langen, feinen, grauweißen Federchen. Der Schnabel und die Augen sind dunkelbraun; die geschuppten Ständer grau und mit 3 dicken Zehen und stumpfen Nägeln versehen. Die großen Ohröffnungen sind mit kurzen Federn bedeckt.

Das Weibchen ist sehr viel kleiner, von derselben Farbe hat keinen Bart und wird nur circa 5 Kilo schwer.

---

*) Die Vögel variiren bekanntlich sehr im Gefieder nach Jahreszeit, Geschlecht und Alter, weshalb hier nur ihr Frühjahrskleid beschrieben ist. Ebenso ist die Länge und Breite durchschnittlich angegeben, da die Maße sich nach Geschlecht und Alter häufig auch merklich ändern.

Digitized by Google

Die Trappe ist in Deutschland überall auf großen Feldern in einzelnen Exemplaren anzutreffen, nur in der Mark, Sachsen und Anhalt kommt sie im Winter und Frühjahr in größeren Flügen von 30—50 Stück auf den Raps- und Saatfeldern vor. Wenn es jedoch sehr kalt wird und hoher Schnee fällt, streicht sie nach südlicheren Gegenden, und rechnet man sie daher zu den Strichvögeln.

Sie nährt sich von Rüben, Raps, grünem Saat, Klee, Kohl, Getreidekörnern, Insekten und Schnecken und verschluckt stets kleine Kieselsteinchen, wie alle hühnerartigen Vögel, die zu ihrer Verdauung dienen.

Die Balzzeit ist im April und tritt ein Hahn mehrere Hennen. Die Trapphähne benehmen sich beim Balzen genau wie die zahmen Puterhähne und gewähren einen prachtvollen Anblick. Sie schlagen mit dem Steiß ein Rad, plustern die Federn ganz auf, lassen die Flügel hängen und legen den Kopf und aufgeblasenen Hals ganz zurück. Ein solcher balzender Hahn sieht von Weitem ganz weiß aus, und kann man ihn auf 1000 Schritte weit erkennen.

Das Weibchen legt 1—2, selten mehr, grünliche oder braun gefleckte Eier in die grünenden Saatfelder auf der platten Erde. Höchstens einige Grashalme dienen als Unterlage, und brütet es 28—30 Tage.

Wenn die Hennen in der ersten Hälfte der Brütezeit gestört werden, so verlassen sie das Nest auf immer, später sitzen sie jedoch so fest, daß man darauf treten kann, ehe sie aufsteigen, und nehmen sie es dann auch stets wieder an. Im August können die Jungen fliegen, und schießt man sie im September bei der Hühnerjagd, wo sie einen wohlschmeckenden Braten liefern.

Außerdem werden die Trappen durch Anfahren mit einem Leiterwagen und auf Treibjagden im Winter und Frühjahr geschossen. Im Winter werden sie häufig bei den großen Hasenjagden gelegentlich erlegt, da sie dann, besonders bei nebeligem Wetter, niedrig fliegen.

Digitized by Google

Im Frühjahr, wenn man nur auf Trapphähne eine Treibjagd veranstaltet, stellen sich die Schützen hinter Bäumen oder in Gräben verdeckt auf, und einige Jäger zu Pferde reiten die Trappen mit einem großen Umwege an, jagen sie auf und treiben sie so den Schützen zu. In manchen Gegenden haben die Trappen ihren bestimmten Flug, um von einer Feldmark in die andere zu streichen, und solche Wechsel halten sie dann auch, wenn sie aufgejagt werden. Diese Stellen werden mit Schützen besetzt, und wenn die Trappen nicht zu hoch fliegen, werden sie geschossen. Ihr Flug sieht langsam aus, aber in der Wirklichkeit fliegen sie so schnell, wie ein Courierzug auf der Eisenbahn fährt, woher es kommt, daß die besten Schützen diesen großen Vogel oft fehlen, indem sie nicht weit genug vorhalten und hinterwegschießen.

Bisweilen kommt in Deutschland auch noch eine sehr viel kleinere Trappenart, die Zwergtrappe (Otis tetrax) vor, die aber für unsere Jägerei weiter kein Interesse hat, da sie mehr in Ungarn, der Türkei und Italien vorkommt und kein einheimischer Vogel ist.

Das Auerwild (Tetrao urogallus).

Es gehört zu den hühnerartigen Vögeln, und beträgt die Länge des Hahnes $6\frac{1}{2}$ Dm., die Breite etwas über 11 Dm., doch weichen die Maße öfter um einige Centimeter ab, je nachdem es ein ganz altes oder junges Männchen ist. Im zweiten oder dritten Jahre ist er erst vollkommen ausgewachsen. Die Länge des Steißes beträgt $2\frac{1}{2}$ Dm. Derselbe ist von schwarzer Farbe mit einzelnen weißen, unregelmäßigen Flecken. Das Gefieder am Hinterhalse und Rücken ist braun mit grau geaderten Federn. Die Flügeldecken mehr rostbraun. Die Schwungfedern sind an der schmalen Seite meist weiß und die kleinen schwarzen unter dem Steiße sitzenden Federn enden in unregelmäßig weißen Spitzen. Die Brust ist bläulich und ins Grüne schillernd. Der dicke gekrümmte

Digitized by Google

Schnabel ist gelblich weiß. Um den Augen befindet sich eine rothe, warzige Haut, welche man Rose nennt, und an der Kehle ein schwarzer Federbart. Auf der Ecke der Flügelgelenke ist ein weißer Fleck, das Schild genannt, vorhanden. Die Ständer sind ganz befiedert. An den Zehen sitzen kleine, hornartige Franzen, welche Stifte heißen, und welche der Hahn sich in der Balzzeit allmälig abtritt oder abbeißt, so daß es ein Zeichen ist, daß die Balz zu Ende geht, wenn die Stifte meist fehlen. Während des Sommers wachsen diese wieder.

Das Weibchen ist nur halb so groß als das Männchen und hat an der Kehle keinen Federbart. Das ganze Gefieder ist rothbraun und rostgelb, schwarz und weiß gebändert oder gefleckt. Der weiße Fleck an den Ecken des Flügels, das Schild, ist meist nur angedeutet.

Das Auerwild kommt in ganz Deutschland, aber nur in großen, zusammenhängenden, besonders Nadelholz- oder Buchenwaldungen vor, wo sich fließende Bäche mit Kiesgrund oder grobem Sande vorfinden. Es lebt im Gebirge und in der Ebene und gehört zu den Standvögeln, da es seinen eigentlichen Aufenthaltsort nicht anders verläßt, als wenn sich die Waldbestände durch Hauungen oder Sturm verändern. Sie streichen dann auch nur in andere benachbarte Forstorte oder Reviere, um sich einen neuen, ihnen wieder zusagenden Stand aufzusuchen. Am Tage leben sie einzeln auf der Erde in hoher Heide, Heidelbeerkraut, in Wachholderbüschen, Dickungen und Samenanflug unter hohen Beständen und erst des Abends spät, eine halbe Stunde nach Sonnenuntergang oder noch später, schwingen sie sich auf bestimmte Bäume, sogar auf bestimmte Aeste ein. In der Balzzeit fangen hier die Hähne lange vor Tagesanbruch an zu balzen. Bisweilen jedoch balzen sie auch schon des Abends gleich nach dem Einschwunge kurze Zeit, oder sie geben einzelne Töne von sich, die man Worgen, Kröpfen oder Rülpsen nennt. Kurz vor Sonnenaufgang kommen die Hennen angestrichen und schwingen sich auch erst auf die Gipfel der Bäume in der Nähe des Balz-

Digitized by Google

platzes ein, und wenn die Sonne aufgeht, fallen sie auf die Erde, wohin die Hähne folgen, um sie zu treten.

Sind mehrere Hähne auf dem Balzplatze, so kämpfen diese sehr leidenschaftlich mit einander, es verfolgt der stärkere Hahn den schwächeren oft im schnellsten Laufe 300—400 Schritte weit, während nicht selten ein dritter Hahn hinzukommt und die Hennen tritt. Beim Kämpfen auf der Erde sträuben sich alle Federn, der Steiß wird fächerartig ausgebreitet, die Flügel hängen herunter und attakiren sie sich gegenseitig mit vorgestrecktem Halse, fliegen gegen einander hoch und beißen sich.

Die Aesung des Auerwildes besteht hauptsächlich in Knospen und Nadeln der Nadelhölzer, in Buchenknospen, Waldbeeren, Bucheln, Eicheln, Insekten, Würmern und Ameisen. Dabei verschluckt es ebenfalls kleine Kieselsteinchen, die zur Verdauung nöthig sind. Diese Steinchen behält es jedenfalls lange im Magen und ergänzt die abgehenden allezeit wieder. Sie schleifen sich im Magen aneinander ab und haben mitunter eine schöne glänzende Farbe, weshalb sie auch von den Jägern zum Andenken aufgehoben werden.

Die Balzzeit beginnt in den meisten Gegenden Ende März und dauert bis Mitte April, im Gebirge bis Ende April. Die Henne legt in einem kunstlosen Neste, welches mit Grashalmen und Federn ausgefüttert ist, an der Erde 4 bis 8 grünlich graue, mit feinen braunen Flecken versehene Eier, in der Größe der zahmen Putereier. Sie brütet 28 Tage, und nach 4 Wochen können die Jungen sich schon auf die Bäume aufschwingen und sind dann mehr gegen ihre Hauptfeinde, die Füchse, Katzen, Marder u. s. w. gesichert.

Was die Jagd auf Auerwild anlangt, so wird sie von der waidgerechten Jägerei nur in der Balzzeit ausgeübt, und ist dann ein wahres Jägervergnügen. Hennen schießt man natürlich in Deutschland, wo es nur noch mäßig viel Auerwild gibt, niemals und auch nur ausnahmsweise einmal einzelne junge Hähne vor dem Hunde. Die beste Zeit zur Jagd ist vom 5. bis 16. April, wo dann die Hähne am anhaltendsten balzen, wenn die Witterung nicht

Digitized by Google

zu unbeständig ist und die Hähne meist ihren ganz festen Stand genommen haben. Man verhört in dieser Zeit des Abends spät die Forstorte, wo die Hähne sich einschwingen. Des Morgens, etwa $1^1/_2$ Stunde vor Sonnenaufgang, begiebt man sich mit der Flinte dorthin, wo die Hähne oder ein einzelner Hahn sich eingeschwungen hat und wartet bis dieser sich hören läßt. Er beginnt das Balzen damit, daß er mit dem Schnabel knappt, was man bei stillem Wetter über 200 Schritte weit hören kann, und was sich anhört, als wenn man zwei trockene Hölzer oder größere Knochen zusammenschlägt. Das Knappen wird allmälig immer schneller, dann kommt der Hauptschlag, was so klingt, als wenn man einen festsitzenden Pfropfen aus einer Flasche zieht oder mit der Zunge laut schnalzt. Dann erfolgt das Wetzen, Schleifen oder Versmachen, was 2—3 Secunden anhält, und in welchem Momente der Hahn nicht hört und sieht.*) Sowie der Hauptschlag erfolgt ist und das Schleifen beginnt, kann der Jäger drei weite Sprünge oder Schritte machen, muß dann regungslos stehen, so lange bis der Hahn wieder schleift. Ist man nun schußmäßig, also bis auf 36 Schritte herangesprungen, und ist es noch so dunkel, daß man den Hahn nicht deutlich zu sehen bekommen kann, dann wartet man den Tag ruhig ab, um ihn sicher zu schießen und ergötzt sich während dieser Zeit an seiner herrlichen Musik. Schießt ein Schütze mit starkem Jagdfieber in der Dunkelheit fehl, weil er vielleicht einen dunkeln Zacken für den Hahn hielt und fällt der Schuß während des Schleifens, so bleibt

*) In den Würtembergischen naturwissenschaftlichen Jahresheften von 1875, Seite 61, befindet sich ein sehr interessanter Vortrag mit Präparaten belegt, über die Taubheit des Auerhahnes während des Schleifens in der Balzzeit. Dann über den neu entdeckten Farbstoff, welchen die rothe, warzige Haut um die Augen des Auerhahnes und noch anderer hühnerartigen Vögel enthält. Endlich auch hat man die Entdeckung gemacht, daß der Auerhahn in der Mauserzeit nicht blos die Krallen, sondern auch 3,3 Cm. lange, 1,6 Cm. breite und 2 Mm. dicke Hornplatten vom Schnabel verliert, die sich bald wieder erneuern.

Digitized by Google

er oft sitzen und fängt nach einer Weile wieder an zu balzen. Der sicher verblüffte Jäger kann dann seinen zweiten Schuß anbringen.

Ist der Auerhahn erlegt und noch nicht verendet, so fängt man ihn mit dem Jagdmesser im Genick dadurch ab, daß man ihm einen Stich nach dem Gehirn zu giebt.

Gewöhnlich sitzen die Hähne im Anfange beim Balzen, so lange es noch dunkel ist, ganz still, und nur beim Schleifen bewegen sie den Hals nach vorn ausgestreckt und sperren den Schnabel auf, auch lassen sie dann die Flügel etwas hängen. Den Steiß falten sie aber dabei niemals fächerförmig hochhaltend aus, wie dies so oft malerisch abgebildet oder beschrieben ist, sondern halten ihn ganz geradeaus. Haben die Hähne erst einige Zeit des Morgens gebalzt, und wird es mehr Tag, dann fangen sie an, wenn sie auf einem bequemen Aste stehen, sich hin und her zu bewegen, umzudrehen, zu bücken und allerhand possierliche Bewegungen zu machen, wodurch man sie oft in der Dunkelheit erst erkennt und was zu beobachten ein großer Genuß ist. Auch springen oder streichen sie dann nicht selten auf einen anderen Ast. Das Uebertreten auf einen anderen Ast heißt Nachstehen. Um die Auerwildstände zu erhalten und pfleglich zu behandeln, muß dem Raubzeuge sehr nachgestellt und dürfen Hennen gar nicht geschossen werden. Auch sind die Reviere, wo sie brüten, in keiner Weise zu beunruhigen, und ist mit dem Holzhiebe darauf Rücksicht zu nehmen, daß die Bestände, wo die Hähne gern balzen, ganz mit dem Hiebe verschont bleiben. — Wenn man das Gescheide beim Auerhahn entfernen will, was ausfahren heißt, so zieht man dies nicht mit einem Haken heraus, sondern man schärft den Bauch mit dem Genickfänger vom After aus eine Hand breit auf und nimmt das Gescheide mit der Hand heraus. Sein Wildpret muß sehr künstlich präparirt werden, um es schmackhaft zu machen, und wird meistens zu Pasteten verbraucht.

In den Gegenden, wo Auer- und Birkwild zugleich vorkommt, werden die Auerhennen bisweilen von Birkhähnen getreten, und entstehen aus solchen betretenen Eiern eine kleinere Art Auerwild, die

Digitized by Google

man Rackelhähne nennt. Sie sehen in der Figur den Auerhähnen am ähnlichsten. Das Gefieder ist auf dem Oberrücken schwarz, mit grauen, feinen Aderlinien durchzogen. Die Flügel sind schwärzlich braun und grau durchwässert und haben eine grauweiße Binde. Der etwas ausgeschnittene Steiß ist schwarz, nur einzelne Federn sind weiß eingefaßt. Der Schnabel ist schwarz und ähnelt dem des Birkhahnes. Auf dem Balzplatze des Birkwildes geben sie bisweilen einen unangenehmen Störenfried ab, da sie die Hähne von dort verjagen. Uebrigens führt der Rackelhahn dieselbe Lebensweise wie der Auerhahn und kommt nur sehr selten in Deutschland vor.

Das Birkwild (Tetrao tetrix).

Dasselbe gehört ebenfalls zu den hühnerartigen Vögeln, und wird der Hahn $3^1/_3$ Dm. lang und 8 Dm. breit. Das Gefieder ist schwarz und schön stahlblau glänzend. Auf den Flügeln befinden sich weiße Binden, die Federn unter dem Steiß oder Spiel sind weiß; die oberen schwarz und nach außen hakenförmig, wie eine Lyra gebogen. Die Jäger schmücken ihre Jagdhüte damit. Der Schnabel ist schwarz, und um den Augen herum befindet sich eine schön hellrothe Haut, die man Rose nennt. Die äußeren und inneren Zehen am befiederten Ständer sind gleich lang und alle drei durch eine Spannhaut verbunden und mit ganz feinen Federchen versehen. Die Henne ist sehr viel kleiner als der Hahn, der Steiß gerade abgeschnitten, das Gefieder rostgelb und braun mit schwarzen Flecken und Querbinden.

In Deutschland kommt es in der Ebene und im Gebirge, in großen Heiden und auf nicht zu nassen Brüchen, wo noch die Birke wächst, am häufigsten vor. Am meisten liebt es schlecht bewirthschaftete, devastirte Waldungen, wo große Blößen und uncultivirte Flächen vorhanden sind, die viel Heidel- und Preißel-

Digitized by Google

beeren, sowie Heidekraut produciren. Seine Nahrung besteht hauptsächlich in Waldbeeren, Knospen der Bäume, Blüthekätzchen der Birken, Erlen und Haseln, Insekten, Würmern, Schnecken und Puppen der Ameisen.

Die Balzzeit ist im April bis Anfang Mai. Die Hennen scharren sich eine flache Vertiefung in die Erde unter einem Strauch, oder im hohen Gestrüpp, welche mit Gras und Federn ausgefüllt ist, und legen darin 8 bis 14 grünlich gelbe, mit braunen Flecken versehene Eier. Nachdem die Hennen angefangen haben zu brüten, kommen die Jungen nach 21 Tagen aus. Bis zum September sind die Jungen ausgewachsen, und die Hähne sind schon im August durch die dunklere Farbe vollständig von den Hennen zu unterscheiden. Gewöhnlich sind bei einer Brut $^2/_3$ Hähne und $^1/_3$ Hennen.

Man schießt die Hähne, wo es viel Birkwild giebt, in jungen, mit dichtem hohen Grase bewachsenen Schlägen, oder auf Culturen, wo hohes Heidekraut vorhanden ist, doch sind sie im September schon sehr flüchtig und halten den Hund nicht immer aus.

Die meisten Birkhähne werden in der Balzzeit des Morgens früh geschossen. Zu dem Ende beobachtet man auf einer Wiese, einem Stoppelfelde, Torfmoore oder Cultur, wo die Hähne an der Erde des Morgens bei Sonnenaufgang stehen, und bauet dorthin schon im März, oder wenn man die Balzplätze aus vorhergehenden Jahren kennt, noch früher an verschiedenen Stellen kleine Hütten oder Schirme von Reisigholz, damit sich die Hähne daran gewöhnen und nicht Argwohn schöpfen.

In eine dieser Hütten begiebt man sich $1^1/_2$ Stunde vor Tagesanbruch, und wenn die Heidelerchen an zu singen fangen, kommen die Hähne und etwas später die Hennen angestrichen und fallen einzeln auf den Balzplätzen umher ein, wobei die Hähne gewöhnlich immer auf derselben Stelle wieder einfallen, wenn sie nicht gestört werden. Dann sitzen sie wohl 10 Minuten lang ganz stille und nun beginnt ihr herrliches Waldconcert. Sie geben dabei einen zischenden und laut kullernden Ton von sich, den man

Digitized by Google

über eine viertel Stunde weit hört, springen wie rasend in die Höhe, schlagen ein Rad, wie die Puter; und machen die drolligsten Bewegungen, wobei sich alle Federn in die Höhe sträuben. Kommt ein Hahn dem andern zu nahe, so kämpfen sie sehr erbost mit einander, so daß viele Federn auf dem Kampfplatze zurückbleiben. Man kann dabei, wenn es erst Tag geworden ist, bisweilen sogar zwei Hähne auf einen Schuß erlegen, wenn man es abpaßt, daß sie zusammenfliegen. Hat man noch im Dunkeln geschossen, so streichen alle Hähne und Hennen, die in der Nähe saßen, fort, aber bald kommen sie und noch andere zurück. Mitunter sieht man auf den Balzplätzen gar keine Hennen, und die wenigen gegenwärtigen werden daselbst auch nur selten getreten. Geht die Sonne auf, so verläßt das ganze Birkwild die Balzplätze, und erst gegen halb 7 Uhr beginnt ein zweiter Einfall der Hähne, und man kann dann bei Tage noch mehrere Male zu Schuß kommen. Bei solcher Balz ist es nicht unvortheilhaft, eine Büchsflinte zu führen, im Fall sie zu weit von der Hütte, worin man sich verborgen hat, einfallen und man sie nicht mit der Flinte erreichen kann. Bald nach 7 Uhr ist die Balz vorbei, und die Hähne und Hennen streichen vom Balzplatze ab nach dem Holze, wo sie theils aufbäumen, theils auf die Erde einfallen, und wo sie Aesung suchen und die Hennen getreten werden.

Hat man einen Morgen gar nicht geschossen, weil die Hähne zu weit von dem Schirm, worin man saß, einfielen, so kann man gleich einen Schirm dahinbauen, wo die Hähne hauptsächlich saßen, und man kommt dort am folgenden Morgen sicher zu seinem Zweck.

Bisweilen fallen die Hähne und Hennen auch gegen Abend nach 6 Uhr auf die Balzplätze kurze Zeit lang ein, balzen dann nur selten, aber man kann doch noch einige Male zum Schießen kommen.

Nach der Balzzeit ziehen sich die Hähne zusammen und leben in großen Flügen von 50 bis 60 und noch mehr Stücken zusammen, wobei man gewöhnlich nur einige Hennen sieht, da diese

Digitized by Google

einzeln mehr für sich zusammen leben. Das Birkwild streicht wohl von einem Revier zum andern, aber nicht weit von seinem Geburtsorte, so daß es zu den Standvögeln gehört.

Auch bei der Treibjagd im Winter wird das Birkwild erlegt, doch fliegt es meistens sehr hoch und schnell und ist daher nicht leicht zu schießen. Sein Wildpret ist auf der Brust theils weiß, theils ganz dunkel und sehr viel schmackhafter, besonders der Jungen, als das des Auerhahnes.

Um das Birkwild in einer Jagd zu conserviren, dürfen die Hennen nie geschossen werden, außerdem aber müssen die Reviertheile, worin sie brüten, ganz von der Grasnutzung und Hütung ausgeschlossen und überall muß das Raubzeug eifrig vertilgt werden.

Das Haselwild (Tetrao benasia).

Die Länge dieses Waldhuhnes beträgt 3 und die Breite 6 Dm. Der schwarze Schnabel des Hahnes ist an der Spitze wenig gekrümmt. Ueber den Augen befindet sich ein warziger, hellrother Streifen. Der 1 Dm. lange Steiß ist abgerundet und von schwärzlicher, grauer und röthlicher Farbe. Die Ständer sind bis an die Zehen befiedert. Das Gefieder des ganzen Körpers ist im Allgemeinen braunroth und grau mit schwarzen und weißen Flecken, die schwarze Kehle ist weiß berändert. Auf dem Kopfe hat es eine kaum merkliche Haube. Die Henne ist etwas kleiner, hat dasselbe Gefieder wie der Hahn, doch fehlt die dunkle schwärzere Kehle.

Die Nahrung des Haselwildes ist dieselbe wie die des Birkwildes. Sein Vorkommen in Deutschland erstreckt sich nicht überall, sondern findet sich nur in einzelnen gebirgigen Gegenden, wie z. B. in den Rheinprovinzen, Schlesien, und auch stets nur in mäßiger Anzahl. Es liebt vorzugsweise die mit Haseln, Birken, Eichen und Nadelholz gemischten Bestände in den Gebirgen und

Digitized by Google

kommt in der Ebene von Norddeutschland nur in Ostpreußen vor. Sie sind Standvögel und paaren sich in der Balzzeit. Diese fällt im April, und läßt der Hahn dann vom Baume aus einen feinen trillernden Ton oft während der ganzen Nacht hören.

Die Henne scharrt sich im hohen Grase, Farrenkraut oder Gestrüpp ein einfaches Nest, füllt dies mit Federn aus und legt 10 bis 14 braungelbe, mit dunkelbraunen Flecken versehene Eier. Sie brütet drei Wochen, und die Jungen leben anfänglich nur von Insekten. Erst wenn diese fliegen können und aufbäumen, findet sich der Hahn wieder zu dem Gesperre und leben sie bis im März gesellig.

Man schießt das Haselwild auf der Suche vor dem Hühnerhunde, fängt es leider auch in Laufdohnen und Schneehauben und lockt die Hähne auch außer der Balzzeit im September und October durch kleine, aus Gänseknochen gefertigte Lockpfeifen. Die Hähne hören diese auf unglaublich weiter Entfernung, und die kampflustigen Hähne kommen stets sicher, nachdem sie erst einige Male geantwortet haben. Man muß sich zwar gedeckt aufstellen, aber doch so, daß man frei um sich sehen kann, da die Hähne entweder gelaufen oder sehr schnell gestrichen kommen, um auf einem Baume oder auf der Erde einzufallen. Diese Jagdart durch Anlocken gewährt einen großen Reiz, und kann man auf einer Stelle häufig in kurzer Zeit mehrere Hähne erlegen, wenn man sich nach dem Schusse nur alle Zeit ganz ruhig verhält und sich nicht sehen läßt.

Das Wildpret ist ein sehr schöner Braten.

Das Schneehuhn (Tetrao lagopus).

Das Schneehuhn kommt in Deutschland nur in geringer Anzahl als Standvogel in den Hochalpen Baierns vor.*) Es steht

*) Das in Ostpreußen bisweilen vorkommende Schneehuhn ist von dem Alpenschneehuhn nicht zu unterscheiden und daher jedenfalls ein und dieselbe Species und nicht zu verwechseln mit dem größeren Lagopus albus.

Digitized by Google

in der Größe zwischen dem Haselwilde und dem Rebhuhne, sieht im Winter schneeweiß aus und hat nur im Steiße schwarze Federn, die oben und unten mit weißen Federn bedeckt sind. Die Schwungfedern haben auch stets schwarze Schäfte. Im Sommer hat es ein buntes Gefieder von schwarz, grau, weiß und rostroth. Der Zügel, d. h. die Stelle zwischen Schnabelwurzel und dem Auge, ist schwarz und über dem Auge befindet sich eine rothe, warzige Haut, die beim Männchen mehr ins Auge fällt. Das Weibchen ist etwas kleiner als der Hahn, sonst haben sie keine Unterscheidungszeichen. Beide Geschlechter haben dickbefiederte Ständer und Zehen, wovon die äußerste die kürzeste ist. Die vorderen drei Zehen sind durch eine Spannhaut verbunden.

Die Nahrung ist fast dieselbe, wie die des Birkwildes, nur nimmt es mehr Blätter der Alpenpflanzen und die Knospen der Alpenrosen. Es lebt in den Alpen auf den kahlen Bergen, meist erst da, wo alle Holzvegetation aufhört, und scharret sich im Winter seine kärgliche Nahrung auch noch unter dem tiefen Schnee hervor.

Im Mai ist die Balzzeit, und im Juni brütet das Weibchen auf der Erde zwischen Steinen und Gestrüpp, nachdem es 8 bis 12 gelbliche, mit dunkelbraunen Flecken versehene Eier, in der Größe von Taubeneiern, gelegt hat. Nach drei Wochen kommen die Jungen zum Vorschein, die im September ganz ausgewachsen sind. Dann ziehen sich öfters mehrere Völker zusammen und verleben den Winter gesellig. Beim Auffliegen machen sie ein ähnliches Geräusch wie die Rebhühner. Man schießt sie gewöhnlich vor dem Hühnerhunde, den sie sehr gut aushalten, doch werden sie auch in Laufdohnen gefangen.

Ihr Wildpret ist zähe und hat einen thranigen, unschönen Geschmack.

Digitized by Google

Das Steinhuhn (Perdix saxatilis).

Es kommt in Deutschland nur in den baierischen Hochalpen, aber auch nur in geringer Menge vor, und interessirt die deutsche Jägerei deshalb nur wenig.

Es erreicht die Größe des Haselwildes und ist dicker und runder gebaut. Das Gefieder ist auf der Oberseite und Brust blaugrau und röthlich angeflogen. Die gelblich weiße Kehle ist mit einem schwarzen, scharf begrenzten Bande eingefaßt. Die Federn an den Seiten sind lebhaft rostbraun, weiß und schwarz gebändert, die der unteren Seite gelblich roth und die Steuerfedern, der Schnabel und die mit einem Sporn versehenen, unbefiederten Ständer roth. An letzteren sitzen drei Vorder- und eine Hinterzehe. Das Weibchen ist vom Männchen schwer oder gar nicht zu unterscheiden, nur daß es stets etwas kleiner ist. Im Mai paaren sie sich, und legt die Henne im Juni an einem geschützten Orte unter Steinen und Felsen in einem mit Moos und Gras ausgefüttertem Neste 10 bis 14 gelbliche, weiße, mit feinen bräunlichen Strichen gezeichnete Eier, die nach 20 Tagen auskommen. Im September sind sie ganz ausgewachsen und leben sie in Völkern beisammen.

Sie sind ungemein scheu und schlau, haben ein sehr scharfes Gesicht, und wenn sie vom Jäger verfolgt werden, entfliehen sie erst lange Zeit durch schnelles Laufen, ehe sie durch Fliegen sich ihrem Feinde zu entziehen suchen.

Ihr Aufenthalt ist mehr im Freien auf steinigem Boden und auf Felsen, und nehmen sie gewöhnlich erst das Holz an und setzen sich auch auf die Bäume, wenn sie dorthin gejagt werden. Selten findet man sie zwischen Krummholzkiefern und Alpenrosen, wahrscheinlich, weil sie dort nicht so gut laufen können.

Die Nahrung besteht auch aus verschiedenen Alpenpflanzen, Blumen, Knospen, Beeren, Insekten und zuweilen auch in Nadeln der Nadelhölzer.

Digitized by Google

Die Jagd wird ebenfalls mit dem Hühnerhunde betrieben, doch größtentheils wird es durch Lockpfeifen in der Balzzeit und im Herbst herbeigelockt und so geschossen. Beim Balzen lassen sie Töne hören, wie die zahmen Hofhühner.

Das Wildpret der Steinhühner ist ähnlich dem der Haselhühner.

Das Rebhuhn (Perdix cinerea).

Dieser von allen Jägern und Jagdliebhabern allgemein bekannte Vogel lebt in ganz Deutschland auf den ebenen Feldern, besonders der wärmeren, fruchtbaren Gegenden, doch hält er sich auch in Feldhölzern und Remisen auf, die mit Wiesen und Feldern umgeben sind. Die Rebhühner suchen gern im Holze Schutz, wenn sie vom Jäger und von den Raubvögeln verfolgt werden, aber auch bei Schnee und Frost. Die Länge beträgt, wie bekannt ist, circa $2^2/_3$, die Breite $4^2/_3$ Dm.

Das Gefieder ist aschgrau mit braunen und schwärzlichen feinen Querlinien. Der Kopf ist rostgelb und grau; die Augen sind von einem nackten Kreise begrenzt. Der Steiß ist braunroth. Auf der Brust haben sie einen schönen dunkelrothen Fleck, der das Schild heißt, welcher bei den Hähnen größer, lebhafter und vollkommener ist. Nur wenn die Hennen alt werden, wird das Schild auch größer und geschlossen. Die Hähne sind dann schwer von den Hennen zu unterscheiden.

Die unbefiederten Ständer sind bei den alten Hühnern graublau, bei den Jungen bis im October gelblich.

Es giebt auch Rebhühner von gelber und schmutzig weißer Farbe, doch bei einem Volke immer nur zwei bis drei Stück und pflanzen sich diese auch niemals fort.

Sie nähren sich von Körnern und den Blättern aller Getreidearten und Futterkräutern, aber auch Insekten, Würmer und

Digitized by Google

Schnecken nehmen sie in Menge zu sich und werden dadurch den jungen Pflanzen auf den Feldern bisweilen sehr nützlich.

Ende März und im April, je nach der Witterung, paaren sie sich, und bedingt dies frühe Paaren bei den Rebhühnern sowohl, wie bei anderen Vögeln nicht auch eine frühe Brütezeit. Das Weibchen brütet gewöhnlich im Juni, nachdem es 12 bis 20 grünlichbraune Eier im Getreide, Klee, Raps oder Grase in einem mit Grashalmen und Federn ausgefüllten Neste gelegt hat. Nach drei Wochen kommen die Jungen aus und sind in den meisten Fällen bis Mitte September ganz ausgewachsen. Häufig legen die Hennen zum zweiten Male, wenn sie die ersten Eier durch Regengüsse oder Raubzeug verloren haben, dann natürlich sind die Jungen oft erst Ende September schießbar. Je später das Frühjahr eintritt, desto später tritt die Getreide- und Heuernte ein und werden dann weniger Nester ausgemähet. Die Hennen verlassen jedesmal ihr Nest, wenn sie ihre Decke in der Umgebung verlieren. Es gehen dadurch, namentlich beim frühzeitigen Abmähen der Futterkräuter, unendlich viele Eier verloren. Eine späte Ernte und ein trockener Juni geben daher stets die besten Hühnerjagden.

Die Völker leben den Winter über gemeinschaftlich, wobei der alte Hahn stets, wie auch im Herbste die Wache hält. Auch ziehen sich öfters mehrere Völker zusammen, besonders wenn sie beschossen sind, wobei es im Anfange der Vereinigung nicht ohne viele Beißerei zwischen den Hähnen, die allezeit in der Mehrzahl vorhanden sind, abgeht.

Die Rebhühner sind Standvögel, doch streichen sie in weniger fruchtbaren und kälteren Gegenden häufig von ihrem Geburtsorte fort, um reichlichere Nahrung und einen wärmeren Boden zu suchen.

Um die Rebhühner gut durch den Winter zu bringen, baue man im November auf den Raps- und Saatfeldern, wo es wenig Remisen und Sträucher giebt, von Reisigholz lichte Hütten, oder schlage Gestelle von Stangen 3 bis 4 Meter im Quadrat und 1 Meter über der Erde, bedecke diese oben und auf der Westseite mit

Digitized by Google

Reisigholz oder Strohmatten und streue darunter geringen Weizen, Roggen oder Buchweizen aus. Sowie hoher Schnee und Frost eintritt, ziehen sich die Hühner sofort unter diese kleinen Schutzmittel. Sind in einer Gegend viel Raubvögel und Krähen vorhanden, so stellt man auch wohl mitten in dem Reisigholze einen $1^1/_4$ Dm. starken Pfahl von 2 bis 3 Meter Länge auf und legt darauf ein kleines Tellereisen, worauf sich diese allmälig in Menge fangen, wenn sie das Futter oder die Hühner selber rauben wollen. Selbstredend müssen die Fütterungen täglich vom Schnee gereinigt und die Körner erneuert werden. Habichtskörbe oder andere Fangapparate dürfen in keiner gut besetzten Hühnerjagd fehlen, um besonders die Hühnerfalken, Wanderfalken, Sperber und Bussarde wegzufangen. Diese sowohl, wie Füchse, Iltisse, Wiesel und zahme Katzen thun der Hühnerjagd großen Abbruch. Will man diese stets in gutem Stande erhalten, so sind in großen freien Feldmarken an verschiedenen Stellen Anlagen von Remisen oder Bepflanzung der Gräben und Wasserlöcher mit Erlen und Weiden eine Hauptbedingung. Zur Anlage von Remisen eignen sich ganz besonders Schwarzdorn, Fichten, Rheinweiden, Werftweiden und Spireen. Auch die perennirenden Turbinamburs und Lupinen sind sehr zu empfehlen. Alle Feldjagdbesitzer sollten solche kleine Anlagen herstellen, und wenn diese nur $^1/_4$ Hektar groß sind, so genügt dies schon, den Hühnern Schutz in jeder Beziehung zu geben. Auch bei der Hühnerjagd sind solche Holzanlagen oder von den genannten perenierenden Pflanzen sehr angenehm, da die Hühner sich stets gern dorthin ziehen, wenn sie auf dem freien Felde beschossen oder aufgejagt werden.

Was die Hühnerjagd selber anlangt, so geschieht diese bekanntlich größtentheils mit dem Vorstehhunde, doch werden sie auch noch gelegentlich bei den Treibjagden nach Hasen erlegt. In manchen Gegenden, wo es viel Hühner giebt, und wo eigends zu diesem Zwecke große Hühnerremisen angelegt sind, läßt man sich auch die Hühner zutreiben. Dies geschieht besonders im Spätherbste, wo sie nicht mehr zu halten pflegen und schon gern die

Digitized by Google

Remisen theils von selber annehmen, theils wenn sie auf den benachbarten Stoppelfeldern aufgejagt werden.

Sehr anzuempfehlen ist, den Hühnern, bald nachdem sie geschossen sind, mit einem kleinen Häkchen das Gescheide herauszuziehen, da sie sich dann weit besser conserviren.

Das Wildpret der jungen Hühner ist anerkannt der beste Braten von allem Federwild.

Die Wachtel (Perdix coturnix).

Die Grundfarbe dieses kleinen hühnerartigen Zugvogels ist bräunlichgrau mit schwarzen und weißlichen Flecken und Bändern geziert. Der Hahn hat eine schwarze, die Henne eine gelblichgraue Kehle. Die Wachtel wird 1/3 so groß als das Rebhuhn, fliegt sehr schnell, niemals hoch und fällt stets bald wieder ein, wenn sie aufgejagt ist, läuft aber dann ungemein schnell und weit und liegt sehr fest, so daß sie oft schwer und nicht ohne einen sehr guten Hühnerhund wiederzufinden ist.

In Deutschland trifft sie gewöhnlich aus den südlicheren Ländern im Mai ein. Die Begattungszeit ist Ende Mai, wobei aber aller Wahrscheinlichkeit nach der Hahn mehrere Hennen tritt. Von Ende Juni ab brütet das Weibchen in Wiesen und Feldern, wo Weizen gebaut wird, nachdem sie acht bis zwölf lichtbraune, mit schwarzbraunen Flecken versehene Eier gelegt hat. Nach 18 bis 20 Tagen laufen die Jungen aus den Eiern und sind in drei Wochen flugbar. Die Völker laufen dann auseinander und leben die Wachteln mehr einzeln für sich. Die alten Hähne schlagen den ganzen Sommer über und lassen sich Tag und Nacht hören.

Ende September verlassen sie größtentheils die nördlichen Gegenden, um nach Süd-Europa, Afrika und Asien wieder überzusiedeln, welche Wanderungen sie stets des Nachts antreten. An den Südküsten Europas kommen sie dann allmälig in großer

Digitized by Google

Menge zusammen und treten von dort ihre Reise über's Meer in größeren Flügen an. Ebenso kommen sie auch von dort über das Mittelmeer zurück, verbreiten sich aber dann überall vereinzelt in Deutschland.

Ihre Hauptnahrung ist Weizen, Hirse, Grassamen, grüne zarte Blätter und Insekten. Im September bei der Hühnerjagd werden sie in Deutschland vor dem Hühnerhunde geschossen, und sind sie in manchen Jahren hierselbst in ziemlicher Anzahl vorhanden.

Das Wildpret der Wachteln ist ein sehr zarter und feiner Braten.

Der Fasan (Phasianus colchicus).

Dieser schöne hühnerartige Standvogel stammt aus Asien und ist erst seit einigen Hundert Jahren in Deutschland eingeführt. Gegenwärtig ist er daselbst überall auf den fruchtbaren, nicht zu kalten Ebenen verbreitet, wo sich Laubholzwaldungen vorfinden, oder sich große dichte Remisen an Aeckern, Wiesen, Teichen und womöglich fließendem Wasser anschließen. Die menschliche Hand muß natürlich dabei viel thun, da sie sich nur durch sorgsame Pflege erhalten und vermehren.

Die Länge eines Hahnes beträgt mit Einschluß des Spieles, der über die Hälfte davon einnimmt, 7 Dm. und die Breite etwas über 9 Dm.

Der $2^1/_2$ Cm. lange gelblichweiße, etwas gekrümmte Schnabel ist an der Wurzel mit dunkelrothen, an der Seite mit stahlblau und grün glänzenden Federn besetzt. Der Augenstern ist gelb, und nur um die Augen zieht sich ein nackter, hochrother, warziger Ring. Die Ohrenöffnungen bedeckt ein Federbüschel, den er hoch- und nieder legen kann.

Digitized by Google

Das ganze Gefieder ist kunstvoll von der Natur zusammengestellt und gefärbt. Der Kopf und obere Theil des Halses ist dunkelgrün. Der untere Hals, die Brust und Seiten glänzend blau, braun, gelb, roth und dunkelviolet, wie geschuppt. Der Rücken und die Deckfedern der Flügel rothbraun und roth mit schwärzlich geschuppten Federn. Die Schwungfedern grau und graubraun. Das Spiel ist braunroth und grau und querüber befinden sich schwarze Streifen. Auch hat der Hahn an den Ständern einen kleinen Sporn, und die drei vorderen Zehen sind durch eine Spannhaut verbunden.

Die Henne ist kleiner, hat einen viel kürzeren Spiel und einen grauröthlichen Ring um den Augen. Das ganze Gefieder ist braungrau mit dunkelbraunen weißlich geränderten Flecken und Streifen. Es giebt auch ganz weiße und weißbunte Fasanen mit weißem Halse, Kopfe und Flügeldecken. Der Augenstern ist im letzteren Falle weißgelb. Auch kommen noch andere Spielarten mit ganz hellen Metallfarben und Fasanen von gewöhnlicher Färbung mit ganz weißem Ringe um den Hals vor, welche Spielarten sich in ganzen Gesperren fortpflanzen.

Ferner hat man auch Bastarde von Fasanenhähnen und zahmen Hofhühnern gezogen, die dann stets den Kopf, Schnabel und Spiel ganz des Hofhuhnes haben, sonst aber in der Figur und Farbe dem Fasanenhahne ähnlich sehen, nur daß sie mehr einfarbig stahlblau und grau und nicht so bunt erscheinen. Sie pflanzen sich unter einander nicht fort, und auch von den Bastardhähnen hat man keine Nachzucht bekommen können. Diese Bastarde liefern einen schönen Braten.

Eine wunderbare Erscheinung, welche die meisten Jäger, außer den alten Fasanenjägern, oft nicht kennen, ist die, daß die Fasanenhennen, wenn sie nach sechsjährigem Alter güste werden, also keine Eier mehr legen, ganz allmälig das Gefieder des Hahnes bekommen. Schon im dritten Jahre, wo sie güste gewesen, sind sie nur noch vom Hahne dadurch zu unterscheiden, daß sie keinen Sporn haben. In der Fasanerie bei Potsdam hat man die

Digitized by Google

interessantesten Beobachtungen und Erfahrungen gemacht. Es befinden sich daselbst auch ausstopfte Hennen vom ersten bis fünften Jahre ihres Güstseins, die anfangs wie junge Hähne aussehen und später ganz das Gefieder der Alten haben.

Die Nahrung der Fasanen, der sie bei Tage und nicht selten auch bei Nacht nachgehen, besteht in allerlei Grassamen, Weizen, Erbsen, Buchweizen, Waldbeeren, Eicheln, Bucheln, Schleen, Mais, jungem Getreide, Gras, Insekten und Puppen der Ameisen u. s. w., wobei sie Sand und kleine Kieselsteinchen mit verschlucken.

Die Balzzeit beginnt im April und dauert bis im Mai. Ein Hahn kann fünf bis sechs, in zahmen Fasanerien bis zehn Hennen treten. Das Weibchen kann über 20 Eier legen, wenn man ihnen dieselben allmälig und stets nur theilweise fortnimmt, um sie von Puten ausbrüten zu lassen. Sie selber brüten gewöhnlich nur 10 bis 15 Eier aus, und dauert die Brütezeit 24 Tage. Die Eier sind olivengrün und werden in einem kunstlosen Neste im hohem Grase, auf Wiesen, Feldern und im Holze gelegt. Mitte October sind die Jungen bei guter Nahrung ausgewachsen, doch kann man die jungen Hähne schon Anfang September von den Hennen an den dunkleren, metallfarbenen Federn auf dem Rücken und den Flügeln unterscheiden. Auch lassen die Hähne schon Ende September beim Aufsteigen einen lauten, gackernden Ton hören, wohingegen die Hennen entweder stumm bleiben oder einen feinen piependen Ton von sich geben.

Am Tage halten sich die Fasanen, wenn sie Gelegenheit dazu haben, während des Frühjahrs und Sommers gern in den Feldern und Wiesen auf, und im Winter meist nur im Holze, wo sie auch des Nachts aufzubäumen pflegen.

Man hat gewöhnlich halbwilde und wilde Fasanerien, je nachdem sich die Localität dazu eignet. Bei den letzteren ist nichts weiter zu thun, um die Fasanen zu erhalten und zu vermehren, als daß man, wie auch in den halbwilden Fasanerien, alles Raubzeug fleißig vertilgt, die Fasanen im Winter hinlänglich füttert und stets

Digitized by Google

nur so viel Hähne abschießt, daß etwa ein Hahn auf 5 Hennen kommt. Wo jedoch Vieh im Walde weidet oder wo Gräsereinutzungen stattfinden, und wo überhaupt viel Unruhe im Walde und kein Wasser ist, gedeihen die Fasanen nicht.

Bei den halbwilden Fasanerien muß ein möglichst großer Fasanengarten mit einem Bretterzaun und Bruthäusern angelegt und ein besonderer Fasanenmeister angestellt werden. Dieser hat die auswärts gelegten Eier zu sammeln und von Puten ausbrüten zu lassen. Die junge Brut muß sehr sorgfältig gepflegt und gefüttert werden, und wenn sie halb ausgewachsen ist, wird sie in die Fasanengärten gelassen und dann ihrem Schicksal mehr oder weniger überlassen.

Ueber die Aufzucht, Wartung und Pflege der jungen Fasanen läßt sich viel sagen, doch dürfte es zu weit führen, wenn dies Kapitel hier vollständig besprochen würde. Es giebt eine Menge Broschüren, die über diesen Gegenstand handeln.

Die Jagd auf Fasanen geschieht mit dem Vorstehhunde oder auf Treibjagden von Ende October ab.

Die Treibjagden werden wie andere Holztreiben arrangirt, und ist nur zu beachten, daß die Treiber möglichst eng und langsam vorwärts gehen und öfters Halt machen. Die Schützen müssen sehr ruhig und möglichst halb verdeckt stehen, da die meisten Fasanen lange vor den Treibern herlaufen, ehe sie auffsteigen. Sie kommen dann häufig bis vor die Schützen gelaufen, und wenn sie diese wahrnehmen, drehen sie um und fliegen gern rückwärts. Selbstredend müssen gute Hühnerhunde bei der Fasanenjagd vorhanden sein, um besonders die flügellahmen Fasanen, und die, welche im dichten Holze, Gras und Schilf herabgefallen sind, sicher zu finden.

Wie bekannt, ist der Fasan ein geschätzter Braten, doch sind die jungen Fasanen und die Hennen stets einem alten Hahne vorzuziehen.

Digitized by Google

Die Waldschnepfe (Scolopax rusticola).

Unstreitig ist die Waldschnepfe für Deutschland der interessanteste Zugvogel, indem sie so manchen Jäger im Frühjahr und Herbst in fieberhafte Zustände versetzt. Sie gehört zu den Sumpfvögeln, und zwar zur Familie Schnepfe, deren es in Deutschland sehr viele Species giebt.

Ihre Größe und Farbe ist sehr verschieden, was wohl mehr oder weniger durch ihren Aufenthalt, Geburtsort oder ihr Alter bedingt wird. Männchen und Weibchen sind mit Sicherheit äußerlich nicht zu unterscheiden, und rathe ich jedem Jäger, darüber nur Vermuthungen auszusprechen.

Durchschnittlich kann man annehmen, daß die Breite $6^1/_6$ Dm., die Länge etwa $3^1/_2$ Dm. ist, wovon auf den Schnabel 7 Cm. kommen. Letzterer ist gerade, biegsam und an der Spitze stumpf. Sie tragen ihn stets nach unten zu gekehrt, und an der Wurzel desselben befinden sich die Nasenlöcher, die ein ungemein feines Geruchsorgan besitzen. Die großen, schönen, schwarzbraunen Augen entwickeln bei Tage sowohl, wie auch in der Dämmerstunde eine scharfe Sehkraft.

Das Gefieder ist vorherrschend rothbraun, grau und bunt gebändert. Auf dem Rücken ist es rostbraun mit grauen und schwarzen Flecken untermischt. Der Bauch ist mit schmalen, graugelblichen und braunen, wellenförmigen Querstreifen versehen. Am Hinterkopfe hat sie vier schwarze Streifen. Die Steißfedern sind schwarz mit ganz weißen Spitzen.

Die Ständer sind gelblich braun oder graublau und nur bis an das Fersengelenk befiedert. Die Zehen sind ganz getrennt und mit langen Nägeln versehen. Die Hinterzehe ist kurz, stumpf und hat nur einen Ansatz von Nagel.

Die Männchen, welche im Frühjahr bei uns meist zuerst eintreffen, sind kleiner als die Weibchen und haben gewöhnlich dunklere Flecken auf dem Rücken. Doch ist auch dies kein bestimmtes Unterscheidungszeichen vom Weibchen. Die an der äußersten Ecke

Digitized by Google

der Flügel sitzenden, kleinen, 2 Cm. langen Eckfedern werden zum Malen oder zu Cocarden an den Jagdhüten benutzt.

Die Weibchen, welche meistens am Schlusse der Schnepfensaison nach Deutschland kommen, sind oft ungewöhnlich groß und werden Eulenköpfe genannt; doch auch unter diesen größeren Schnepfen sind oft Männchen, bei welchen die schmale Kante der ersten Schwungfeder ebenso oft weiß wie bräunlich vorkommt. Hin und wieder trifft dann auch noch eine kleinere Sorte Waldschnepfen bei uns ein, die ein mehr hellrothes und rostbraunes Gefieder auf dem Rücken und auf den Flügeldecken und nur wenig oder gar keine schwarzen Flecke haben. Diese überwintern wahrscheinlich im Innern von Afrika und in Egypten, denn man hat nur von dort in den Museen solche Exemplare erhalten. Die Waldschnepfen laufen ziemlich schnell, doch nur, wo sie nicht durch Gras, Heidekraut oder sonstiges Gestrüpp daran gehindert werden, und mehr im Zickzack hin und her als gerade aus.

Beim Fliegen sind sie äußerst geschickt, denn sie winden sich durch die engsten Stangenorte und das dickste Holz so geschickt durch, wie kein anderer Waldvogel. Sie können kerzengerade in die Höhe fliegen und ebenso lassen sie sich aus der Luft mit Blitzesschnelle zur Erde nieder. Wenn sie aufgejagt werden, fallen sie bald wieder ein und streichen meistens nicht weiter, als etwa einige Hundert Schritte. Wenn sie sich aber vor Verfolgung nicht sicher glauben, stehen sie öfters von selber bald wieder auf, ehe der Jäger herankommt, und ziehen dann nochmals eine Strecke unbemerkt weiter.

Die Waldschnepfen geben drei verschiedene Töne von sich, und zwar des Abends und Morgens beim Umherziehen einen pitschenden und einen quarrenden Ton, sie fliegen gewöhnlich dabei langsam und nicht zu hoch. Den dritten Ton hört man nur am Tage, wenn sie von einem Hunde plötzlich überrascht und aufgestöbert werden. Dieser gackernde Ton hat Aehnlichkeit mit dem eines zahmen Hofhuhnes, wenn dies erschreckt wird, oder einer Birkhenne, wenn sie aufsteht. Sie nähren sich von Regenwürmern, Larven,

Digitized by Google

Puppen, Schnecken und Käfern, welche sie mit dem Schnabel geschickt aus der Erde zu holen wissen.

Ihre Ankunft und Abreise in Deutschland hängt ganz von der Witterung ab. Gewöhnlich kommen die ersten Schnepfen Anfang März und sind die Kiebitze, die großen wilden Ringeltauben und die Bachstelzen ihre Vorboten. Im südlichen und südwestlichen Theil Deutschlands treffen sie stets schon 8—10 Tage eher ein als im nördlichen Theile, und dauert in letzterem der Hauptzug oft bis gegen Mitte April. An den nördlichen Küsten Deutschlands und besonders auf den Inseln und Halbinseln der Ostsee ist die beste Zugzeit gewöhnlich erst nach dem 6. April und dauert bis zum 20. April. Stets sind die ergiebigsten Schnepfentage bei uns solche, wo vorher Südwestwind mit warmem Regen gewesen ist. Ihre treuesten Begleiter sind in dieser letzten Zeit die Kraniche und die Weindrosseln. Sobald die gelben Bachstelzen und die Schwalben erscheinen, ist der Hauptzug gewöhnlich bald vorüber und ziehen die Schnepfen dann weiter nach dem Norden, wo sie brüten.

Vereinzelt brüten sie auch im Mai und Juni in ganz Deutschland, vorzugsweise in Gebirgen und großen Nadelholzwaldungen. Das Weibchen, welches sich mit einem Männchen paart, legt unter einem Strauche oder nahe an einem Stamme vier rundliche, braunrothe oder gelbliche Eier mit schwarzbraunen Flecken in einem kunstlosen mit Nadeln und Moos ausgefülltem Neste. Nach 20 Tagen laufen die Jungen aus und 3 Wochen später können sie schon flattern, um sich vor ihren Feinden, den Füchsen u. s. w., zu schützen. Dies ist der Zeitpunkt, von wo ab die Schnepfen einzeln für sich leben und durchaus keine Geselligkeit mehr halten.

Während des Zuges im Frühjahr bleiben sie in der Regel mehrere Tage da liegen, wo sie gute Nahrung gefunden haben. Sie streichen dann in der Dämmerstunde einzeln und bisweilen paarweise des Abends und Morgens im oder am Walde laut umher, fallen auf feuchten Aeckern, Wiesen und Viehweiden ein und

Digitized by Google

stechen daselbst nach Würmern. Des Morgens streichen sie wieder nach dem Holze und suchen daselbst die strengsten Dickungen auf, wo sie bequem umherlaufen können.

Wie die Waldschnepfen überhaupt so mancherlei Eigenthümlichkeiten haben, so ist auch die zu bemerken, daß sie z. B. auf der Insel Rügen in den meisten Jahren erst nach dem 6. April am häufigsten eintreffen. Sie scheinen von dort vorzugsweise gern nach Schweden und Norwegen überzusiedeln und erscheinen mit Südwestwind am häufigsten. Hier ruhen sie und warten günstigen Wind ab, der sie leicht übers Meer fliegen läßt. Des Abends streichen sie hier niemals umher, wie auf dem Festlande, wahrscheinlich, um ihre Kräfte zu schonen und um jeden Moment abzupassen, wo sie des Nachts übers Meer ziehen können. Bei Südwestwind sieht und hört man bisweilen des Abends sehr spät 1 bis 3 Schnepfen zusammen pfeilschnell mit dem pitschenden Tone nach dem Meere zu abziehen, und wenn hier nicht in derselben Nacht neue Schnepfen vom Festlande hinzukommen, so findet man am folgenden Tage wenig oder gar keine. Haben die Jäger auf der Insel Rügen das Glück, daß nach mehrtägigem Südwestwinde viel Schnepfen angekommen sind, der Wind plötzlich umschlägt und wieder mehrere Tage aus Norden wehet, dann ist stets eine ergiebige Jagd zu erwarten, da sie dann so lange liegen bleiben, bis der Wind wieder nach Südwest umschlägt.

Sobald sich die Schnepfen gepaart haben, macht das Männchen dieselben Manöver in der Nähe des Weibchens, wie der Trapphahn. Es schlägt mit dem Steiß ein Rad, läßt die Flügel hängen und zieht den Kopf und Hals ganz zurück.

Die Männchen, welche sich hier in Deutschland noch gepaart haben, streichen bis im Juli fast alle Abende laut umher, und ist dies stets ein sicheres Zeichen, daß ein Weibchen in der Nähe brütet. Ende August ziehen auch die jungen Schnepfen des Abends und Morgens umher, aber nur mit dem pitschenden Tone, und zwar stets in der Nähe des Forstortes, wo sie ausgekommen sind. Den quarrenden Ton hört man überhaupt von keiner Schnepfe im Herbste.

Digitized by Google

Von Anfang October ab, je nach der Witterung, kommen die Waldschnepfen aus dem Norden zurück, und Mitte November sind sie gewöhnlich alle nach dem Süden gezogen, wo sie in Süd-Europa, Asien und Afrika überwintern. In ganz gelinden Wintern bleiben auch einzelne Schnepfen in Deutschland zurück.

Was die Ausübung der Jagd auf Schnepfen betrifft, so wird diese mit dem Hühnerhunde suchend, auf Treibjagden und auf dem Anstande des Abends und Morgens ausgeübt.

Die erstere Jagdart ist für den einzelnen Schützen, wenn auch die mühsamste, doch stets die amüsanteste und lohnendste, doch gehört dazu Localkenntniß, ein ruhiger, kurz suchender guter Hühnerhund, viel Passion und eine feste Körperconstitution, um Wind und Wetter zu trotzen und um nicht so bald zu ermüden. Man führe stets eine nicht zu lange Flinte ohne Gewehrriemen, bekleide sich nicht zu warm, aber mit festen, dauerhaften Stoffen, und vergesse nie das Frühstück und einen kräftigen Trunk.

Große Localkenntniß ist deshalb nothwendig, weil die Waldschnepfen ihre bestimmten Stellen in einem Revier haben, wo sie vorzugsweise im Frühjahre gern einfallen. Wer daher nicht die Gelegenheit kennt, wo man die Schnepfe ganz besonders zu suchen hat, wird stets schlechte Geschäfte machen und bald ermüden. Im Allgemeinen suchen die Schnepfen im Frühjahr mehr die dichten feuchten Laubholzwaldungen, im Herbste dagegen mehr die jungen noch nicht durchforsteten Nadelholzbestände auf, doch fallen sie in diesen nur immer in solche Forstorte ein, wo sie ungehindert laufen und stehen können. Im Herbste sind sie nicht so wählerisch mit ihrem Aufenthalte, denn man findet sie öfters auch in kleinen Feldhölzern, Remisen, ganz lichtem und niedrigem Gesträuch und im Farrnkraut, was im Frühjahre nur an der Ostseeküste und auf den Inseln und Halbinseln der Fall ist.

Außerdem muß man aber auch zur Ausübung der Jagd die Eigenthümlichkeiten der Schnepfe kennen, welche man nur durch die Praxis lernt. Sie wissen genau, welchen vortrefflichen Schutz ihnen an der Erde ihr schwer zu erkennendes Gefieder gewährt, und

Digitized by Google

verstehen es herrlich beim Drücken solche Stellen zu wählen, wo sie nicht so leicht von der Umgebung zu erkennen sind. Sie halten daselbst bei warmer, stiller Witterung den Jäger und den Hund oft bis auf wenige Schritte aus. Beim Aufsteigen fliegen sie dann stets auf der entgegengesetzten Seite des Strauches niedrig heraus, so daß sie durch einen Baum oder Strauch vor dem Jäger gedeckt sind. Kurz, sie wissen sich in allen Fällen zu helfen, um ihrem Feinde zu entgehen, und handeln dabei sicher mit Ueberlegung. Werden die Schnepfen in den Dickungen mehrere Male kurz hinter einander aufgejagt und wird nach ihnen geschossen, so fliegen sie nicht selten in alte, lichte Bestände weit auf der Erde fort, und fallen an Stellen wieder ein, wo man sie sonst niemals findet, und welche sie vor Ueberraschung sichert. Gewöhnlich halten sie hier nicht und sind dann unberechenbar, wohin sie streichen und wieder einfallen.

In manchen Gegenden, wo die Schnepfen wegen zu großer, zusammenhängender Dickungen nicht gut mit dem Hunde gesucht werden können, oder auch wo man eine gemeinschaftliche Jagdpartie unternehmen will, kann man sie auch treiben, wozu man die Treiber mit Rasseln oder Klappern versieht. Die Treiben müssen nicht zu groß genommen werden, und die Schützen sind möglichst frei vorzustellen, um nach allen Seiten hin sehen und schießen zu können.

Das Treiben auf Schnepfen hat den Vortheil, daß diese Jagdart nicht so anstrengend und unter Umständen doch sehr lohnend ist, indem man ein größeres Terrain durchstreift und somit auch mehr Schnepfen findet.

Wo man sich des Abends und Morgens beim Frühjahrszuge hinzustellen hat, um zu Schuß zu kommen, darüber lassen sich bestimmte Regeln schwer geben. Erst die Erfahrung lehrt es auf jedem einzelnen Revier, wo die Schnepfen vorzugsweise gern umherstreichen.

Im Allgemeinen streichen sie gern und langsam über 4 bis 5 Meter hohe Dickungen, Erlenbrücher, schmale Wiesen und Triften,

Digitized by Google

die zwischen höherem Holze gelegen sind, und hier halten sie auch gern die Ränder desselben.

Ihr Umherstreichen, was etwa $^1/_2$ Stunde währt, beginnt des Abends, sobald die ersten Sterne am Himmel zu erblicken sind und die Singdrosseln mit ihrem Abendgesange allmälig verstummen.

Der Morgenzug währt nur ganz kurze Zeit, und zwar stets so früh, daß man kaum schon schießen kann.

Im Herbste streichen die Waldschnepfen zwar auch des Abends umher, doch meist nur stumm oder pitschend und fliegen stets enorm schnell.

Wenn es im October sehr trocken ist, fallen sie häufig an den im Nadelholzwalde sich befindenden Wasserlöchern ein, um sich daselbst zu baden und um nach Würmern zu stechen. Bei dieser Gelegenheit kann man die Schnepfen auch durch Ansetzen an geeigneten Wasserlöchern, die am Rande mit weißem Sande begrenzt sind, erlegen.

Zum Schluß will ich hier nur noch als Merkwürdigkeit erwähnen, daß die Schnepfen, welchen ein Ständer zerschossen ist, diesen mit langen, trockenen und feinen Grashalmen und Federn wieder zusammenschienen, wie es die geschickteste Menschenhand nicht fertig kriegen würde. Dieser Verband wird mit Lehm verschmiert und sitzt ganz fest am Ständer. Bei keinem anderen Vogel hat man wohl diese wunderbare Geschicklichkeit und chirurgischen Talente wahrgenommen.

Die Waldschnepfen gehörten von jeher zu den größten Leckerbissen der Gutschmecker, doch die wahren Jäger werden sie stets lieber schießen als essen.

Digitized by Google

Die Puhl- oder Mittelschnepfe (Scolopax major).

Die Länge dieses Sumpfvogels ist circa $2^3/_4$ Dm., wovon auf dem gerieften Schnabel 6 Cm. kommen. Die Breite beträgt 5 Dm. Die fleischfarbenen Ständer und Zehen sind wie bei der Waldschnepfe. Das Gefieder ist auf dem Scheitel des Kopfes schwarz und mit einem gelbbraunen Längsstreifen versehen. Die Kehle ist weiß, die Backen dunkelbraun bespritzt. Der Hals ist gelbbraun mit schwarzbraunen kleinen Flecken, der Rücken schwarz mit bräunlichgelben Längsstreifen und röthlichbraunen geschuppten Querbinden. Die Schwungfedern sind am Ende rothbraun mit schwarzen Querstreifen und weißen Spitzen. Die Eckschwingen haben einen weißen Schaft mit weißer Kante. Die Flügel sind am Rande aschgrau und die Deckfedern schwarz mit hellbraunen Querstreifen und weißen Spitzen. Die Brust, der Bauch und die Seiten sind weißlich mit schwarzbraunen Querbinden.

Nach Deutschland kommen die Puhlschnepfen gewöhnlich erst im Mai, brüten zum Theil auch im nördlichen und nordöstlichen Theil, doch immer nur einzeln und niemals in größerer Menge. Sie lieben die nicht zu nassen Brücher, sondern fallen lieber auf feuchte Wiesen und am Rande der Brücher ein. Sie paaren sich Ende Mai. Das Weibchen, welches übrigens nicht vom Männchen zu unterscheiden ist, legt in einem, mit trockenen Grashalmen ausgefüttertem Neste auf Kaupen und kleinen Erhöhungen vier birnförmige hellbraune, mit dunkelbraunen Flecken versehene Eier. Diese werden in 18 Tagen ausgebrütet.

Sie nähren sich von Wasserinsekten, Regenwürmern und Schnecken. Schon Mitte September kommen sie aus dem hohen Norden zurück und verlassen Deutschland dann bald mit den hier gebliebenen, um in südlicheren Ländern zu überwintern.

Sie leben einsam für sich, haben einen schwerfälligen Flug, streichen stets dicht über der Erde fort, ohne einen Laut von sich zu geben, und fallen sehr bald wieder ein, wenn sie aufgejagt werden.

Man schießt sie vor dem Hühnerhunde, weniger im Frühjahre

Digitized by Google

als im Herbste, und halten sie zu jeder Jahreszeit und bei jedem Wetter den Hund gut aus, doch laufen sie mitunter lange Strecken, ehe sie sich bequemen aufzufliegen.

Am häufigsten kommen sie in Ost- und Westpreußen, Holstein und Ostfriesland vor, wo ihr Wildpret sehr geschätzt wird.

Die Bekassine, Heerschnepfe oder Himmelsziege (Scolopax gallinago).

Dieser Zugvogel mißt in der Länge $2^1/_2$ und in der Breite $4^3/_4$ Dm. Der dünne, weiche und gerade Schnabel mißt 8 Cm. und ist an der Wurzel gelblich. Auf dem Kopfe sind die Bekassinen schwarz und braun gefleckt, mit drei bräunlichgelben Streifen versehen. Der Hals ist gelblichbraun und schwarz gemasert. Brust und Bauch sind weiß. An den Seiten und unter den Flügeln befinden sich schwarzbraune, wellenförmige, feine Querstreifen in den feinen weißen Federchen. Die Rückenfedern sind schwarz und zimmtbraun mit röthlichbraunen Längsstreifen. Die braunen Deckfedern auf den Flügeln haben weiße Spitzen. Die mittelsten Schwanzfedern sind an der Wurzel schwarz und am Ende rothbraun und haben eine oder zwei Querbinden. Die ersten Schwungfedern sind oben schwarzbraun und unten hellgrau. Die Ständer sind grünlich, der Mittelzehen ist ungewöhnlich lang, der Hinterzehen kurz.

Die meisten Bekassinen treffen von Anfang April ab in Deutschland ein und verweilen hierselbst auf sumpfigen, morastigen Brüchern, nassen Wiesen oder in der Nähe von Seen und Teichen, die mit Sumpf und quebbigem Boden umgeben sind, bis gegen Ende April. Dann ziehen sie nach nördlichen Gegenden und brüten dort. Wenn sie auf ihrem Zuge nach Schweden und Norwegen durch conträren Wind behindert sind übers Meer zu ziehen, fallen sie nicht selten im niedrigen Holze oder auf Wegen, die durch Holz führen ein, doch findet man sie dann, wie z. B. auf Rügen, meist auf dem Rücken der höchsten Hügel.

Digitized by Google

Viele Bekassinen paaren sich und brüten auch im nördlichen Deutschland auf Kaupen oder höheren Bulten in großen möglichst unzugänglichen Brüchern und Fennen. Sie legen vier grünliche, olivengelbe, birnförmige Eier, die mit schwarzen Flecken versehen sind. Die Jungen kommen nach 18 Brütetagen aus und können nach 14 Tagen schon fliegen.

Ihre Nahrung ist dieselbe, wie die der Puhlschnepfen. Meistens haben sie im Magen auch grobe Sandkörner und Kieselsteinchen.

In nassen Jahren und bei Sommerüberschwemmungen kommen sie schon von Mitte Juli ab aus den nördlichen Gegenden wieder zurück und bleiben häufig bis Mitte October in Deutschland. Dann aber siedeln sie nach dem südlichen Europa, nach Afrika und Asien über, wo sie überwintern.

Die Bekassinen haben in den morastigen Brüchern auch ihre Lieblingsstellen, wo sie vorzugsweise gern liegen. Im Frühjahre sind sie sehr scheu und halten nur bei warmen, windstillen Tagen, wenn sie Deckung haben, den Jäger aus. Ihr Flug ist sehr schnell, und wenn sie aufsteigen, lassen sie fast immer einen kätschenden Ton hören, fliegen im Zickzack, streichen hoch in die Luft, schwenken daselbst umher und stürzen sich blitzschnell aus bedeutender Höhe ganz gerade wieder zur Erde. Oft liegen sie in größeren Schaaren beisammen und streichen auch so über den Brüchern umher. Im Herbste, wo sie meist sehr gut bei Leibe sind, halten sie den Hund besser aus und fallen auch eher wieder ein.

In der Begattungszeit, bei schönem Wetter, schwärmen die Männchen zu allen Tageszeiten bis spät am Abend zeitweise hoch in der Luft umher und schießen mit ausgebreiteten Flügeln und fächerförmigem Schwanze senkrecht in einem Bogen auf und ab. Dabei bewegen sie die Spitzen der Schwung- und Schwanzfedern ungemein schnell zitternd, wodurch ein dem Meckern der Ziegen ähnlicher Ton entsteht. Aus diesem Grunde wird die Bekassine auch Himmelsziege genannt.

Auch aus der Kehle giebt das Männchen in der Luft noch laute Liebestöne von sich, welche vom Weibchen an der Erde wieder

Digitized by Google

mit anderen Lauten beantwortet werden. Dann aber fällt das Männchen wie ein Stein aus der Luft und begiebt sich zu seinem Weibchen.

Die Jagd auf Bekassinen geschieht mit dem Hühnerhunde, und muß sich der Jäger, wie bei allen Sumpfjagden mit hohen und guten Wasserstiefeln versehen, damit er überall im Bruche den wieder eingefallenen Bekassinen folgen kann.*)

Bei stillem, warmen Wetter, wo man überhaupt nur mit Erfolg auf Bekassinen jagen kann, suche man, wenn möglich, stets gegen den Wind, damit der Hund dieselben anziehen und den Jäger auf ihre Gegenwart aufmerksam machen kann, um dann stets schußfertig zu sein.

Bei stark wehendem Winde ist es häufig nicht unpraktisch, mit dem Winde zu suchen, wobei man den Hund dicht bei sich behält, da die Bekassinen dann auch besser halten, und nie gern gegen den Wind, sondern um den Jäger herum mit dem Winde fortziehen, wobei sie gut zu erlegen sind, wenn man sich beim Schießen nur gewöhnt, je nach der Entfernung $^1/_2$ bis 1 Meter weit vorzuhalten.

Daß die Bekassinen einen feinen Braten liefern ist bekannt.

Die Stumm- oder Haarschnepfe (Scolopax gallinula).

Sie ist der kleinste Zugvogel aller Schnepfenarten, sieht der Bekassine sehr ähnlich, nur ist der Körper halb so groß. Der weiche, gerade Schnabel ist nur 3 Cm. lang.

Auf dem Rücken ist sie röthlich blauschwarz, mit mehreren rostgelben Streifen versehen. Die Deckfedern der Flügel sind dunkelbraun mit weißen Schäften. Der Hals ist weiß mit roth-

*) Als besonders gute Stiefelschmiere ist die aus der Fabrik des Herrn Säger in Berlin, Kastanienallee 80, zu empfehlen.

Digitized by Google

braunen Sprenkeln. Brust und Bauch weiß. Der Kopf ist schwarzbraun und hat über und unter den Augen zwei rostgelbe Streifen. Die Seiten sind grau und wellenförmig bräunlich. Die schwarzen Steuerfedern rostgelb eingefaßt. Die Ständer haben die Farbe und Form der Bekassine.

Die Stummschnepfen kommen 14 Tage später als die Bekassinen nach Deutschland und im Herbste ziehen sie mit diesen zusammen ab. Ihr Aufenthalt und Nahrung ist wie bei den Bekassinen. Am Tage sitzen sie ganz still und fliegen nicht umher, auch leben sie nicht gesellig. Ihre vier kleinen Eier sind olivengelb mit feinen braunen Flecken bespritzt. Sie lassen beim Aufsteigen keinen Ton hören, fliegen niedrig, langsam, ähnlich der Fledermäus, und fallen stets bald wieder ein. Sie liegen sehr fest, sind schwer am Boden zu sehen, laufen aber öfter eine Strecke von der Stelle, wo sie eingefallen waren, fort, so daß ein guter Hund nothwendig ist, um sie aufzufinden. Gebraten sind sie im Geschmack wenig von den Bekassinen zu unterscheiden.

Der Keilhaken oder große Brachvogel (Numenius axquata).

Obgleich dieser Sumpfvogel nicht einen besonderen Gegenstand der Jagd bildet, so soll er hier doch auch beschrieben werden, da er in mehreren Ländern in den Jagdgesetzen besonders mit aufgeführt ist, und sogar zur mittleren Jagd gerechnet wird, wo Hohe-, Mittel- und Niederjagd besteht oder bestand.

Die Keilhaken sind Zugvögel und die größte Schnepfenart. Ihre Länge beträgt über 5 Dm., die Breite $9^1/_4$ Dm. Der $1^1/_4$ Dm. lange, bogenförmig gekrümmte, dünne Schnabel ist gerieft und von olivenbrauner Farbe. Der obere Theil desselben ragt über den unteren merklich hervor. Die Federn auf dem Rücken und den Flügeln sind schwarzbraun mit hellbraun gezackten Einfassungen. Die ersten großen Schwungfedern sind schwarz mit

Digitized by Google

weißen Schäften und Kanten. Der Bauch ist weißlich, der abgerundete Steiß ist mit schwarz und gelbbraunen Querbinden überzogen.

Die Ständer sind bleigrau und zwischen den Zehen befindet sich eine Spannhaut, so daß sie etwas schwimmen können. Sie waten am Strande des Salz- und Süßwassers und gehen da, wie auf den Feldern, ihrer Nahrung nach. Diese besteht in Wasseninsekten, Heuschrecken, Schnecken, Würmern und grünen Pflanzenstoffen.

Aus dem Süden kommen sie Ende April und im Mai nach Norddeutschland, leben dort an Seen, Brüchern und auf nassen Wiesen, Saat- und Brachfeldern. Im September ziehen sie wieder nach südlichen Ländern.

Sie paaren sich im Mai. Das Weibchen legt vier olivengrüne, mit braunen Flecken und Strichen versehene, birnförmige Eier auf Binsen- und Schilfkaupen, die von Wasser umgeben sind. Es brütet drei Wochen. Später sieht man sie familienweise zu drei und fünf Stück zusammen umherziehen, wobei sie einen lauten, langgedehnten, pfeifenden Ton hören lassen. Man kann sie anlocken, wenn man diesen Ton mit dem Munde nachahmt.

Der Keilhaken ist einer der scheuesten Vögel, weshalb er bei den Wasserjagden gewöhnlich nur zufällig erlegt wird, wenn er an mit Rohr und Schilf bewachsenen Teichen oder Brüchern umherzieht und den Jäger nicht wahrnimmt. In früheren Zeiten wurde er mit Falken gebeizt, da das Wildpret der jungen Vögel ganz schmackhaft ist.

Die dickknieige Trappe, großer Regenpfeifer und ebenfalls auch großer Brachvogel genannt (Charadrius oder Otis oedicnemus).

Dieser Zugvogel ist ebenfalls kein besonderer Gegenstand der Jagd, doch ist er auch unter dem Namen großer Brachvogel

Digitized by Google

mit in die Jagdgesetze aufgenommen, da er früher ebenfalls gebeizt wurde.

Linné rechnete diesen Vogel zu den Sumpfvögeln, die späteren Ornithologen haben ihn mit Recht unter die hühnerartigen Vögel, und zwar zu den Trappenarten gebracht.

Die Länge dieser dickknieigen Trappe beträgt $4^1/_4$, die Breite $6^1/_2$ Dm. Der 4 Cm. lange, gerade Schnabel ist kurz zugespitzt, von schwarzer Farbe, an der Wurzel jedoch gelblichroth. Die Ständer sind bleichgelb. Der Mittelzehen ist lang und alle drei Zehen sind dick und durch Spannhäute verbunden, die beinahe bis an die ersten Zehengelenke gehen. Hinterzehen fehlen. Die Knieen sind ungewöhnlich dick, ebenso der Kopf. Die großen Augen, die Augenlider und die Augenringe sind goldgelb. Das Gefieder ist in der Hauptsache rostgelb mit schwarzbraunen Längsstreifen. Der Unterhals ist gelblichweiß und dunkelbraun bespritzt. Der Bauch und die Brust meist weiß. Die Schwanzfedern gelblichroth mit schwarz und weißen Bändern und rostrothen Spitzen.

Im April kommen sie aus dem Süden nach Deutschland und verweilen daselbst auf Brachäckern, großen Waldculturen, öden Sandflächen und überhaupt auf wenig fruchtbarem Boden. Im September ziehen sie nach den südlichen Ländern wieder ab.

Vom Wasser halten sie sich am Tage fern und ziehen nur des Abends oder Morgens dahin, um sich zu baden oder Wasser zu nehmen. Hierbei machen sie sich durch einen pfeifenden Ton bemerklich. Auch zwischen lichten Kiefernkusseln verweilen sie häufig, und nehmen auch in dichteren Kiefernbeständen ihre Zuflucht, wenn sie im Freien gestört wurden. Ihr Flug ist langsam, aber laufen thun sie schnell und weit.

Sie nähren sich von Regenwürmern, Larven, Spinnen, jungen Fröschen, Käfern, Sämereien und feinen Gräsern.

Das Weibchen legt meist ganz frei auf der Erde in einer kleinen Vertiefung zwei, selten drei schmutzigweiße Eier, die hellbraun gefleckt und gestrichelt sind. Die Brütezeit währt 18 Tage, und die Jungen sind nach drei Wochen flugbar. Nur diese

Digitized by Google

halten den Jäger bisweilen schußmäßig aus, werden aber sonst nur beiläufig geschossen, da ihr Braten auch nicht von besonderer Güte ist.

Der Kiebitz (Vanellus cristatus).

Dieser überall bekannte Zugvogel hat vorzugsweise nur ein Interesse für die Jägerei, weil seine Eier von kostbarem Geschmacke sind und diese auf manchem Jagdterrain eine ziemliche Rente abwerfen.

Linné rechnete den Kiebitz zu den Strandläufern (Tringa), doch später wurde derselbe von allen Sachkundigen in eine besondere Gattung Vanellus gebracht, da er von seinen Verwandten in vieler Beziehung abweicht.

Sein Gefieder ist im Frühjahre auf dem Rücken und den Flügeldecken dunkelstahlgrün. Der Bauch und die meisten Schwanzfedern weiß, die oberen jedoch dunkelröthlich, die äußeren endigen schwarz. Der gerade 3 Cm. lange, walzenförmige Schnabel ist schwarzbraun. Die Ständer, an denen vier Zehen sitzen, sind rothbraun. Der Federbusch am Hinterkopfe gebogen. Dieser sowohl, wie Scheitel, Kehle, Vorderhals und Brust ist schwarz und grün glänzend. Die Augen sind nußbraun. Ueber den Augen, Backen und Seiten des Halses hat er einen weißen, unter den Augen einen schwarzen Streifen.

Im Winter ändert sich das Gefieder unmerklich. Das Weibchen hat nicht die dunkeln Farben auf der Brust und der Federbusch ist dünner und kürzer.

Die Kiebitze gehören in Deutschland zu den ersten Boten des rückkehrenden Frühjahres. Bisweilen treffen sie schon Ende Februar, Anfangs März aber stets sicher ein, selbst wenn noch hin und wieder Schnee liegt. Sie ziehen in größeren Flügen bei Tag und Nacht zusammen und vertheilen sich gleich nach ihrer Ankunft paar-

Digitized by Google

weise. Sie leben auf Brüchern, Viehweiden, nassen Wiesen, feuchten Aeckern und Mooren.

Das Weibchen legt bald nach der Ankunft an den ersten wärmeren Tagen vier birnförmige, auf bräunlichem Grunde mit schwarzen Punkten und Strichen verschiedenartig gezeichnete Eier in einer kleinen Vertiefung frei auf der Erde. Werden ihm diese wiederholt genommen, so legt es mindestens nochmals ebenso viele Eier in dasselbe Nest und verläßt es nicht, wenn es heruntergejagt wird. Brüten thut das Weibchen aber nur auf höchstens vier Eier etwa 16 Tage lang, wo die Jungen auslaufen.

Im August und September ziehen sich die Kiebitze in größeren Schaaren zu 60 bis 80 Stück zusammen und treten dann ihre Rückreise nach Südeuropa und Afrika an, wo sie überwintern.

Ihre Nahrung besteht in Regenwürmern, Wasserinsekten, Schnecken und Larven.

Die Eier suchenden Menschen wissen die Kiebitze sehr geschickt zu täuschen und von ihrem Neste fortzuführen. Auch verleugnen sie in der Lege- und Brütezeit ihre sonst scheue Natur. Sie schwingen sich dabei sehr geschickt in der Luft umher und rufen fortwährend ihren Namen aus. Sie stoßen dann auf Menschen und Hunde und verfolgen die Raubvögel und Krähen, die über ihren Aufenthalt fortstreichen, so lange, bis diese wieder weit fortgezogen sind.

Die jungen Kiebitze werden nur in einigen Gegenden geschossen, doch ist ihr Braten sehr Geschmackssache.

Der Kranich (Grus cinereus).

Auch dieser Sumpfvogel ist in den meisten deutschen Jagdgesetzen als zur Jagd gehörig aufgeführt, weil er früher mit den Falken gebeizt wurde. Für die jetzige Jägerei ist er von keinem

Digitized by Google

Interesse, da er weder einen besonderen Nutzen hat, noch Schaden anrichtet.

Die Länge der Kraniche ist circa $1^1/_4$ Meter, die Breite etwa $2^1/_3$ Meter. Der Schnabel ist 9 Cm. lang, schwarzgrau und an der Spitze weißlich. Die Augen sind braun. Der Steiß ist kurz und besteht aus einem dicken Büschel gekräuselter Federn. Die geschuppten Ständer sind schwarz und die äußere Zehe ist mit der mittleren durch eine schmale Haut verbunden. Die Hinterzehe ist kurz und wird nicht zum Auftreten gebraucht. Der Vorderkopf ist schwarz, der Hinterkopf roth, kahl und dünn, mit haarähnlichen Federchen bewachsen. Im Nacken bilden die dunkeln, aschgrauen Federn ein Dreieck und ziehen sich von hier nach dem Auge zu zwei weiße Streifen. Der Vorderhals und die Backen sind dunkelgrau.

Im April kommen sie aus den südlicheren Ländern nach Deutschland in größerer Menge zusammen, stets keilförmig und meist am Tage bei Südwind gezogen.

Bei klarem Wetter und Sonnenschein hört man ihr Geschrei enörm hoch aus der Luft, und wenn sie auf der Erde etwas Auffälliges bemerken, schwingen sie sich oft erst eine Zeit lang im Kreise umher, ehe sie ihren geordneten Zug weiter fortsetzen. In größeren Schaaren sammeln sie sich in Norddeutschland und besonders auf den Strandinseln des Meeres und fliegen von hier aus bei günstigem Winde übers Meer.

Sie brüten theilweise auch im nördlichen Deutschland, in mit Holz und Rohr bewachsenen einsamen Brüchern, nachdem sie sich gepaart haben. Das Weibchen legt zwei längliche, auf grünem Grunde braungefleckte Eier und beide Gatten brüten abwechselnd.

Im October sammeln sie sich wieder und ziehen gemeinschaftlich nach wärmeren Ländern.

Größtentheils leben sie von Getreidekörnern, grüner Saat und anderen Pflanzenstoffen, Würmern, Schnecken und Fröschen, weshalb sie auch die Felder regelmäßig besuchen.

Digitized by Google

Im Magen finden sich stets ziemlich viele Quarzsteinchen, die zu ihrer Verdauung dienen.

Der Fischreiher (Ardea cinerea.)

Derselbe gehört zu den Zug- und Sumpfvögeln. Die Länge der Reiher beträgt 1 Meter, die Breite fast 2 Meter. Der gelbliche, gerade, spitze, an der Seite gefurchte Schnabel ist 12 Cm. lang, und an der Wurzel liegen in den Furchen die Nasenlöcher. Der Augenstern ist gelb.

Die geschuppten Ständer sind braun und übers Knie röthlich, haben lange, spitze Krallen an allen vier Zehen. Der Körper ist verhältnißmäßig klein und sehr schmal.

Ihre Hauptfarbe ist aschgrau und aschblau. Die Stirn ist weiß. Der Hinterkopf, an welchem ein Federbusch mit zwei besonders langen Federn sitzt, und ein über den Augen sich hinziehender Streifen ist schwarz. Auf dem Rücken liegen lange, weiße Federchen. Von den Schwungfedern sind die vorderen schwarzblau und die schmale Fahne daran ist weiß.

Es kommen die Reiher gewöhnlich einzeln oder paarweise im April nach Deutschland aus dem Süden und verbreiten sich hier überall bis zur Nord- und Ostsee, an Flüssen, Bächen und auf Brüchern. Im October ziehen sie familienweise oder in größeren Flügen zusammen dorthin zurück.

Sie horsten in manchen Gegenden Deutschlands colonienweise auf alten, hohen Bäumen, aber auch einzeln, mitunter weit vom Wasser entfernt, mitten im Walde. Sie bauen sich $^2/_3$ Meter breite Horste, oder benutzen die alten Horste immer wieder, von trockenem Reisigholze, die mit Schilf ausgelegt sind.

Die Weibchen legen zwei bis vier längliche, einfarbige grünlichblaue Eier und brüten drei Wochen. Beide Eltern ernähren die Jungen, so lange diese noch nicht vollständig fliegen können. Die

Digitized by Google

Nahrung besteht aus kleinen Fischen, Fröschen, Schnecken, Wasserinsekten, Mäusen und jungen Vögeln. Ihre Beute fangen sie gewöhnlich nur dadurch, daß sie sich auf den Anstand ganz regungslos in oder am Wasser oder auf Wiesen hinstellen und so auflauern. Nähert sich ihnen eins der obgedachten Thiere, so schnellen sie mit ungemein großer Geschwindigkeit den Hals lang fort und fangen es mit dem Schnabel sehr geschickt. Auf diese Weise erhaschen sie im gezähmten Zustande auf den Viehhöfen viele Sperlinge, welche jedesmal erst ins Wasser getaucht werden, ehe sie dieselben verschlucken. Selten suchen sie ihre Nahrung beim langsamen Hin- und Herschleichen, wie es andere Sumpfvögel zu thun pflegen. Ihr Flug ist langsam mit ganz eingezogenem Halse, und lassen sie dabei des Morgens und Abends einen lauten, unangenehmen, kreischenden Ton vernehmen.

Das Gesicht ist sehr scharf, und sind sie von Natur sehr scheu und wachsam. Beim Brüten sitzen sie sehr fest und verlassen ihr Nest ungern, und wenn man noch so viel Lärm unter demselben macht. Wenn sie dennoch vom Neste abgestrichen sind, kreisen sie hoch über demselben umher und kehren sofort zurück, sobald sich Niemand in der Nähe befindet.

Sie gehören ebenfalls wegen der früheren Beize zur hohen Jagd. Gegenwärtig haben sie aber keine Schonzeit mehr und werden überall verfolgt, da sie gar keinen Nutzen bringen und den Fischen großen Abbruch thun. In einigen Gegenden Deutschlands, wo sie colonienweise brüten, schießt man die Jungen mit der Büchse, wenn sie im Juli von einem Baum zum andern fliegen können und sich auf die höchsten Bäume hinstellen. Man betrachtet solche Reiherjagd als eine Uebung im Büchsenschießen in einer Jahreszeit und Gegend, wo es nichts weiter zu schießen giebt.

Die feinen Federn der alten Reiher vom Hinterkopfe und Rücken werden zum Putze auf Damenhüten verwendet.

Digitized by Google

Die Seeschwalben (Sterna) und die Möven (Larus).

Beide Gattungen kommen in vielen Arten in Deutschland vom Mai bis Anfang September vor, und sollen hier der Kürze halber nur ganz allgemein angeführt werden.

Sie leben an Flüssen, Binnenseeen, Teichen und auf den Strandinseln der Nord- und Ostsee. Ihre Größe ist zwar verschieden, doch im Gefieder ähneln sich alle Arten und ist dasselbe von hellgrauer oder bläulichgrauer, weißer und schwärzlicher Farbe. Je nach der Jahreszeit und dem Alter ändert sich dasselbe.

Sie sind alle Zugvögel und werden zu den Schwimmvögeln gerechnet.

Alle sind schlank gebaut und haben einen scharfkantigen, an den Seiten zusammengedrückten Schnabel.

Die Ständer oder Ruder sind niedrig. An den Zehen von denen die vorderen drei durch eine ausgeschnittene Schwimmhaut verbunden sind, sitzen ziemlich lange Krallen. Die Flügel sind spitz und schmal.

Bei den Seeschwalben ist der Schwanz gegabelt, bei den Möven dagegen, die auch größer sind, kaum eingebuchtet. Der Oberschnabel der letzteren von der Mitte aus hakig abwärts gebogen, der Unterschnabel hat einen vorspringenden Winkel. Die Schnäbel und Ruder sind roth oder gelb.

Einige Arten halten sich gern auf dem kahlen Seestrande auf, andere lieben mehr die Sandheger der Flüsse und morastige Landseeen.

Bei Nacht sitzen sie meist still am Wasser, desto mehr fliegen sie am Tage umher, unaufhörlich nach Nahrung suchend. Sie können alle schwimmen und wohl $1^1/_2$ Dm. tief unter Wasser tauchen, um kleine Fische zu fangen, weshalb sie sich nicht zu hoch über dem Wasserspiegel umhertummeln.

Ihre Hauptnahrung besteht aus Fischen und Wasserinsekten.

Mehrere Arten Möven und Seeschwalben sammeln sich im

Digitized by Google

Mai auf den Strandinseln der Ost- und Nordsee, oder auch auf Inseln, welche in Binnengewässern liegen, in großer Menge, um dort zu brüten, und kehren alle Jahre an solche Brutorte wieder zurück.

Sie paaren sich, und die Weibchen legen zwei bis vier grünlich, aschfarbene, bräunlich gefleckte, theils längliche, theils birnförmige Eier, fast platt auf der Erde. Männchen und Weibchen brüten abwechselnd, und wenn es sehr warm ist, geben sie den Sonnenstrahlen in der Mittagsstunde die Eier eine Zeit lang preis. Nach 18 bis 20 Tagen sind die Eier ausgebrütet und die Jungen begleiten die Eltern fliegend noch drei Wochen.

Bei den meisten Arten befinden sich die Nester auf der Erde nahe bei einander in großer Menge. Werden ihnen die Eier bis auf eins genommen, so legen sie wieder eins oder mehrere hinzu.

Sowohl im Innern von Deutschland, als auch an den Seeküsten werden in manchen Gegenden die Eier dieser Vögel massenhaft gesammelt und werfen sie den Grundbesitzern häufig eine nicht unbedeutende Revenü ab, indem sie dieselben nach größeren Städten verkaufen oder selber verzehren.

Die Jagd auf Möven und Seeschwalben geschieht größtentheils nur an den Seeküsten und Strandinseln, wo sie ein Amüsement der Badegäste in den Seebädern bildet.

Die Bewohner daselbst schätzen die Federn sehr, essen auch die Jungen, und die Federkiele kommen als Zahnstocher in den Handel. Wo die Möven in Menge brüten, und wo man die Eier sammelt, werden sie nie geschossen.

Man kann diese Vögel zeitweise im Anfange des August aus einem Boot in großer Menge in kurzer Zeit erlegen, wenn man erst eine oder mehrere flügellahm geschossen hat und diese auf dem Wasser schreiend umherflattern. Die sich in der Nähe befindenden Möven und Seeschwalben kommen dann herbeigeflogen und stoßen schreiend unaufhörlich auf die kranken. Auch stoßen sie auf ein weißes Schnupftuch, welches man an eine dünne Stange bindet und in der Luft hin- und herschwenkt, wobei sie ebenfalls erlegt werden.

Digitized by Google

Die Schwäne.

Es leben deren in Deutschland zwei Arten, und zwar:
der Höcker- oder stumme Schwan (Cygnus olor) und
der Singschwan (Cygnus musicus).

Die erstere Art wird in ganz Deutschland mehrfach auf Teichen und Seeen gezähmt, zur Belebung der Gewässer und wegen der schönen Federn gehalten.

In der Mark Brandenburg kommt sie in größerer Menge als halbwild auf allen Gewässern vor und steht die Administration der Schwanenzucht unter der Verwaltung des Königlichen Hofjagdamtes. Sie dürfen in der Mark nicht geschossen werden, außer vom Königlichen Hofjägdamte, wenn sie sich zu sehr vermehrt haben. Gegenwärtig rechnet man, daß über 2000 Stück vorhanden sind, wovon $^2/_3$ gelähmt sind.

Ihr rother Schnabel ist an der Wurzel mit einem schwarzen Höcker versehen und die Ruder sind schwarz.

Die zweite Art lebt ganz wild auf der Nord- und Ostsee und auf den in Norddeutschland befindlichen Binnenseen, die mit Rohr und Schilf bewachsen sind.

Sie gehört hauptsächlich dem Norden an und kommt nur in sehr strengen Wintern nach den noch offenen Stellen der Gewässer in Mitteldeutschland.

Anatomisch unterscheidet sich der Singschwan vom Höckerschwan dadurch, daß die Luftröhre sich trompetenförmig in der Brusthöhle zweimal umschlägt, wodurch er die lauten, gesangartigen Töne hervorbringen kann.

Auch hat dieser an der Wurzel seines schwarzen Schnabels eine große, gelbe Wachshaut. Schwimmend hält er den Hals stets gerade in die Höhe, während der erstere ihn gewöhnlich gebogen in der Form eines S hält.

Der Augenstern ist bei beiden Arten braun. An der Spitze

Digitized by Google

des Schnabels haben sie einen breiten Nagel und inwendig ist derselbe mit scharfen Zähnen besetzt.

In der Größe ist kein Unterschied, da es bei beiden Arten größere und kleinere Exemplare giebt. Durchschnittlich ist die Länge $1^3/_4$ Meter, die Breite fast 3 Meter. Die Weibchen sind etwas kleiner. Diese legen, wenn sie sich Ende April gepaart haben, im Schilf und Rohr, nicht weit vom Ufer, auf einem großen, von Reisigholz, Rohr, Binsen und Schilf zusammengebauten Neste sechs bis acht grünliche, selten etwas braun gefleckte Eier, welche in fünf Wochen ausgebrütet werden.

Die Jungen sind erst im dritten Jahre ausgewachsen und bis dahin von grauer und grau und weißer Farbe. Dann werden sie ganz weiß. Die Schwäne leben einzeln oder familienweise, nur in strengen Wintern sammeln sie sich in großen Schaaren an den noch offenen Seeen vom nördlichen Theile Deutschlands.

Ihre Nahrung sind Vegetabilien, wie junges Rohr, Gras, aber auch Getreide, Grassamen, Fische, Wasserinsekten und Schnecken. Niemals tauchen sie ganz unter das Wasser, sondern nur mit dem Kopfe und Halse, wobei der übrige Körper aufgerichtet steht, um vermittelst des langen Halses aus dem Grunde des Wassers Nahrung heraufzuholen.

Man schießt die wilden, jungen Schwäne im October auf den Seeen, wo sie ausgebrütet sind, indem man sich dieselben durch Kähne in den Rohrgelegen und Binsen zutreiben läßt, oder daß man sie mit vielen Kähnen, auf denen sich Schützen befinden, in eine schmale Bucht treibt, wo sie schließlich bei den Schützen vorbeifliegen müssen, wenn sie nach dem größeren Gewässer zurück wollen. Die alten Schwäne erlegt man auch im Winter an den offenen Stellen der Binnengewässer meist mit der Büchse auf größere Entfernungen, da sie schwer anzukommen sind. Die meisten Schwäne werden in Mecklenburg, auf der Insel Rügen und in Ostpreußen geschossen.

Die jungen Schwäne werden gegessen, und in hohem Werthe stehen die Federn und Daunen der alten. Die Haut am Halse,

Digitized by Google

der Brust und des Bauches hat dichte Pflaumfedern. Selbige wird gegerbt, nachdem die längeren Federn ausgerupft sind und zu allerhand Damenputz wie Pelzwerk verwendet.

Die wilden Gänse.

In Deutschland kommen drei Arten wilde Gänse vor, und zwar:
die März- oder Graugans (Anser cinereus),
die Saatgans (Anser segetum) und
die Ringelgans (Anser torquatus).

Die erstere Art hat einen mehr walzenförmigen, nach der Stirn zu erhabenen, rothen, 6 Cm. langen Schnabel, der vorn einen schmutzig weißen Nagel besitzt und scharf bezahnt ist.

Die Augen sind braun und die nackten Augenlieder roth. Die Ruder sind gelblich fleischfarben und die ziemlich starken Krallen hellgrau. Der Afterzehen ist unbelappt. Die Länge beträgt circa 7 Dm., die Breite $1^1/_2$ Meter.

Ihre Hauptfarbe ist dunkel aschgrau mit weiß. Der Kopf und Hals bräunlich grau. Der Rücken schwarzbraun und hellgrau untermischt. Die Schwanzfedern endigen in einen 2 Cm. breiten weißen Saum. Der Bauch und die Seiten sind weiß. Die drei ersten großen Schwungfedern sind grau und endigen schwarz.

Sie kommen Anfang März aus dem Süden in kleinen Schaaren oder schon paarweise nach Deutschland und nisten daselbst vereinzelt und in manchen Gegenden in größerer Menge zusammen auf seichten Seeen und Teichen, die am Rande mit Rohr, Schilf und Strauchwerk bewachsen sind.

Das Weibchen, welches etwas kleiner ist, baut sein Nest sehr versteckt auf Graspulten, in Sträuchern und auf kleinen, unzugänglichen, womöglich schwimmenden Inseln von trockenen Wasserpflanzen. Es legt 8 bis 12 grünlich weiße Eier und brütet 4 Wochen, wobei das Männchen stets Wache hält und andere Gänse aus der Nähe fortbeißt.

Digitized by Google

Ende Juli sind die Jungen flugbar und fast ausgewachsen, im October verlassen sie Deutschland und wandern familienweise nach dem Süden, wobei das alte Weibchen gewöhnlich an der Tête fliegt.

Ihre Nahrung besteht aus Gras, Wasserpflanzen, Getreide, Wasserinsekten, Fisch- und Froschlaich.

Die jungen Gänse dieser Species schießt man auf den Seeen, wo sie ausgebrütet sind, vermittelst Kähnen, auf denen sich Schützen befinden. Ein anderer Theil der Schützen wird auf Inseln oder Landzungen ausgesetzt und erwarten die Gänse daselbst, wenn sie durch Treiber und Hunde aufgescheucht sind und über die Rohr- und Binsengelege umherstreichen. Die alten güsten und Brutgänse rauhen oder mausern sich schon Ende Juni und Anfang Juli und sind in dieser Zeit leicht zu schießen, da sie entweder noch gar nicht fliegen können oder stets bald wieder einfallen, wenn sie aufgestiegen sind. —

Die Saatgans ist der vorigen sehr ähnlich, doch ist sie viel kleiner und hat ein dunkleres Gefieder. Der Schnabel ist schwarzbraun und orangegelb und etwas platt gedrückt. Der obere Theil ist sägeförmig gezahnt und an der Wurzel befindet sich auf jeder Seite ein kleiner weißer Fleck.

Die Ruder sind bei den alten Gänsen roth, bei den jungen schwärzlich. Die zusammengelegten Flügel ragen über die Schwanzspitze hinaus. Der Kopf und Hals, Rücken und Flügeldecken sind bräunlich aschgrau.

Sie kommen im October in großen Massen nach Deutschland und halten sich hier auf den Saat- und Rapsfeldern am Tage auf. Des Abends streichen sie nach offenen Gewässern, und in sehr strengen Wintern, wenn hier kein Wasser mehr zu finden ist, ziehen sie südlicher, sonst bleiben sie bis Ende April hier und thun dann in manchen Gegenden den jungen Saaten einen nicht unerheblichen Schaden. Sie brüten nur im hohen Norden Europas, woher sie im Herbste und Winter zu uns kommen. Stets fliegen sie laut

Digitized by Google

schreiend in keilförmig regelmäßigen Zügen und führt die Spitze stets ein alter Gansert.

In Deutschland werden sie hauptsächlich des Abends spät auf dem Anstande am Wasser geschossen. Sie fallen dann gern auf überschwemmte Wiesen oder auf Sandheger, die am Ufer oder mitten in den Flüssen liegen, ein. Auf den Feldern lassen sie sich am Tage nicht ankommen, da sie ungemein scheu und wachsam sind. Ihr Wildpret ist zu genießen und die Federn sind für die Hausfrauen ein kostbarer Schatz. —

Die Ringelgans ist nur $^2/_3$ so groß, als die vorige Art. Der schwarze Schnabel ist kurz, an der Wurzel dick. Die Bezahnung ist schwach. Die Ruder sind schwarz, die Augen schwarzbraun. Das Gefieder ist am Kopfe, auf der Brust und dem Hinterkörper schwarz, auf dem Rücken und an den Seiten wellenförmig aschgrau. Die Deckfedern des Schwanzes sind weiß. Am Halse hat sie einen grau und weiß gemischten Ring, der sich vorn und hinten unter den dunklen Federn verläuft. Sie leben auf der Nord- und Ostsee und brüten nur im hohen Norden Europas, dennoch kommen sie auch im Herbst und Frühjahr in großer Menge an den Ostseeküsten, bei Rügen und auch auf den größeren Binnengewässern von Norddeutschland vor, wo sie mit Booten angefahren und geschossen werden, da sie nicht sehr scheu sind. Ihr Wildpret ist ebenso genießbar als das der beiden vorigen Arten.

Die wilden Enten.

Von diesen sollen hier nur die Süßwasser-Enten näher beschrieben werden, da diese in Deutschland noch am häufigsten vertreten sind. Die auf und am Meere lebenden Enten haben weniger Interesse für die meisten Jäger, da sie bei uns nur auf den größeren Gewässern beim Durchzuge vorkommen, sich nicht aufhalten und nur einige Arten ausnahmsweise hier brüten.

Digitized by Google

Das Hauptunterscheidungszeichen aller Süßwasser-Enten ist, daß sie am Hinterzehen keine Lappen haben.

Der allgemeine Charakter der Enten ist, daß ihr Leib breit und der Kopf ziemlich dick ist. Der Schnabel ist breit, der obere Theil an der Wurzel stark gewölbt; die Ränder desselben ragen über den Unterschnabel hinweg, und an der Spitze befindet sich ein gekrümmter Nagel.

Die Bezahnung ist scharf. Die Ruder sitzen ziemlich weit nach hinten. Die vorderen Zehen sind durch eine vollständige Schwimmhaut verbunden. Die Flügel sind spitz und schmal. Die zweite Schwungfeder ist die längste.

Die Deckfedern der Flügel, besonders beim Entvogel oder Erpel, haben schöne, glänzende Farben und einen besonders hervorragenden Fleck, den Spiegel. Die Färbung des Gefieders ist nach Geschlecht und Alter sehr verschieden. Die Erpel haben am Kopfe und Halse meist bunte Metallfarben.

Die Weibchen dagegen sind kleiner als die Männchen und sind mit weniger Ausnahme von einfacherer grauer und brauner Farbe.

Das Brutgeschäft und die Führung der Jungen besorgen die Weibchen allein.

Alle Enten sind gute Taucher. Sie sind Strich- und Zugvögel, leben überall in Deutschland, theils paarweise, theils in größerer Menge; besonders im Herbste und Winter auf Seeen, Teichen, Brüchern, nassen Wiesen mit kleinen Lachen, Wasserlöchern und Flüssen, die mit Rohr, Schilf, Binsen und Strauchwerk bewachsen sind.

Sie nähren sich von Grassamen, Getreidekörnern, Eicheln, Bucheln, Wasserpflanzen, Schnecken, Fröschen, Fischen, Frosch- und Fischlaich. Sie reihen schon Ende März und ihre Brutzeit ist im April und Mai. Das Weibchen legt 8 bis 14 grünliche Eier in Nestern von Schilf und Gras, napfförmig gebaut, die mit Daunenfedern ausgefüllt werden. Wenn sie die ersten Eier durch Menschen, Raubzeug oder Ueberschwemmungen verlieren, legen sie gewöhnlich

Digitized by Google

nochmals in einem neuen Neste, aber dann nur 5 bis 6 Eier. Die Nester bauen sie auf Kaupen, in Sträuchern oder auf kleinen Erhöhungen, in Wiesen, Brüchern, in Rohrgelegen und im Walde, bisweilen weit vom Wasser ab. Nur die Märzenten brüten öfters auf höheren Bäumen, in alten Krähennestern oder auf Kopfhölzern, von wo sie ihre Jungen nach dreiwöchentlicher Brütezeit im Schnabel zur Erde bringen und nach dem Wasser führen. Hier schwimmen diese, wie alle jungen Enten, schon am zweiten Tage, nachdem sie ausgekommen sind, mit der Mutter umher. Die Mauserzeit fällt im Juli, doch nur die Erpel können eine Zeit lang nicht fliegen.

Die Märzente oder Stockente (Anas boschas).

Sie ist in Deutschland am meisten vertreten und sieht der zahmen Ente am ähnlichsten. Die Augen sind braun.

Das Männchen hat im Schwanze mehrere zurückgerollte sammtschwarze Federchen mit weißen Schäften. Seine Länge ist durchschnittlich $4^3/_4$ Dm., die Breite über 1 Meter. Kopf und Hals sind blauschwarz und grünlich schillernd. Letzterer ist von einem weißen Ringe begrenzt, der hinten nicht ganz zusammen geht. Der Hinterhals und die Seitenfedern sind braungrau. Die Brust und der Bauch sind fein wellenförmig braun und grau. Die unteren Federn des Schwanzes sind glänzend schwarz ins Grünliche schillernd. Der Spiegel ist schwarz, braun, grau, glänzend blau, auch grünlich schillernd und oben und unten weiß.

Das Weibchen hat einen grünlichgrauen Schnabel. Die Kehle ist weißlich. Kopf und Hals sind gelblich braun, ebenso die Brust und der Bauch. Der Rücken schwarzbraun. Der Schwanz rostgelb mit schwarzbraunen Querflecken. Der Spiegel ist kleiner als beim Männchen, aber auch stahlblau und weiß mit einer schwarzen und weißen Linie eingefaßt.

Digitized by Google

* Die Krückente (Anas crecca).

Ihr Körper ist nur halb so groß als bei der Märzente und ist sie unsere kleinste einheimische Ente. * Die Länge derselben ist circa 3 Dm. und die Breite $5^1/_2$ Dm.

Das Männchen hat einen schwarzen Schnabel und aschgraue Ruder. Kopf und Hals sind rothbraun mit grünlichblauen, länglichen Streifen an den Seiten, die sich im Nacken in einem schwarzen Fleck vereinigen. Von der unteren Schnabelwurzel zieht sich eine weiße, krumme Linie nach den Augen hin, welche sich daselbst in zwei Streifen theilt. Der Hinterhals und Rücken ist weiß mit schwarzen, wellenförmigen, feinen Querlinien. Der Schwanz ist schwarzbraun und weiß. Die Brust ist röthlichweiß mit schwarzbraunen Flecken. Der Bauch und die Seiten wellenförmig dunkelgrau. Der Spiegel ist glänzend schwarz und grün, ins Bläuliche schillernd und weiß gesäumt.

Das Weibchen ist am Kopfe und Halse schwarzbraun mit grauen, rothen und schwarzen Flecken besprengt. Die Kehle, Brust und Bauch weißlich. Der Rücken und Schwanz ist schwarzbraun und weißgrau mit hellrothen Flecken. Spiegel, Ruder und Schnabel sind wie beim Männchen.

Die Knäckente (Anas querquedula).

Diese ist unbedeutend größer als die vorige und pflegt im Winter, wenn es friert, südlicher zu streichen.

Der Erpel hat einen bräunlichschwarzen Schnabel, der fein gezahnt ist. Die Ruder sind aschgrau, die Augen kastanienbraun. Ueber den Augen zieht sich ein weißer Streifen bis in den Nacken. Die Scheitelfedern sind braun, Hals röthlich mit weiß untermischt, Brust dunkelbraun mit bogenförmigen

Digitized by Google

hellbraunen Querflecken. Der Rücken und die Deckfedern des Schwanzes dunkelbraun und grau mit weißen Streifen. Der Bauch weißlich; an den Seiten mit wellenförmigen feinen schwarzen Zickzacks versehen. Die Deckfedern der Flügel sind hellgrau und bläulich. Die Schwungfedern aschgrau mit dunkelbraunen Spitzen. Der Spiegel ist grün und weiß eingefaßt.

Das Weibchen ist auf dem Kopfe und am Halse dunkelbraun. Um den Augen befindet sich ein schmutzigweißer Streifen. Die Kehle, Brust und Bauch sind weißlich. Der Rücken ist braun und grau melirt. Die Flügeldeckfedern braungrau, nicht glänzend und durch einen weißen Streifen begrenzt. Schnabel und Ruder sind grau.

Die Fasanenente oder Pfeilschwanz (Anas acuta).

Der Körper dieser Ente ist nur wenig kleiner als bei der Märzente, aber weit schlanker gebaut. Der Hals ist dünn und lang, weshalb sie auch 4 Cm. länger ist als diese.

Der Erpel hat einen aschgrauen Schnabel, der an der Wurzel schwärzlich ist; der kleine Nagel an der Spitze ist schwarz. Die Ruder sind ebenfalls aschgrau; die Augen gelb.

Der Kopf und ein Theil des Vorderhalses ist glänzend braunroth und grünlich. Der übrige Theil des Vorderhalses, die Brust und der Bauch sind weiß. Vom Unterhalse bis an den Hinterkopf zieht sich auf jeder Seite ein weißer Streifen. Zwischen diesen ist der Hinterhals schwarz und grünlich glänzend und weiter nach dem Rücken zu braungrau mit schwarzen Punkten. Der obere Theil des Rückens ist schwarz und weiß mit fein geschlängelten Querlinien, der untere Theil hat schwarz und weiße Längslinien. Der Schwanz enthält schwarze Deckfedern und zwei lange zugespitzte, weißgekantete Mittelfedern, die übrigen sind aschgrau und auch weiß gekantet. Der Spiegel ist schwarz, roth und grün

Digitized by Google

glänzend, unten mit einer schwarzen und weißen, oben mit einer braunrothen Einfassung versehen.

Das Weibchen hat den Schnabel, die Ruder und Augen von derselben Farbe wie der Erpel. Der Kopf ist braun mit dunkelbraunen kleinen Flecken. Hals und Rücken sind ebenfalls dunkelbraun und weißgrau gemischt. Die Flügel sind aschgrau. Der Spiegel bläulichgrau und weiß berändert. Der Schwanz ist zugespitzt, aber nicht so lang wie beim Männchen, und röstgelb mit braunen Querstreifen. Die Brust und der Bauch sind weißlich und rostbraun gefleckt.

Die Löffelente (Anas clypeata).

Diese Entenart steht in der Größe zwischen der März- und Knäckente. Der Schnabel ist von löffelartiger Form und mit kammartigen Zähnen und scharfem Nagel versehen. Beim Erpel ist der 3 Cm. breite Schnabel schwarz. Die Ruder sind gelblichroth, die Augen gelb. Der Kopf und obere Theil des Halses ist schwarz, der untere Theil und die Brust weiß, der Bauch braun. Vom Kopfe zieht sich ein schwarzbrauner Streifen auf den Hinterhals nach dem Rücken zu. Letzterer ist braun mit grau berändert ten Federn. Die Schwanzfedern sind grün und schwarz, die großen Schwingfedern dunkelbraun, die kleineren blau. Die Deckfedern der Flügel himmelblau und nach der Schulter zu weiß. Der Spiegel ist grün und oben mit einer weißen Einfassung.

Das Weibchen hat einen mehr grünen Schnabel, der auf beiden Seiten orangeroth eingefaßt ist. Kopf und Hals sind gelblichroth und dunkelbraun durchadert. Brust, Rücken und Bauch sind dunkelbraun mit hellbraun eingefaßten Federn untermischt. Die Deckfedern der Flügel sind aschgrau. Der Spiegel dunkelgrün mit weißer Einfassung. Die Schwingen sind schwarzbraun, die Schwanzfedern graubraun.

Digitized by Google

Von den bereits oben erwähnten Enten, welche mehr auf den salzigen Seeen und in Mooren leben, brüten nur selten in Norddeutschland:

die Brandente (Anas tadorna),
die Tafelente (Anas ferina) und
die Pfeifente (Anas penelope).

Dies sind alles Zugenten. Am Hinterzehen hat die Tafelente eine Lapphaut, die Brandente und Pfeifente nur eine ganz schmale Behäutung an demselben.

Sie suchen ihre Nahrung meist nur durch Tauchen unter dem Wasser. Auch haben sie einen thranigen Geschmack. Kommen noch andere Entenarten, die hier nicht genannt sind, brütend hier vor, so gehört dies nur zu den Ausnahmefällen.

Die Brandente ist größer als die Märzente, hat einen etwas nach oben gebogenen Schnabel, der an der Wurzel einen fleischigen Höcker besitzt, Kopf und Hals sind grün glänzend. Ueber der Brust und den oberen Theil des Rückens liegt ein breites, rostrothes Band. Die Mitte des Rückens ist weiß und zur Seite desselben befinden sich zwei große, schwarze, längliche Flecke. Die Schwungfedern sind schwarz, der Spiegel grün und roth glänzend. Männchen und Weibchen sehen sich sehr ähnlich, nur fehlt bei letzterem der Höcker. Sie brüten an hohen Ufern in alten Fuchs- und Dachsbauen, zwischen Felsenspalten und unter ausgespülten Baumwurzeln.

Die Tafelente ist etwas kleiner als die Märzente. Der Erpel hat einen schwarzen Schnabel, welcher in der Mitte braun ist. Der Augenstern ist orangeroth, Ruder hellgrau, doch die Schwimmhäute schwarz. Kopf und Hals und ein Theil der Brust dunkel braunroth. Der übrige Körper grauschwarz, nur der Bauch schmutzigweiß mit grauen Zickzacks. Der Spiegel ist grau und grauschwarz, oben und hinten weiß eingefaßt. Die Schwingen sind grau. Das Weibchen sieht mehr einfarbig, gelb, braun und roth aus, und sind diese Farben wellenförmig durcheinandergemischt.

Digitized by Google

Kehle und Vorderhals sind weißlich mit rostfarbigen Flecken. Der Schnabel ist in der Mitte bläulich.

Die Pfeifente ist ebenfalls kleiner als die Märzente. Der kurze Schnabel und die Ruder sind bleifarbig, ersterer an der Spitze schwarz. Die Stirn ist weißlichgelb, an den Seiten gelblich. Kopf und Oberhals sind beim Männchen rostbraun, der Unterhals und die Brust roth und grau. Der Bauch weiß, der Rücken grau mit feinen Wellenlinien. Die Flügel sind größtentheils weiß. Der Spiegel grün und schwarz eingefaßt. Das Weibchen hat mattere Farben am Kopfe und Halse, ist gelbroth und grau mit schwarzbraunen Flecken. Die Flügel haben weniger weiß, sonst sind sie dem Entvogel sehr ähnlich.

Die wilden einheimischen Enten haben in den letzten 15 Jahren in Deutschland außerordentlich abgenommen, weil es viel trockene Jahre gegeben hat und weil man bei der fortschreitenden Bodencultur viele Teiche, Brücher und nasse Wiesen entwässert und trocken gelegt hat. Auch die Brutstätten sind ihnen vielfach genommen, da man die hohen Graspulten in den Brüchern abgehauen und diese geebnet hat. Auch sind die Sträucher und Kopfweiden auf den früher der Ueberschwemmung ausgesetzten Wiesen entfernt. Endlich werden auch auf den Bauerjagden die Eier der Enten vielfach ausgenommen. Auf großen Flächen, wo früher noch im Schilf Gänse, Enten und Kraniche in Menge brüteten, wächst jetzt Gras und Getreide, und alle Wasser- und Sumpfvögel sind daselbst gänzlich verschwunden.

Dennoch haben sich in manchen Gegenden noch Entengelegenheiten erhalten und exercirt man dort die Entenjagden entweder auf der Suche mit Hühnerhunden, die gern ins Wasser gehen, oder man betreibt die Jagd auf Kähnen, indem man auf Seeen und Teichen die großen Rohr-, Schilf- und Binsengelege abfährt oder umstellt und die Enten durch Treiber und Hunde den Schützen zujagen läßt. Ferner ist es oft sehr lohnend, wenn man sich des Abends anstellt, wo die Enten gern ziehen und einfallen, um Nahrung während der Nacht zu suchen. Auch kann man die um-

Digitized by Google

herstreichenden Enten durch gezähmte Lockenten veranlassen, daß sie da einfallen, wo solche auf dem blanken Wasser gefesselt sind, und wo man sich versteckt anstellen kann. Am liebsten fallen die umherstreichenden Enten im Herbste, wo ihre Strichzeit beginnt, auf flachen Wasserschlänken, wo viel Schwadengras steht und auf kleinen, nicht tiefen Wasserlöchern, überhaupt auf seichtem Wasser ein, wo sie viel Nahrung finden. Nicht selten lassen sich die Märzenten auf den Hafer- und Gerstenstoppeln nieder oder auch unter alten freistehenden Eichen und Buchen, welche Mast tragen, um dort Körner oder Eicheln und Bucheln zu suchen, wo man sie ebenfalls erlegen kann.

Leider werden in manchen Gegenden und besonders an den Meeresküsten und Küsteninseln die Enten noch immer massenhaft in Netzen oder Entenfängen gefangen, und trägt diese Methode, die Enten zu erlegen, zu ihrer Verminderung ebenfalls wesentlich bei.

Will man eine Entenjagd conserviren und junge Enten erziehen, so schieße man auch niemals im Frühjahre die Erpel fort, denn diejenigen Pärchen, welche sich im Frühjahre auf den kleineren Gewässern aufhalten, brüten auch dort und man hat stets junge Enten zu erwarten. Werden die Paarenten oft gestört, wird nach ihnen geschossen oder die Erpel todtgeschossen, so suchen sie sich sicher bald einen ruhigeren Aufenthalt und verlassen die Gegend, die sie ursprünglich zu ihrer Brutstätte bestimmt hatten.

Wenn irgend möglich, so suche man in der Zeit, wo die jungen Enten ausgekommen sind, die Rohr- und Kornweihen an den Seeen fortzuschießen, da diese jenen großen Abbruch thun.

Die Raubvögel.

Es sind hier nur diejenigen Raubvögel aufgeführt und beschrieben, welche in Deutschland häufig vorkommen, hier brüten

Digitized by Google

und für die Jagd schädlich sind. Nur diese haben ein besonderes Interesse für die Jägerei.

Das Gefieder der einzelnen Raubvogelarten ist schwierig zu beschreiben, da dasselbe nach Alter und Geschlecht sehr verschiedenartig erscheint und bis zum fünften Jahre ihres Alters alljährlich wechselt. Es giebt jedoch immerhin bestimmte Merkmale, woran man die einzelnen Species deutlich erkennt und welche hier auch angegeben sind.

Der allgemeine Charakter der Raubvögel ist folgender:

Die Weibchen paaren sich mit einem Männchen und sind stets größer als diese. Nur theilweise sind die Geschlechter von einander am Gefieder zu unterscheiden.

Der Schnabel ist kurz von der Seite zusammengedrückt. Die Firste des Oberschnäbels ist stark gebogen, sehr spitz und hakenförmig über dem Unterschnabel gekrümmt; die stets scharfen Ränder an denselben sind bei einigen Arten noch mit einem Zahne versehen, welcher sich an der Spitze über dem Unterschnabel befindet.

Die Fänge sind kurz, stark, und die Zehen mit langen spitzen Krallen bewaffnet, welche letzteren oben gewölbt sind und unten scharfe Ränder haben. Ihre Sinneswerkzeuge sind so scharf, daß sie an das Unglaubliche grenzen. Die Mehrzahl gehört dem Walde an, doch suchen sie meistens ihre Beute auf dem freien Felde und am Wasser. Sie leben gewöhnlich einzeln und nur in der Zugzeit sammeln sich einzelne Arten in größerer Menge zusammen. Sie sind theils Zug-, theils Strichvögel. Die Brütezeit ist im April und Mai und die Mauserzeit im Juli. Sie legen zwei bis vier rauhschalige Eier, die entweder weiß oder weißlich mit braun und rothen Flecken und Punkten versehen sind. Ihre Brütezeit währt drei bis vier Wochen. Das Brutgeschäft besorgt das Weibchen allein, doch die Jungen werden von beiden Eltern ernährt.

Sie schlagen ihre Beute mit den Fängen. Die verschluckten kleinen Knochen, Haare und Federn ballen sich im Kropfe in kleine Klumpen zusammen, welche man Gewölle nennt, und speien sie

Digitized by Google

diese nach 12 bis 16 Stunden wieder aus. Sie können auf einmal viel kröpfen, d. h. fressen, aber auch wieder sehr lange ohne Nahrung sein.

Der Steinadler (Aquila fulvus).

Nur selten kommt er in Deutschland vor und lebt meist im hohen Gebirge.

Sein Länge beträgt 8 Dm., die Breite 18 bis 19 Dm.

Der Schnabel ist gelblichweiß oder bläulich und an der Spitze schwarz. Die Wachshaut ist gelb. Der Augenstern gelblichroth. Die Fänge sind bis an die Zehen befiedert und die Federn daran weißlich, die Zehen gelb. Kopf, Hals und die obere Kante der Flügel sind rostroth mit weißen Flecken. Der Schwanz ist weiß und endigt mit einem dunkelbraunen Saume; bisweilen ist dieser auch braun und dunkel gebändert. Die Kehle ist oft schwarz. Der übrige Körper ist dunkelbraun mit röthlichen, wellenförmigen Flecken.

Er nährt sich von Kälbern der Rehe und Gemsen, seltener von Roth- oder Damwildkälbern. Er schlägt aber auch Hasen und alles Geflügel und die Lämmer der Schafe und Ziegen. Nur im Nothfall nimmt er Aas.

Das Weibchen legt zwei weiße Eier in einem sehr großen, flachen Horste, der von ziemlich starkem Reisigholz gebaut ist. Als Brutstätte wählt es gewöhnlich unzugängliche Felsenvorsprünge und selten hohe, alte Bäume.

Geschossen wird der Steinadler gewöhnlich nur zufällig oder in der Nähe des Horstes auf dem Anstande, wenn die Jungen so groß sind, daß man sie ausnehmen und erhalten kann.

Digitized by Google

Der Seeadler (Aquila ossifragus oder albicilla).

Nur an der Nord- und Ostsee findet sich der Seeadler häufig, doch kommt er im Herbste und Winter überall in Deutschland in einzelnen Exemplaren vor.

Seine Länge ist 9 Dm., die Breite meistens 24 bis 25 Dm. Der gelbliche Schnabel hat eine gelbe, bisweilen bläuliche Wachshaut. Der Augenstern ist braun, die geschuppten Fänge, welche nicht befiedert sind, gelblich. Am Kopfe und Halse hat er lange, schmale, braune Federn, die im Alter ganz weiß werden. Der Schwanz ist unten bei alten Exemplaren stets weiß, oben jedoch, wie auch der übrige Körper, braun mit helleren und weißen bogenförmigen Flecken. Das Weibchen ist von dunklerer Farbe als das Männchen.

Seine Nahrung besteht aus Wild- und Rehkälbern, Hasen, Geflügel, todten Fischen und Luder. Er kann daher auch auf Luderhütten geschossen werden.

Das Weibchen horstet hauptsächlich in der Nähe der Nord- und Ostsee auf alten, oft freistehenden Bäumen, aber womöglich an einsamen Orten. Es legt zwei weiße Eier, die roth und braun gefleckt sind, in einem sehr großen, flachen Horste, welcher von Reisigholz fest zusammengefügt ist.

An der Ostsee schont man die Seeadler überall, besonders in der Brutzeit, um die Jungen lebendig auszunehmen und zoologischen Gärten zu überlassen. Die Seeadler thun dort an der See der Jagd wenig Schaden, da sie meist von todten, angeschwommenen Fischen leben. Im Innern von Deutschland schlagen sie häufig alte Hasen, und wenn sie sich dann recht voll gekröpft haben, lassen sie sich nicht selten schußmäßig ankommen. Sonst werden sie nur zufällig erlegt.

Digitized by Google

Der Flußadler (Aquila haliaëtos).

Derselbe hält sich vom März bis im October überall in Deutschland an Flüssen und Teichen auf, die sich in der Nähe von Waldungen befinden. Seine Länge beträgt $6^1/_4$ Dm. und die Breite 16 Dm. Der Schnabel hat, wie alle Adler, keinen Zahn, der Haken daran ist sehr spitz und die Wachshaut bläulich. Die Fänge sind graublau und bis unters Knie weiß befiedert. Hinterkopf, Kehle und Bauch sind weiß mit feinen, braunen Wellenlinien. Am Hinterkopfe stehen die Federn etwas gekrümmt nach oben. Der Unterhals hat dreieckige, rostbraune Flecke auf weißem Grunde. Auf den braunen Flügeldecken und dem Schwanze befinden sich hellere Querbinden. Die Flügel überragen beim Zusammenlegen den Schwanz sehr bedeutend.

Er nährt sich fast nur von großen Fischen, die er bis 3 Dm. tief unter dem Wasser hervorholt, indem er sich hoch aus der Luft mit ungemeiner Schnelligkeit senkrecht auf seine Beute stürzt. Nur selten nimmt er Wassergeflügel.

Das Weibchen horstet auf hohen Bäumen und in Felsenspalten und legt zwei weiße, mit wenig rothen Punkten versehene Eier.

Seine Beute verzehrt er auf trockenen Aesten alter Bäume, oder auf Felsenspitzen und größeren Steinen, wobei er bisweilen angeschlichen und erlegt wird.

Der Schreiadler (Aquila naevia).

In Deutschland ist er überall vereinzelt in den größeren Waldungen vom März bis October vertreten und brütet hier gewöhnlich in der Nähe von Seeen oder kleinen Wasserlöchern auf alten Bäumen.

Digitized by Google

Seine Länge beträgt 6½ Dm. und die Breite 14½ Dm. Der Schnabel ist schwarz und die Wachshaut gelb. Die Fänge sind gelblichgrau. Das ganze Gefieder ist dunkelrothbraun und auf dem Flügel und Rücken befinden sich weißlichgraue Flecke. Er kröpft meist junge Hasen und junges Geflügel, aber auch Frösche. Im Allgemeinen ist er nicht sehr scheu und wird daher nicht selten zufällig geschossen. Das Weibchen legt zwei weiße mit rothen Flecken bespritzte Eier, die in 21 Tagen ausgebrütet werden. Ihr Horst steht stets sehr verdeckt zwischen oder auf dicken Aesten in der Mitte des Baumes und besteht aus feinem Zackholze, was nur mit Federn ausgefüttert ist. Fast jedes Jahr brüten diese, wie alle Adler, wieder in demselben Horste, auch wenn ihnen die Jungen stets fortgenommen werden.

Der Hühnerfalke oder Hühnerhabicht (Falco palumbarius).

Von allen Falken ist dieser der gefährlichste Räuber für alles Federwild. In Deutschland ist er zu allen Jahreszeiten überall in wildreichen Gegenden vertreten und ist ein Strichvogel, der niemals gesellig lebt.

Erst im Herbste des zweiten Jahres ist das Männchen vom Weibchen am Gefieder zu unterscheiden und sind beide bis dahin mehr einfach rothbraun, mit schwarzbraunen Längsstreifen über dem ganzen Körper versehen. Die Deckfedern der kurzen und spitzen Flügel sind aschgrau mit dunkelbraunen Flecken. Von den graubraunen Schwingfedern sind die dritten und vierten die längsten. Der Unterleib ist röthlich und gelblichweiß mit welligen Querstreifen, die bald braun, bald grau sind. Der schwarze Schnabel hat einen Zahn und eine grüngelbliche Wachshaut. Die Fänge sind gelb und mit sehr starken, langen, spitzen Krallen bewaffnet. Der Mittelzehen ist der längste. Der lange Schwanz, welcher die zusammengelegten Flügel weit überragt, hat oben vier schwarze

Digitized by Google

und vier graue breite Querbänder. Der Augenstern ist gelb, und über den Augen befindet sich oft ein weißer Streifen. Die Länge eines alten Männchens beträgt 5 Dm., die Breite 10 Dm. Der Kopf und Oberhals ist bei diesem hell rostfarbig und dunkelbraun gestrichelt. Der Oberkörper graubraun und aschblau überflogen. Der Unterkörper ist weiß mit schwarzbraunen, wellenförmigen feinen Querlinien gezeichnet. Das alte Weibchen bleibt sich im Gefieder mehr gleich, wie oben angegeben ist, und sind namentlich die Hosen gelblichbraun und haben feine, braune Längsstreifen. Seine Nahrung besteht in allem wilden und zahmen Geflügel, welches er fliegend in der Luft und auch von der Erde mit den Fängen stößt, wobei er stets mit großer Geschwindigkeit in schräger Richtung von oben nach unten fliegt. Auch schlägt er Hasen und Kaninchen.

Das Weibchen horstet in den höchsten Bäumen, dicht am Stamme in größeren, zusammenhängenden, einsamen Waldungen. Der Horst besteht aus dürrem Reisigholze und kleinen Nadelholzzweigen und ist mit Daunen ausgepolstert. Es sucht auch alle Jahre denselben Horst wieder auf, legt Ende April zwei grünlichweiße, bisweilen mit gelben Punkten bespritzte Eier, welche in drei Wochen ausgebrütet werden. Beide Eltern tragen den Jungen die Nahrung in Masse zu und wachsen diese sehr schnell heran.

Des großen Schadens wegen muß der Hühnerfalke auf alle mögliche Weise verfolgt werden, denn man kann annehmen, daß er vom August ab, bis das Getreide im folgenden Jahre wieder hoch wird, täglich mindestens ein Rebhuhn oder einen Fasan schlägt, wo die Jagden überhaupt gut besetzt sind. Er ist unter den Fasanen und Hühnern dasselbe, was der Wolf zwischen der unbewachten Schafheerde ist. Sein Horst ist oft schwer zu finden, und kann man diesen nur durch aufmerksames Beobachten der alten Vögel, während sie Junge haben und auf Jagd umherstreifen oder mit Beute zurückkehren, entdecken. Auf freiem Felde bekommt man die Hühnerfalken nur sehr selten schußmäßig, und ebenso selten

Digitized by Google

werden sie auch auf der Krähenhütte geschossen. Sie blocken daselbst niemals auf, sondern stoßen auf den Uhu wohl einige Male und streichen dann weiter. Sehr sicher fängt man ihn in Habichtskörben und sogenannten Stoßnetzen. Erstere sind ja sehr bekannt, und sei hier nur bemerkt, daß man sie am zweckmäßigsten nicht ganz frei, sondern in Feldremisen oder jungen Schonungen so aufstellt, daß der Korb oben gerade aus den Holzspitzen hervorragt. Die Stoßnetze kann man überall auf dem freien Felde oder auf jeder großen Blöße im Walde aufstellen. Diese werden in vielen Gegenden gar nicht angewendet, und doch sind sie die einfachsten und zugleich praktischsten Werkzeuge, die Hühnerfalken, die sich in einer Gegend länger aufhalten, schnell wegzufangen. Man verliere nur nicht die Geduld, wenn es mit dem Fangen nicht gleich in den ersten Tagen glückt. Man muß bei diesen Fangenetzen, die nicht weiter als 2 Meter im Quadrat und nicht höher als 2 Meter gestrickt zu sein brauchen, mit dem Lockvogel abwechseln, wenn der Falke sich nicht gleich fängt, und man wird bald sein Ziel erreichen. Die Hühnerfalken sind nämlich in wildreichen Gegenden oft sehr wählerisch mit ihrer Nahrung, denn der eine schlägt lieber Tauben, der andere lieber Hofhühner oder Fasanen und Rebhühner. Es kommt daher der Fall öfters vor, daß man das Stoßnetz wohl vier bis fünf Tage lang vergeblich aufgestellt und als Lockvogel eine Taube genommen hatte. Der Falke, auf den man es abgesehen hat, streicht täglich über das Netz fort, ohne auf die Taube zu stoßen. Setzt man dann plötzlich ein Hofhuhn als Lockvogel hin, so fängt er sich oft schon mehrere Stunden nachher. Bisweilen verschmäht er auch dies und wird dann schließlich erst durch einen Fasan schnell gefangen.

Zu einem Stoßnetze, worin die Maschen 5 Cm. groß sein können, nehme man recht dünnen, aber festen Bindfaden, stelle es nur an vier glatte und gerade, $1^3/_4$ Meter lange Stöcke im Quadrat auf, indem man an jedem Stocke am oberen Ende, auf der inwendigen Seite blos einen Kerb von unten nach oben einschneidet, worin man den oberen Rand des Netzes nicht zu fest einklemmt.

Digitized by Google

Der Falke kann dann von jeder Seite auf die Taube stoßen, das Netz wird stets sicher herabfallen und der Vogel sich fangen. Zum Ueberfluße kann man oben über das so gebildete Viereck noch einige Bindfaden der Kreuz und der Quere ziehen, damit er sich auch sicher fängt, wenn er einmal mehr von oben auf den Lockvogel stoßen sollte.

Die Hühnerfalken beginnen ihre Jagdstreifereien größtentheils des Morgens ganz früh und gegen Abend. Man stellt daher auch am besten die Stoßnetze noch vor der Dämmerstunde da auf, wo man die Falken wiederholt streichen oder aus dem benachbarten Walde kommen sah, weil sie gewöhnlich Wechsel halten. Der mühsame Jäger wird sich stundenlang versteckt in einiger Entfernung von dem Netze aufstellen und aufpassen, ob sich ein Falke fängt, oder wird diesen mindestens beobachten, ob er Notiz vom Lockvogel nahm, um danach seine ferneren Maßregeln zu treffen.

In früheren Zeiten wurde der Hühnerfalke in Deutschland auch zur Baize abgerichtet.

Der Wanderfalke oder Blaufuß (Falco peregrinus).

Wie sein Name schon andeutet, ist er ein Zugvogel, der sich in Deutschland sehr vereinzelt vom März bis October, selten im Winter aufhält.

Seine Länge ist 4¼ Dm., die Breite 8¾ Dm. Weibchen und Männchen ähneln sich in den ersten Lebensjahren sehr im Gefieder, und die Zeichnungen beider kommen sehr verschiedenartig vor. Das Männchen ist später auf dem Rücken dunkler, auf Brust und Bauch heller als das Weibchen. Der bläulichschwarze Schnabel hat auf jeder Seite einen Zahn und eine gelbe Wachshaut. Der Augenstern ist gelbroth und die Fänge sind gelb, bisweilen bläulich. Die zusammengelegten Flügel reichen bis zur

Digitized by Google

Schwanzspitze. Der obere Theil des Kopfes ist beim Männchen und Weibchen dunkelbraun, an der Stirn, den Backen und der Kehle weiß. Vom Auge ab zieht sich stets ein schwarzer, keilförmiger Streifen bis auf den Hals herab, welcher diesen Vogel ganz besonders charakterisirt. Der Rücken und die Flügelfedern sind dunkelbraun und grau. Die gelblichweiße Brust ist mit dunkelbraunen Flecken betüpfelt und am weißen Bauche befinden sich braune Querstreifen. Der dunkelbraune Schwanz hat viele röthlich aschgraue Bänder, und an der Spitze ist er gelblichweiß gesäumt. Die ersten Schwungfedern sind schwarz. Das Weibchen legt vier rostgelbe, mit rothbraunen Flecken versehene Eier, horstet im Walde auf hohen Bäumen, auf Felsen und hohen Kirchthürmen, sogar mitten in den Städten. Der Horst besteht aus Reisigholz und Strohhalmen, ist ganz flach und viel kleiner als der des Hühnerfalken.

Sonst gilt alles auch vom Blaufuße, was beim Hühnerfalken erwähnt ist.

Der Milan oder Schwalbenschwanz (Falco milvus).

Derselbe ist ein Zugvogel, der gesellig im März in Deutschland eintrifft, sich dann vereinzelt und meistens gesellig wieder nach dem Süden wandert.

Die Länge des Milan beträgt $5^1/_4$ Dm., die Breite $12^1/_2$ Dm. Sein Körper ist lang gestreckt, der Kopf klein mit schwachem, schwarzen Schnabel, der einen Zahn hat. Die Wachshaut ist gelb. Die vierte Schwungfeder ist die längste. Der schwarze Schwanz ist gabelförmig. Die halb befiederten Fänge sind kurz und orangegelb. Der Augenstern ist dunkelbraun. Kopf, Kehle und Hals sind gelblich, weiß und graubraun der Länge nach gestreift. Die Brust ist rothbraun mit dunklen Längsstrichen. Bauch und Hosen sind rostbraun mit schwarzen Strichen. Rücken und Flügeldecken

Digitized by Google

sind dunkelbraun und hell gesäumt. Er nährt sich von wildem und zahmen Geflügel, besonders jungen Gänsen und Enten, die er dicht bei den Dörfern und einzelnen Gehöften mit großer Frechheit raubt. Außerdem kröpft er auch junge Hasen, Hamster, Mäuse, Frösche und Fische.

Ihre Horste bauen sie im Walde auf hohen Bäumen von dünnem Zackholze, was mit Gras, Schilf, Moos und Federn ausgefüttert ist. Das Weibchen legt meistens vier grünlichweiße Eier, die braun marmorirt sind. Beide Eltern ernähren ihre Jungen bis zum Herbst. Man schießt die Milane häufig auf Krähenhütten, sonst nur zufällig, da sie nicht sehr scheu sind. In Habichtskörben und Stoßnetzen lassen sie sich leicht fangen.

Der schwarzbraune Milan (Falco fusco ater).

Vom vorigen unterscheidet sich dieser dadurch, daß das Gefieder in der Hauptsache dunkler, mehr rostfarbig schwarzbraun und sein Schwanz nur eingebuchtet ist. Kopf und Hals sind auf gelblichem Grunde braun in die Länge gestreift. Die Spitzen der Schwanzfedern sind schwarz und der Schwanz selber ist dunkelbraun gebändert. Sonst alles wie beim vorigen.

Der Sperber (Falco nisus).

In Deutschland kommt er überall das ganze Jahr hindurch vor, nur wenn es sehr kalt wird, streicht er südlicher. Er lebt in Feldhölzern und mehr am Rande größerer Waldungen, wo er Felder in der Nähe hat. Seine Länge ist $3^1/_2$ Dm., die Breite

Digitized by Google

6 Dm. Der aschgraue Schnabel ist sehr kurz, hat einen Zahn und eine grüngelbliche Wachshaut. Die kahlen, dünnen Fänge und der Augenstern sind gelb.

Der Oberkörper ist dunkelaschgrau, der untere Theil weißlich mit rostrothen und bräunlichen Wellenlinien versehen. Der Schwanz hat oben sechs schwarze Bänder und an der Spitze ist er weiß eingefaßt. Die untere Seite des Schwanzes ist weiß mit braungrauen Bändern. Die Schwungfedern sind nach der Spitze zu dunkelbraun. Die Federn an den Schenkeln sind besonders lang. Er kröpft alles Federwild, was er bezwingen kann, doch schlägt er besonders gern alle Drosselarten, Lerchen, Rebhühner, junge Fasanen und Tauben, die er im Fluge und auf der Erde stößt. Das Weibchen horstet nicht zu hoch in den Bäumen, aber im dichsten Holze. Der Horst besteht aus feinem Reisigholze und ist mit Gras und Federn ausgepolstert. Ende Mai legt das Weibchen vier grünlichweiße mit rothbraunen Punkten überspritzte Eier und brütet diese in drei Wochen aus.

Der Sperber fängt sich in Habichtskörben und Stoßnetzen und wird öfters zufällig erlegt, da er sich den Jägern häufig unvorsichtig und harmlos nähert.

Der Mauser- oder Mausebussard (Falco buteo).

Dieser ist über ganz Deutschland im Sommer und Winter verbreitet, nur in sehr strengen Wintern zieht er theilweise südlicher, um im frühen Frühjahre zurückzukehren, lebt im Walde und auf dem Felde und gehört zu den Strichvögeln.

Seine Länge beträgt 6 Dm., die Breite 12 Dm.

Das Gefieder ist nach Alter und Geschlecht sehr verschiedenartig. Im Allgemeinen sind die Farben bei den jungen Mausern sehr dunkel, bei den ganz alten ganz hell und sogar weiß mit ein-

Digitized by Google

zelnen graubraunen Flecken. Die vierte Schwungfeder ist die längste. Der von der Wurzel an gekrümmte weißlichgelbe, bisweilen auch graue Schnabel, hat eine gelbe Wachshaut. Die geschuppten kahlen Fänge und der Augenstern sind gelb. Der obere Theil des Leibes ist in den meisten Fällen braun, röthlich und weiß marmorirt, der untere Theil grau mit dunkelbraunen Flecken. Der Schwanz ist grau, schwarz, braun und weißlich gebändert, auch überragt er etwas die zusammengelegten Flügel. Das Weibchen legt vier rothbefleckte Eier auf weißem Grunde, brütet in einem von Reisigholz, Stroh und Schilf zusammengetragenen Horste auf alten Bäumen etwa 24 Tage. Die Nahrung besteht in Mäusen, Maulwürfen, Schlangen, Fröschen und Luder, er schlägt aber auch viel Rebhühner, Fasanen, junge Hasen und sogar Rehkälber, weshalb er der Jagd ganz besonders schädlich ist. Jeder aufmerksame Jäger hat dies hinlänglich erfahren. Er schlägt seine Beute nicht im Fluge, sondern nur, wenn diese sich auf der Erde befindet. Auf den Uhu stößt er sehr erpicht und kann auf Krähenhütten und beim Luder vielfach geschossen werden. Auch fängt er sich sehr gut in kleinen Tellereisen, welche auf hohen Pfählen in der Nähe von Fasanengehegen, Hühner- und Fasanenfütterungen im Winter aufgestellt werden. Ebenso fängt er sich in Habichtskörben, aber ~~nicht~~ in Stoßnetzen. Er ist nicht sehr scheu und läßt sich mit einem Wagen häufig schußmäßig ankommen. Wenn es in manchen Ländern verboten ist, den Mauser zu schießen, weil er auch Mäuse vertilgt, so ist dies ein großer Fehler, denn der Schaden, welchen er der Jagd zufügt, steht mit den wenigen Mäusen, die er schlägt in keinem Verhältnisse.

Der rauhfüßige Bussard (Falco lagopus).

Dieser ist in jeder Beziehung dem vorigen ähnlich, nur ist er etwas größer, hat bis auf die Zehen weißlich befiederte Fänge, die

Digitized by Google

mit dunkelbraunen Querlinien versehen sind. Auch ist er ein noch gefährlicherer Räuber für die Jagd als der Mauser. Der nackte Augenkreis ist grün. Der Kopf und Hals ist meistens weiß mit länglich dunkelbraunen Streifen. Der Rücken ist dunkelbraun und weiß gefleckt. Der Schwanz weiß mit einigen braunen Bändern. Auf der Brust hat er große dunkelbraune Flecke. Alles Uebrige hat er mit dem Mauser gemein.

Die Rohr- oder Sumpfweihe (Falco aeruginosus).

Sie ist nur vom Frühjahre bis Herbst in Deutschland und zieht im Spätherbste nach südlichere Länder. Ihre Länge ist $5^1/_3$ Dm., die Breite $11^3/_4$ Dm. Der grauschwarze Oberschnabel ist von der Wurzel aus gekrümmt und hat einen kaum merklichen Zahn. Wachshaut, Augenstern und Fänge sind gelb. Letztere sehr lang, unbefiedert und dünn. Der Scheitel ist rostgelb, bisweilen weiß, aber immer braun gestrichelt, die Kehle gelblichroth. Der Oberleib ist dunkelbraun und gelb wellenförmig gefleckt. Der Unterleib ist mehr hellbraun. Die dritte Schwungfeder ist die längste. Der Schwanz ist braun, mit rothen Flecken versehen und überragt die Flügelspitzen. Von den Seiten des Kopfes ziehen sich bis unter die Kehle im Halbkreise eine Menge etwas hochstehende, kleine, braungefleckte Federchen, welche man den Schleier oder Halskragen nennt und der sehr charakteristisch ist. Ihr Aufenthalt ist an Seeen und Teichen, die mit Rohr und Schilf bewachsen sind, auf Wiesen und sumpfigen Gegenden. Das Weibchen horstet gewöhnlich im Rohr auf umgeknickten Rohrstengeln, seltener in Brüchern auf hohen Graspulten oder einzeln stehenden Sträuchern. Es legt vier grünlichweiße runde Eier im Mai in einem Horste von Rohrstengeln, Binsen und Schilf, welcher mit Federn ausgefüllt ist. Die Rohrweihe macht besonders Jagd auf alle Wasser- und Sumpfvögel

Digitized by Google

und richtet hierin großen Schaden an, doch kröpft sie auch alle Arten von Landvögeln, wie Rebhühner, Fasanen ꝛc. und bisweilen auch Fische, Frösche und Eier.

Geschossen wird sie meist nur gelegentlich bei den Entenjagden oder des Abends auf dem Anstande, wenn sie ihre Jagdstreifereien über dem Rohr und Schilf unternimmt. Wo Grenzhügel oder größere Steine vorhanden sind, kann man sie auch in kleinen Tellereisen fangen, da sie sich gern auf solche setzen, um auszuruhen oder auf Beute zu lauern. Die Eisen werden blos auf einen Hügel oder Stein gelegt und mit etwas Gras verdeckt; allenfalls kann man auch ein Ei auf das Eisen legen.

Die Kornweihe (Falco pygargus oder cyaneus).

In Deutschland ist sie überall auf Wiesen und in Feldern das ganze Jahr hindurch vertreten, nur erst bei strengem Froste zieht sie nach südlichen Gegenden. Sie ist 4 Dm. lang und 1 Meter breit. Die vierte Schwungfeder ist die längste. Aeußere Zehen sind nach vorn und hinten beweglich. Der Schnabel ist schwarzbraun. Die langen feinen Fänge sind gelb. Der Augenstern röthlichgelb. Sie haben einen weiß- und braungefleckten Halskragen, der dem Kopfe ein eulenähnliches Aussehen giebt. An der Wurzel des Unterschnabels befindet sich ein kleiner Bart von schwarzen, steifen Federborsten. Männchen und Weibchen sehen sich bis zum dritten Jahre sehr ähnlich, und ist der Oberkörper dann braun, am Hinterkopfe, Hinterhalse und oberen Theile des Flügels rostgelb. Der Unterkörper auf gelblichem Grunde bräunlich gestreift. Der Schwanz ist abwechselnd braun und rostgelb gebändert.

Das alte Männchen ist auf dem Oberkörper inclusive Schwanz lichtaschgrau, auf der Unterseite ganz weiß. Die ersten Schwungfedern sind schwarz, nach der Wurzel zu grau, die übrigen ganz hellgrau und bläulich.

Digitized by Google

Das Weibchen horstet auf der Erde in Wiesen, Brüchern oder im Getreide und legt im Mai zwei bis vier bläulich runde Eier, die nach dreiwöchentlicher Brütezeit auskommen.

Die Kornweihen kröpfen alle Land- und Wasservögel, die sie bezwingen können und schlagen ihre Beute laufend oder schwimmend, selten im Fluge. Den jungen Fasanen und Rebhühnern sind sie ganz besonders schädlich. Man schießt sie ebenfalls gelegentlich oder auf dem Anstande des Abends, wenn sie auf Raub umherstreichen. In Habichtskörben, Stoßnetzen oder Eisen sind sie nicht zu fangen.

Der Uhu (Strix bubo).

Dieser ist unsere größte Eulenart in Deutschland und als Standvogel zu betrachten. Er hält sich in einzelnen Exemplaren größtentheils in Gebirgen, mitunter aber auch in den größeren, einsamen, ebenen Waldungen auf. Seine Länge ist $5^1/_2$ Dm., die Breite $13^1/_2$ Dm. Der dunkel blaugraue Schnabel ist stark gekrümmt. Die Fänge sind bis an die starken Krallen befiedert. Die äußeren Vorderzehen kann er beliebig nach vorn und hinten bewegen. Auf dem sehr dicken Kopfe stehen mehrere, meist schwarze Federn gerade in die Höhe, wie Ohren. Die großen Augen, welche mit einer Nickhaut versehen sind, sind goldgelb, um den Schnabel und um den Augen befinden sich schwarz und weiße Federhärchen. Das Gefieder des Oberleibes ist braun, gelb, weiß und schwarz geflammt. Der Unterleib ist rostgelb, mit großen, länglichen, zur Seite wellenförmig auslaufenden, schwarzen Flecken. Die Kehle ist öfters weißlich. Der rostfarbene, gerade abgeschnittene Schwanz hat neun schwarze Querbinden. Die Flügel sind schwarz gebändert. Die dritte Schwungfeder ist die längste. Männchen und Weibchen haben dasselbe Gefieder.

Digitized by Google

Der Uhu streicht, wie alle Eulen, nur des Nachts umher, um auf Raub auszugehen und sitzt am Tage still, auf dicht belaubten Bäumen, nahe am Stamm, da er das Tageslicht scheut. Des Nachts ruft er seinen Namen öfters sehr laut, besonders in der Begattungszeit. Das Weibchen horstet in Felsenlöchern oder in altem Gemäuer, selten auf Bäumen.*) Der Horst besteht nur in wenigen Schilfhalmen und einigen feinen trockenen Reisern. Es legt zwei runde, weiße Eier, die in drei Wochen ausgebrütet werden. Während der Brutzeit verläßt das Weibchen das Nest nicht, sondern das Männchen versorgt dasselbe dann hinlänglich mit Nahrung.

Der Uhu kröpft Rehkälber, Hasen, Ratten, Mäuse und Geflügel aller Art. Das Letztere schlägt er ebenfalls meist auf der Erde und selten im Fliegen.

Trotz seines Schadens, welchen er der Jagd zufügt, schießen ihn die meisten Jäger nicht, sondern nehmen alljährlich die Jungen aus dem Horste, um sie groß zu ziehen und auf den Krähenhütten zu verwenden. Sie werfen so für manchen Forstbeamten eine regelmäßige, kleine Revenü ab, da das Weibchen meistens auf derselben Stelle brütet.

Die übrigen, in Deutschland vorkommenden Raubvögel, wie der Wespenbussard, der Thurmfalke, der Blau- und Baumfalke u. s. w., sind für die Jagd unschädliche Thiere, da sich die beiden ersteren meist nur von Insekten ernähren und die letzteren nicht eben häufig in Deutschland erscheinen und auch nur kleine Vögel schlagen. Sämmtliche Eulenarten, außer dem Uhu, thun der Jagd ganz unbedeutenden Abbruch, aber desto nützlicher machen sie sich

*) In der Oberförsterei Ibenhorst in Ost-Preußen brütete vor circa zehn Jahren ein Uhu zwei Jahre hintereinander auf einem zusammengebrachten 3 Meter hohen Schilfhaufen, der von einem Bauer gekauft, aber vergessen war abzufahren. Der Haufen stand mitten auf einem Gestell, und wurde nicht einmal von alten Bäumen beschattet. Die Jungen wurden ihm jedesmal fortgenommen.

Digitized by Google

durch ihre wirklich massenhafte Vertilgung der Mäuse. Es ist daher sündlich Eulen zu schießen, wenn auch die größeren Arten, wie die mittlere und kleine Ohreule, wirklich einmal im Nothfall ein junges Rebhuhn oder einen anderen jungen Vogel schlagen sollten. Dagegen ist hier noch zu erwähnen:

Der Kolkrabe (Corvus corax).

Unstreitig ist dieser auch ein gefährlicher Räuber für die Jagd, der überall vertilgt werden muß. Er gehört zu den rabenartigen Strichvögeln. In Deutschland hält er sich in den größeren, zusammenhängenden Wäldern, einzeln oder paarweise vom Februar bis November auf, und wenn es sehr kalt wird, streicht er nach dem Süden. Seine Länge beträgt $4^1/_2$ Dm., die Breite 9 Dm. Der schwarze Schnabel ist ziemlich lang, sehr stark, an der Spitze abwärts gebogen und mit einem nicht sehr merklichen Zahn versehen. Die Augen sind graubraun. Die Ständer sind schwarz und mit ziemlich langen Krallen versehen. Die vierte und fünfte Schwungfeder sind die längsten. Der keilförmig zugehende Schwanz ist abgerundet. Das Gefieder des ganzen Vogels ist glänzend schwarz und schillert ins Bläuliche.

Seinen Horst baut er in den höchsten alten Bäumen, selten auf Felsen, von trockenem Reisigholze, welches mit Gras, Schafwolle und Moos ausgefüttert ist. Das Weibchen legt schon im März vier grünliche Eier, die braun und grau gefleckt sind und binnen drei Wochen ausgebrütet werden. Beide Eltern füttern die Jungen.

Der Kolkrabe nährt sich von alten und jungen Hasen, jungem Geflügel aller Arten, von Eiern, Fröschen, Schnecken, Mäusen und Aas.

Er ist außerordentlich scheu und läßt sich nicht leicht vom Jäger überlisten. Man muß daher keine Mühe scheuen, diesen

Digitized by Google

Räuber auf alle mögliche Weise zu vertilgen. Am ersten erlegt man ihn noch bei einem Stück Fallwild oder beim Aufbruch eines Stück Wildes im Walde, wenn man sich dort gut versteckt ansetzen kann. Sonst ist er nur bei seinem Horste zu erlegen. Seine Sinneswerkzeuge sind enorm scharf, namentlich der Geruch, was jeder Jäger, der im Walde öfters Wild aufgebrochen hat, beobachtet haben wird. Kaum hat man ein Stück Hochwild aufgebrochen, so läßt er sich sehr bald hoch in der Luft sehen und hören oder blockt in einer Entfernung von 200 bis 300 Schritten auf den höchsten Bäumen auf und wartet daselbst bis der Jäger sich entfernt hat, um den Aufbruch zu kröpfen. Der Rabe muß also in sehr weiter Ferne die Witterung von dem aufgebrochenen Stück Wilde bekommen. Auch ist er für den Jäger ein nicht uninteressanter Vogel, schon deshalb, weil er im Walde stets durch mehrfaches Schreien und Umherkreisen in der Luft anzeigt, wo etwa ein krankes oder verendetes Stück Wild in der Dickung sich befindet, was die Nachsuche nach einem angeschossenem Stück Wilde sehr erleichtert. Hat man z. B. ein solches wegen der einbrechenden Dunkelheit oder aus sonst einem Grunde verlassen müssen, so kann man in Gegenden, wo sich Kolkraben aufhalten, sicher sein, daß sich dieselben am andern Morgen kreisend und schreiend da aufhalten, wo das angeschossene Stück Wild verendet ist.

Die Drosselarten oder Krammetsvögel.

Selbige interessiren die Jägerei nur deshalb, weil sie in manchen Gegenden, besonders Nadelholzwaldungen, in Donen oder auf einem Vogelheerde mit Decknetzen durch Lockvögel gefangen werden, und nicht blos einen angenehmen Braten liefern, sondern auch für manchen Jäger noch eine kleine Einnahme abwerfen. Die Drosseln gehören zu den Singvögeln, kommen überall in Deutschland in

Digitized by Google

ziemlicher Anzahl vor und sind theils Zug-, theils Strich-, theils Standvögel. Ihre Nahrung besteht aus allen Arten von Waldbeeren, Regenwürmern, Puppen, Larven und Insekten. Sie paaren sich im März. Die Nester bauen sie von feinem Zackholze, Grashalmen, Haaren, Wolle, Moos und schmieren dies theilweise mit Lehm sehr fest und künstlich aus. Diese stehen gewöhnlich in Sträuchern oder auf niedrigen Bäumen im dichsten Nadel- oder Laubholze. Sie brüten 16 Tage und machen öfters zwei Gehecke.

Die Misteldrossel oder Schnarre, auch Schacker genannt (Turdus viscivorus).

Sie ist die größte aller in Deutschland vorkommenden Drosselarten und ist ihre Länge $2^{3}/_{4}$ Dm. Schnabel und Augenstern sind braun, die Ständer gelb. Das Gefieder des Oberkörpers ist graubraun. Hals und Brust sind weißlichgelb mit schwarzbraunen kleinen Flecken. Der Schwanz ist schwarzgrau und gelblich gesäumt. Ihre Nester stehen auf niedrigen Bäumen, etwa in der Mitte derselben und bestehen aus dünnen Zweigspitzen, die mit Grashalmen, Haaren und Federn ausgefüttert sind Das Weibchen legt vier graue, mit rothbraunen Punkten überstreute Eier. Sie leben außer der Brutzeit gesellig überall in Deutschland, und nur im ganz strengen Winter ziehen sie südlicher. Bis dahin halten sie sich gern auf Viehweiden, mit einzelnen Bäumen bestanden, und überhaupt mehr im lichten Holze auf. Es sind scheue Vögel, die sich nicht leicht in Donen und auf Vogelheerden fangen lassen.

Digitized by Google

Die Wachholderdrossel oder Ziemer (Turdus pilaris).

Sie ist um einige Centimeter kleiner als die vorige. Der Schnabel ist gelblich und an der Spitze braun. Ständer und Augenstern sind schwarzbraun. Kopf, Hinterhals und Unterrücken sind aschgrau. Der Oberrücken und die Schultern sind braun, gelblich und weiß gemischt. Die Schwung- und Schwanzfedern sind schwarz. Auf dem Scheitel haben sie einen schwarzen Längsstreifen und der Zügel ist ebenfalls schwarz. Die Kehle und halbe Brust sind rostgelb, die übrige Brust hat schwarzbraune, längliche Flecken und der Bauch ist weiß. Ihr Zug beginnt im frühen Frühjahre durch Deutschland. Meistens brüten sie nur im hohen Norden Europas, lieben dort lichte Birkenwälder und bauen auch ihre Nester gewöhnlich in solchen Beständen. Sie legen vier bis fünf meergrüne, rothbraun punktirte Eier und hecken meistens zweimal. Im Herbste ziehen sie sich in großen Schaaren zusammen und streichen so durch Deutschland, halten sich hier aber nur so lange auf, bis sie durch Frost und Schnee nach dem Süden vertrieben werden.

In Donen und auf dem Vogelheerde fangen sie sich nicht so gut wie die übrigen Drosselarten.

Die Schwarzdrossel oder Amsel (Turdus merula).

Von allen Drosselarten ist diese die einzige, welche als Standvogel in Deutschland angesehen werden kann, da sie nur bei ganz anhaltendem strengen Winter und hohem Schnee etwas südlicher streicht. Sie ist von der Größe der Wachholderdrossel. Der Schnabel ist gelb, der Augenstern braun. Der Augenliderrand gelb, die Ständer und das ganze Gefieder schwarz. Das Weibchen hat einen aschgrauen Bauch, einen schwärzlichgelben Schnabel und

Digitized by Google

eine mehr braun mit weißlichem Schimmer gefleckte Kehle. Die Schwarzdrossel hält sich am liebsten in dichten Nieder- oder Mittelwaldungen oder jungen Nadelhölzern auf und lebt stets nur einzeln oder familienweise. Die Nester bauen sie in dichten Sträuchern, nicht hoch von der Erde oder in aufgeklaftertem Reisigholze. Das Nest ist napfförmig von Lehm, Grashalmen und Wildhaaren fest zusammengefügt, und das Weibchen legt vier bis fünf grünliche, hellbraune, marmorirte Eier. Auch diese hecken oft zweimal im Jahre. Sie sind sehr wachsame und aufmerksame Vögel und für den Jäger besonders interessant, weil sie demselben auf dem Anstande oder beim Pürschgange im Walde durch ihr lebhaftes Geschrei häufig die Nähe von Wild verkünden. Besonders großen Lärm machen sie, wenn sich in ihrer Nähe ein Fuchs oder anderes Raubthier befindet. Aber auch den Jäger selber verräth sie beim Schleichen dem Wilde, denn wenn sie diesen in ihrer Nähe erblickt, so läßt sie ebenfalls ihre aufgeregten Töne hören, wodurch das Hochwild aufmerksam, mißtrauisch und unruhig wird.

Ihr angenehmer Gesang belebt bis im August alle Waldungen. Auf dem Vogelheerde läßt sie sich weniger fangen, wohl aber leicht in den Donen. Ihr Wildpret ist weniger beliebt.

Die Singdrossel oder Zippe (Turdus musicus).

In Deutschland ist sie ein Zugvogel, kommt Anfang März aus dem Süden in größeren Schwärmen, hält sich aber nicht lange auf, um im Norden zu brüten. Ein geringer Theil paart sich in Deutschland und brütet auch hier. Von Mitte September ab kommen sie aus dem Norden zurück und alle ziehen Ende October von hier wieder südlich. Ihre Länge ist $2^1/_4$ Dm. Schnabel und Augenstern sind braun, ersterer unten gelblich. Die Ständer sind gelblichgrau. Der Oberleib ist glänzend olivenbraun

Digitized by Google

und grau. Die Flügeldeckfedern sind an der Spitze röthlichgelb. Die Kehle ist gelblichweiß. Auf beiden Seiten der Kehle befindet sich ein schwarzer Streifen. An den Seiten des Halses und auf der Brust ist das Gefieder röthlichgelb mit dunkelbraunen, fast herzförmigen Flecken. Der Bauch ist weiß mit runden dunkelbraunen Flecken. Schwanz- und Schwungfedern sind graubraun, bei letzteren sind die beiden äußersten Federn nach außen zu weiß gerändert. Ihre Nester bauen sie gewöhnlich auf niedrigen, recht zackigen Bäumen, nicht eben hoch hinauf, geformt wie eine Halbkugel und zusammengefügt von Lehm, Moos, Grashalmen und Haaren. Sie legen vier bis sechs blaugraue, mit schwarzbraunen Punkten versehene Eier. Sie hecken gewöhnlich zwei Mal im Jahre. Ihr Gesang ist schön melodisch, und freut sich jeder Waidmann darüber, sobald er im Frühjahre den Wald betritt. Ihr Wildpret ist ganz besonders schmackhaft, und werden sie leicht in Donen und auf dem Vogelheerde von Ende September bis Ende October in Deutschland gefangen.

Die Weindrossel (Turdus iliacus).

Diese trifft im Frühjahre und Herbste in Deutschland 14 Tage später ein als die Singdrossel, hält sich nur kurze Zeit hier auf, und brütet nur im hohen Norden von Europa und sehr selten in Deutschland. Sie ist 2 Dm. lang. Das Gefieder ist auf der Oberseite olivengrün und braun, das der Unterseite weißlich, an den Brustseiten schön rostroth, am Halse gelblich mit dunkelbraunen, dreieckigen oder länglichen Flecken gezeichnet. Die Deckfedern der Unterflügel sind hellrostroth. Die Schwungfedern und Schwanzfedern sind bräunlich und letztere grünlich besäumt. Ihr Nest bauen sie gewöhnlich in der Nähe von Wasserlöchern oder in Erlenbrücher, und ist dasselbe von dürren feinen Zweigspitzen und Grashalmen künstlich zusammengefügt und in- und auswendig mit

Digitized by Google

Erde ganz glatt ausgeschmiert. Das Weibchen legt fünf bis sechs blaugrüne, schwarz punktirte Eier. Ihr Gesang ist ebenso melodisch als der der Singdrossel, nur nicht so weithin hörbar. Ihr Braten ist sehr schmackhaft und wird sie leicht in Donen und auf dem Vogelheerde gefangen.

Die Schildamsel (Turdus torquatus).

Sie zieht nur in einzelnen Exemplaren im März und October durch Deutschland, hält sich nur kurze Zeit auf und brütet nur im hohen Norden Europas. Sie liebt mehr die Gebirge als die ebenen Waldungen. Nur unmerklich größer ist sie als die Schwarzdrossel. Der Schnabel ist schwarzbraun, an der Wurzel röthlichgelb. Ständer und Augen sind dunkelbraun. Das Gefieder ist schwarzbraun oder schwarz, und auf der Oberseite sind die Federn etwas hellgrau, am Unterleib weißlich besäumt. Das halbmondförmige Schild auf der Brust ist weißlichaschgrau und röthlichbraun gemischt. Die äußersten Schwanzfedern sind weißlichgrau besäumt. Beim Weibchen ist das Schild oder Brustband meist nur angedeutet. Ihre Nester bauen sie wie die Schwarzdrosseln und legen vier bis sechs grünlichweiße, mit rothen Punkten versehene Eier. Ihr Gesang ist melodisch, aber nicht weit hörbar. Sie lassen sich leicht in Donen und auf dem Vogelheerde fangen und liefern einen guten Braten.

Die Feldlerche (Alanda arvensis).

Zum Schlusse soll hier noch der Feldlerche gedacht werden, da auch diese in manchen Gegenden ein Gegenstand der Jagd ist. Sie

Digitized by Google

bewohnen ganz Deutschland in großer Menge, sind Sing- und Zugvögel, die schon Ende Februar bei uns eintreffen und durch ihren herrlichen Gesang einen Frühlingsboten abgeben. Bis Ende October verweilen sie hier auf Feldern und Wiesen, wo sie zweimal im Jahre brüten. Ihre Länge ist $1^3/_4$ Dm. Die dritte Schwungfeder ist die längste. Die hinteren Flügelfedern sind alle schräg eingebuchtet. Der blauschwarze, an der Seite glänzend graue Schnabel ist kegelförmig. Die zarten, röthlichgrauen Ständer haben an dem Hinterzehen eine feine $1^1/_2$ Cm. lange Kralle. Die Augen sind kaffeebraun. Das Gefieder ist auf dem Oberkörper braun und grau gemischt, auf der Unterseite schmutzigweiß. Auf dem Kopfe sind sie dunkel- und hellbraun länglich gefleckt. Die Kehle ist weißlich, die Brust gelblichbraun mit länglich dunkelbraunen Flecken versehen. Der schwarzbraune Schwanz ist ausgeschnitten, die beiden äußeren Federn sind der Länge nach halb weiß, halb braun. An den zweiten Federn sind nur die schmalen Außenseiten weiß.

Das Nest dieser Lerchen findet man schon oft im März. Es besteht aus einer kleinen Vertiefung auf der Erde, welche mit Grashalmen, Pferdehaaren und Federn ausgefüttert ist. Das Weibchen legt fünf bis sechs gelblichgraue und braun punktirte Eier. Nach 14 Tagen kommen die Jungen aus, und sobald diese fliegen können, schreiten die Eltern zur zweiten Hecke.

Ihre Nahrung besteht in Würmern, Insekten und deren Eiern und Larven, grüner junger Saat und Sämereien aller Art.

Im September ziehen sie sich in größeren Schwärmen, besonders auf der Haferstoppel und den grünen Saatfeldern zusammen, und werden dann in den fruchtbaren Ebenen des Königreichs Sachsen und der Provinz Sachsen, sowie auch in Anhalt in großer Menge von den Jagdeigenthümern in sogenannten Streichgarnen mit vielen ihrer Gattungsverwandten gefangen, wodurch sie eine nicht unbedeutende Revenu den Jagdbesitzern abwerfen, da sie wegen ihres schönen Bratens hoch bezahlt werden.

Digitized by Google

Schließlich ist noch zu bemerken, daß in manchen Gegenden die Lerchen vielfach vermittelst des Lerchenspiegels am Tage, bei hellem Sonnenschein in Schlagnetzen, oder durch Schießen aus einem kleinen Versteck in Menge erlegt werden, und betreiben manche Jäger und Jagdliebhaber diese Jagd als einen besonderen Sport.

Druck von A. Th. Engelhardt in Leipzig.

Digitized by Google

Berichtigungen.

Seite VII lies Aquila, statt Apuila.
„ 10, Zeile 3 v. u. lies Numenius arquata, nicht arquatus.
„ 13, „ 8 v. u. „ Brufttern, statt Brunftkern.
„ 20, „ 8 v. o. „ Des vierläufigen Raubwildes, statt Haarwildes.
„ 35, „ 1 v. o. „ Hunderaçe, statt Hunderaſſe.
„ 36, „ 15 v. u. „ damit es kränker wird, statt krank wird.
„ 49, „ 8 v. u. „ von denen, statt an denen.
„ 58, „ 7 v. u. „ Der Kopf des Baumes, statt Baues.
„ 59, „ 2 v. o. „ Königl. groß geſchrieben, statt königl.
„ 72, „ 2 v. o. „ Seeen, statt Seen.
„ 73, „ 4 v. u. „ Seeen, statt Seen.
„ 90, „ 15 v. o. „ Otis tetrax, statt tetra.
„ 93, „ 5 v. u. „ um den Augen statt um die Augen.
„ 98, lies in der Ueberſchrift Tetrao bonasia, statt benasia.
„ 101, Zeile 16 v. u. lies gelblich, statt geblich.
„ 106, „ 6 v. u. „ 2½ Cm. lange, statt 1½ Cm.
„ 106, „ 3 v. u. „ um den Augen, statt um die Augen.
„ 107, „ 12 v. u. „ um den Augen, statt um die Augen.
„ 108, „ 2 v. o. „ ausgeſtopfte, statt ausſtopfte.
„ 116, „ 3 v. o. „ umherſtreichen, statt umherſtreifen
„ 118, „ 8 v. u. „ Seeen, statt Seen.
„ 121, lies in der Ueberſchrift Numenius arquata, statt axquata.
„ 122, Zeile 10 v. u. lies Seeen, statt Seen.
„ 131, „ 14 v. u. „ Binnenſeeen statt Binnenſeen.
„ 135, „ 14 v. u. „ unter den dunklen Federn, statt unter die.
„ 153, „ 12 v. o. „ laſſen ſie ſich felten fangen, statt nicht fangen.
„ 155, „ 10 v. u. „ aber felten, statt aber nicht.
„ 167, „ 2 v. u. „ Revenii, statt Revenu.

Endlich iſt noch zu bemerken, daß bei den Fährtenabdrücken beim Nörz Punkte umherſtehen, die nicht hinzugehören.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

YB 10210 ~~YB 10209~~

20 Ae.

M313017

Digitized by Google

Digitized by Google